


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القاهرة

عِلْمُ أَحْيَاءِ التُّرْبَةِ الْمُجَهَّرَةِ



تَأَلِيفُ

الدكتور مصطفى الساعاتي

غيات محمد قاسم



علم احياء التربة المجهرية

حقوق الطبع © محفوظة (١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م)
لمديرية دار الكتب للطباعة والنشر
جامعة الموصل

لا يجوز تصوير أو نقل أو إعادة مادة الكتاب
وبأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة الناشر

نشر وطبع وتوزيع
مديرية دار الكتب للطباعة والنشر
شارع ابن الاثير - الموصل
الجمهورية العراقية
هاتف ٧٦٣٣٣١
٧٦٣٣٣٥
تلكس ٨٠٩٢

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل

عِلْمُ أَحْيَاءِ التُّرْبَةِ الْمُجَهَّرِيَّةِ

تَأَلَّفَ

الدكتور غياث محمد قاسم الدكتور مضر عبد الستار علي

كلية العلوم
جامعة الموصل

كلية الزراعة والغابات
جامعة الموصل

١٩٨٩ م - ١٤٠٩ هـ

- المحتويات -

٩	المقدمة
١٧ - ١١	الفصل الاول : أحياء التربة المجهرية ، نبذة تاريخية
٢٨ - ١٩	الفصل الثاني : أقسام أحياء مجهرية التربة
٧٤ - ٢٩	الفصل الثالث : مجاميع أحياء التربة
٣١	مقدمة
١٣٣	١ - مجموعة بكتريا التربة .
٣٩	٢ - مجموعة أكتينومايسيتات التربة
٥١	٣ - مجموعة فطريات التربة .
٦٠	٤ - مجموعة طحالب التربة .
٦٥	٥ - مجموعة فيروسات التربة .
٦٩	٦ - مجموعة ابتدائيات التربة .
٧٢	٧ - مجموعة حيوانات التربة .
١١٢ - ٧٥	الفصل الرابع : دورة الكربون .
٧٧	١ - مقدمة
٧٩	٢ - بعض الاعتبارات الكيميائية الحيوية في تحليل المادة العضوية .
٨٢	٣ - النشاط الانزيمي في التربة .
١١٩	٤ - الخواص العامة لدبال التربة .
١٢٠	٥ - تحليل الدبال .
١٦٩ - ١٢٣	الفصل السادس : التحولات الحيوية للنيتروجين
١٢٥	١ - دورة النيتروجين .
١٢٩	٢ - تحليل الاحماض النووية .
١٣٣	٣ - تحليل اليوريا .
١٣٦	٤ - تحليل الاحماض الامينية .
١٣٧	٥ - عملية النشرة .
١٣٨	٦ - معدنة وتمثيل النيتروجين .
١٣٨	أ - دورة المعدنة والتمثيل .
١٣٩	ب - تأثير نسبة الكربون الى النيتروجين على عملية المعدنة والتمثيل .

١٤٩	ج - معدنة النيتروجين .
١٥١	د - تمثيل النيتروجين اللاعضوي .
١٥٤	٧ - عملية النترجة .
١٥٩	٨ - النترات والتلوث البيئي
١٦٢	٩ - اختزال النترات وانطلاق النيتروجين .
١٧١ - ١٩٨	الفصل السابع : تثبيت الحيوي للنيتروجين
١٨١	١ - تثبيت النيتروجين بصورة لاتكافلية (بصورة حرة)
١٨٦	٢ - العوامل التي تؤثر على عملية تثبيت النيتروجين بصورة لا تكافلية
١٨٧	٣ - تثبيت النيتروجين بصورة تكافلية .
١٩٠	أ - بكتريا العقد في التربة .
١٩١	ب - تطور العقد وتركيبها
١٩٧	ج - العوامل التي تؤثر على عملية تثبيت النيتروجين بصورة تكافلية
٢٠٠ - ٢١١	الفصل الثامن : التحولات الحيوية للفوسفور .
٢٠١	١ - دورة الفوسفور .
٢٠١	٢ - الفوسفور العضوي في النبات .
٢٠٢	٣ - الفوسفور العضوي في الكائنات الدقيقة .
٢٠٣	٤ - الفوسفور العضوي في دبال التربة :
٢٠٣	٥ - دور الاحياء المجهرية في تحولات الفوسفور .
٢١٣ - ٢٢٨	الفصل التاسع : التحولات الحيوية للمركبات الكبريتية
٢١٥	دورة الكبريت .
٢١٨	١ - معدنة الكبريت
٢١٩	٢ - التمثيل الميكروبي للكبريت .
٢٢٠	٣ - اكسدة مركبات الكبريت
٢٢٦	٤ - اختزال مركبات الكبريت اللاعضوية
٢٢٩ - ٢٣٥	الفصل العاشر : التحولات الحيوية للحديد
٢٣١	١ - مقدمة
٢٣١	٢ - اكسدة الحديد .

٢٣٢	٢ - اختزال الحديد .
٢٣٤	٤ - تحليل مركبات الحديد العضوية .
٢٣٧ - ٢٥٧	الفصل الحادي عشر : انحلال المبيدات وتحولاتها .
٢٣٩	١ - المبيدات .
٢٣٩	٢ - أنواع المبيدات .
٢٤٠	٣ - العلاقة بين احياء التربة المجهرية والمبيدات .
٢٤٢	٤ - التحلل الحيوي للمبيدات .
٢٥٩ - ٢٨٣	الفصل الثاني عشر : العلاقات المتبادلة بين الاحياء المجهرية في التربة .
٢٦١	١ - المنطقة المحيطة بالجنور والعلاقة بين الكائنات الدقيقة فيها .
٢٦٣	٢ - الكائنات المجهرية بمنطقة الجذر
٢٦٧	٣ - العلاقات بين الكائنات الحية بصورة عامة .
٢٨٤ - ٢٩٣	المصطلحات العلمية
٢٩٤	المراجع العلمية

- بسم الله الرحمن الرحيم -

لقد حدث تطور ملحوظ بالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي في عهد الثورة الزاهر وحظي هذا القطاع بالذات بمزيد من الاهتمام والدعم المتواصل والا محدود خاصة لحركة العلم وترجمة الكتب العلمية والادبية وتأليفها سواء كانت المنهجية منها والمساعدة لما لذلك من أهمية كبرى في دعم المسيرة العلمية الصاعدة في قطرنا الناهض .

إن الغاية الاساسية من دراسة علم أحياء التربة المجهرية هو دراسة طبيعة الكائنات الحية ونشاطها وتأثير ذلك في تحولات العناصر في التربة ودراسة الوسائل التي يمكن بواسطتها التحكم في نشاط هذه الاحياء وتحويرها بالطرق الصحيحة وبما ينعكس ذلك على زيادة خصوبة التربة والافادة منها في اغراض شتى . كما ان علم أحياء التربة المجهرية ليس علماً منفرداً إذ يمكن تتبع اصوله في علوم البكتريا والفطريات وعلم التربة والكيمياء الحيوية وامراض النبات . وعلى هذا الاساس فأن فهم هذا العلم يتأتى من تفهم العديد من العلوم التي اسهمت في ايجاده كعلم قائم بذاته .

تشمل فصول هذا الكتاب اتجاهات عديدة ، منها دراسة المجموعات الميكروبية الرئيسة في التربة ولا سيما وصف تلك المجاميع وتقسيمها وتبيان اهميتها . كما شمل ايضاً عرضاً بالتحويلات الرئيسة للعناصر التي تقوم بها الاحياء المجهرية كتحويلات الكاربون والنيتروجين والفوسفور والكبريت والحديد . كذلك تشمل فصول الكتاب العلاقات البيئية المختلفة ودور أحياء التربة في تحليل المادة العضوية وانشلال مبيدات الآفات المختلفة .

ولا يسعنا هنا الا ان نقدم شكرنا الجزيل الى كل من الدكتور صبحي حسين خلف الاستاذ المساعد في كلية العلوم / قسم علوم الحياة على تقويمه العلمي للكتاب والاستاذ عبد الجبار علوان حسين النايبة الاستاذ المساعد في كلية الاداب / قسم اللغة العربية على تقويمه الكتاب لغوياً . كما نشكر الاخوة والاخوات العاملين في مؤسسة

دار الكتب للطباعة والنشر / جامعة الموصل للجهود التي بذلوها في اخراج هذا
الكتاب ومن الله التوفيق .

المؤلفان

الفصل الأول

« أحياء التربة المجهرية »

نبذة تاريخية عن تطور علم احياء التربة المجهرية :

تعرف التربة من الناحية الحيوية بانها بيئة أو نظام مليء بمجاميع مختلفة من الاحياء المجهرية المسؤولة عن العديد من الفعاليات التي تحدث في التربة وهي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الانسان واقتصاده . قسم من هذه التفاعلات تكون ذات تأثير ايجابي مثل تحليل المخلفات العضوية الحيوانية والنباتية ومخلفات الانسان التي تصل التربة مع تحرير العناصر الغذائية المختلفة الكامنة فيها بشكل جاهز للنبات ، والاخرى ذات تأثير سلبي في حياة النبات وهذه تشمل الفعاليات التي تحول العناصر الغذائية الجاهزة للنبات الى صور غير جاهزة . إضافة الى الامراض المختلفة التي تسببها .

تطور علم الاحياء المجهرية بصورة عامة في السنوات الاخيرة وعلم أحياء التربة المجهرية بصورة خاصة لدرجة الفهم الواضح لدور الاحياء المجهرية في عمليات تكوين التربة وتحولات العناصر الغذائية وتأثير ذلك في نمو النبات ، وفيما يأتي نعرض نبذة تاريخية عن الكيفية التي تطور بها علم أحياء التربة المجهرية ،

١ - اكتشاف دور الاحياء المجهرية في انحلال المادة العضوية :

إن علم احياء التربة المجهرية بقي مهملاً مدة من الزمن ، ففي نهاية القرن السابع عشر كانت هناك حرب علمية بين المختصين في علم الكيمياء والفلسفة والاحياء المجهرية فقد كان قسم منهم يعتقدون بأن تحول العناصر الغذائية داخل التربة عملية كيميائية بحتة ليس للاحياء المجهرية اي دور فيها . والقسم الآخر كان يعتقد العكس .

إن أول إشارة مبكرة لعلم احياء التربة المجهرية كانت من العالم الفرنسي لويس باستير **Louis Pasteur** (١٨٢٢ - ١٨٩٥) حيث بين ان الاحياء الدقيقة تسبب التخمر والتعفن والانحلال . وقد اكد على الطبيعة الحيوية لعمليات تحول المادة العضوية في التربة وان الاحياء المجهرية هي التي تعمل على معدنة المخلفات العضوية ذات المصدر الحيواني والنباتي وكذلك هي التي تحول العناصر الغذائية الى اشكال جاهزة للنبات او بالعكس . كما اكد ان هذه العمليات تعتمد لا على طبيعة الاحياء ونوعها فحسب بل تعتمد على الظروف المحيطة بها . فبوجود الاوكسجين (ظروف هوائية) سوف تتحلل الكربوهيدرات الى ثاني اوكسيد الكربون . وعند عدم وجود الاوكسجين (ظروف لا هوائية) سوف لا تكتمل عملية التحلل اذ يصاحب غاز CO_2 تكون غازات اخرى كالهيدروجين والميثان مع كحولات واحماض عضوية بعملية تسمى (التخمر) **fermentation** .

٢ - علم احياء التربة المجهرية علم قائم بذاته :

بالنظر لكون العمليات السابقة تتم بوساطة مجاميع مختلفة من البكتريات والفطريات والاحياء الاخرى الموجودة في التربة فقد ظهر بالتدريج فرع جديد من فروع علوم الاحياء المجهرية ، الا وهو علم احياء التربة المجهرية **Soil Microbiology** الذي يدرس المجاميع المجهرية الموجودة في التربة ودورها في التحولات المختلفة واهمية ذلك في تغذية النبات وانتاج المحاصيل . اضافة الى ذلك فهو يدرس اعدادها وتصنيفاتها والطرق المستعملة في قياس نشاطاتها في التربة .

٣ - اكتشاف عملية النترجة **Nitrification** :

يقصد بالنترجة عملية تأكسد الامونيوم الى نترات . لقد شارك في اكتشافها العديد من العلماء . فمنذ عام ١٨٧٧ لاحظ العالمان **Schloesting** و **Muntz** انه عند مرور مياه المجاري ببطء خلال عمود زجاجي مليء بالرمل وكاربونات الكالسيوم فإن الامونيا الموجودة في هذه المياه تتأكسد بمرور الزمن الى نترات . وعند اضافة كمية قليلة من بخار الكلوروفورم (مادة سامة) تتوقف العملية تماماً . وعند التخلص من الكلوروفورم وازافة كمية قليلة من معلق التربة (كلقاح بكتيري) تبدأ عملية التحول ثانية . لذلك اثبتوا أن هذه العملية حيوية ولا يمكن

ان تتم إلا بواسطة الاحياء المجهرية. كذلك لاحظ العالم Warrington ان الامونيا الناتجة من تحلل المادة العضوية تتأكسد بالتربة حيويًا الى نترات بمرحلتين، الاولى تأكسدها الى نترت- NO_2^- والثانية تأكسد النترت الى نترات NO_3^- . ووجد هذا العالم ان العملية تتم في وسط غذائي معقم مضاف اليه الامونيوم وملتح بكمية قليلة من التربة وان ميزة هذا الوسط خلوه من اية مادة عضوية مما يدل على ان البكتريا التي تقوم بهذه العملية تستعمل غاز CO_2 مصدراً للكربون وتؤكسد الامونيوم لكي تحصل على الطاقة اللازمة لتحويل CO_2 الى مواد الخلية اي من نوع ذاتية التغذية كيميائياً (Chemoautotrophs)، ولكنه لم يتمكن من عزل البكتريا المسؤولة عن عملية الاكسدة هذه. وافاد العالم الروسي المشهور Winogradsky (١٨٥٦ - ١٩٥٣) مما توصل اليه كل من العلماء المذكورين آنفاً إذ تمكن في عام (١٨٩١) من عزل كل من الاجناس البكتيرية المسؤولة عن عملية الاكسدة وسمى الجنس المسؤول عن الخطوة الاولى من الاكسدة *Nitrosomonas* والجنس المسؤولة عن الخطوة الثانية *Nitrobacter*.

٤ - اكتشاف البكتريا المثبتة للنيتروجين : **N₂- Fixation**

لقد عرفت منذ قديم الزمان اهمية البقليات في اغناء خصوبة التربة. وقد اكد العالم Boussingault في عام ١٨٣٨ ان اهمية البقليات هذه تعود الى تثبيتها للنيتروجين الجوي. وفي عام ١٨٥٨ اكتشف العالم Jachmann العقد الجذرية على جذور هذه النباتات وفي عام ١٨٧٩ وجد العالم Frank ان هذه العقد الجذرية تتكون نتيجة التلقيح بالاحياء المجهرية (البكتريا). وفي عام ١٨٨٥ اثبت العالمان Hellriegel و Wilfarth ان البقليات تأخذ النيتروجين من الجو بواسطة البكتريا الموجودة في داخل العقد الجذرية وتحوله الى مركبات نيتروجينية وقد اكد ذلك العالم Schloesing إذ وجد ان وزن النيتروجين الذي تمتصه النباتات البقلية من الهواء كان مساوياً تقريباً للزيادة الحاصلة بالنيتروجين الممتص من قبل النبات والنيتروجين الباقي في التربة. وأخيراً استعمل العالم الهولندي المشهور Beijerinck (١٨٥١ - ١٩٣١) الاوساط الغذائية الغنية المنتخبة للحصول على مزرعة نقية من البكتريا المسؤولة عن عملية تكون العقد عملية تكون العقد الجذرية وسماها *Bacillus radicolica* وهي التي تعرف في الوقت الحاضر باسم *Rhizobium spp.* وسمى عملية التثبيت هذه التثبيت التعايشي للنيتروجين.

Symbiotic N₂ Fixation لانها عملية تعايشية بين البكتريا والنباتات
البقولية كل يستفيد من الآخر .

هناك نوع آخر من التثبيت لغاز النتروجين يسمى بالتثبيت اللاتعايشي **Non-symbiotic N₂ Fixation** وكان للعالم **Winogradsky** والعالم **Beijerinck** الفضل في اكتشافه إذ استعمل العالم الاول وسطاً غذائياً معقماً خالياً من أي مصدر من مصادر النتروجين . وبعد تلقيحه بكمية قليلة من التربة وتحضينه في ظروف ملائمة لمدة من الزمن لاحظ نمو خلايا بكتيرية في اسفل الدورق الحاوي على الوسط الغذائي وخلايا أخرى نامية على السطح . وبما ان النمو البكتيري بحاجة الى مصدر كاربون وطاقة - وهذه موجودة في الوسط الغذائي والى نتروجين لبناء الخلية الى جانب الكاربون وهذا غير موجود في الوسط الغذائي فقد استنتج ان هذه النموات البكتيرية قد افادت من النتروجين الجوي في بناء خلاياها . وبما ان مصدرها هو التربة فلا بد ان يكون هناك أيضاً تثبيت حر للنتروجين في التربة سماها بالتثبيت اللاتعايشي لانه ليس به حاجة الى نبات لاتمام العملية . بما ان هناك نمواً في اسفل الدورق وآخر على السطح فلا بد ان يكون هناك تثبيت لاهوائي وتثبيت هوائي . عزل العالم **Winogradsky** البكتريا النامية في اسفل الدورق فوجد انها بعض الانواع التابعة للجنس **Clostridium** .

اما العالم **Beijerinck** فقد عزل البكتريا النامية على السطح وسماها **Azotobacter** . في عام ١٩٠١ تم تصنيف النوع **A. chroococcum** من قبل العالم نفسه . في عام ١٩٠٤ عزل النوع **A. beijerinckii** . وفي عام ١٩٠٣ عزل العالم **Lipman** (١٨٧٤ - ١٩٣٩) النوع **A. vinelandii** .

مما سبق يمكن القول ان الفضل في تطور علم احياء التربة المجهرية يعود الى العالمين **S.N. Winogradsky** و **M.W. Beijerinck** اللذين يوضعان في نفس الصف مع العالمين **Robert Koch** و **Louis Pasteur** إذ اهتم الاخيران في دراسة الاحياء المجهرية المرضية بصورة رئيسة (مع ان العالم باستير قد اهتم الى جانب ذلك بأحياء التربة المجهرية) . اما العالمان الاوليان فقد اتجها نحو اكتشافات دور الاحياء المجهرية في العمليات الطبيعية اذ طوروا البيئة الغذائية المنتخبة لتشمل احياء التربة وبوساطتها انجزا عملاً ناجحاً في عزل ووصف احياء مجهرية جديدة مسؤولة عن تحولات النتروجين المختلفة وتحولات الكبريت في التربة . ومن هنا يمكن ان نعدهما الابوين لعلم احياء مجهرية التربة **Fathers of Soil Microbiology**

٥ - اكتشاف المضادات الحيوية : Antibiotics

إن بداية اكتشاف المضادات الحيوية كان من العالم فلمنك **Fleming** سنة ١٩٢٩ إذ اكتشف المضاد الحيوي البنساي الذي ينتجه الفطر **Penicillium notatum** . ويعود اكتشاف الكثير من المضادات الحيوية المعروفة في الوقت الحاضر للعالم الاميركي **Waksman** (١٨٨٨ - ١٩٧٣) اذ عزل الكثير من أجناس الاكتينومايسيتات المنتجة للمضادات الحيوية من التربة وله عدة مجلدات عنها ولعل أشهرها المضاد الحيوي **Streptomycin** . ثم تبعه علماء كثيرون درسوا في المجال نفسه ومن المعروف أن غالبية المضادات الحيوية المعروفة في الوقت الحاضر تنتج من قبل احياء التربة المجهرية .

٦ - اكتشافات أخرى :

إضافة الى ما تقدم ساهم الكثير من العلماء الاوربيين والعلماء الاميركان في تطوير علم احياء التربة المجهرية كالعالم الكندي **Loch head** الذي درس طرق تغذية بكتريا التربة واهتم بدراسة الاحياء المجهرية في منطقة الرايزوسفير **Rhizosphere** (المنطقة المحيطة بالجنور) . وتبعه في المجال نفسه العالم **Starkey** إذ اهتم بدراسة الاحياء المجهرية الخاصة بهذه المنطقة . اما العالم الاميركي **Thom** (١٨٧٢ - ١٩٥١) فقد برز في مجال فلسجة فطريات التربة وتصنيفها اما العالم **Nelson** فقد عزل - للمرة الاولى - بكتريا غير ذاتية التغذية (عضوية التغذية) تقوم بعملية النترجة وذلك في عام ١٩٣٠ . وفي عام ١٩٥٠ عزل العالم **Derx** جنسياً بكتيريا آخر مثبتاً للنترجين سماه **Beijerinckia** نسبة الى العالم **Beijertnck** . وفي عام ١٩٦٢ قام العالمان الالمان **Peterson** و **Jensen** بعزل الجنس **Dertxia** . وفي عام ١٩٦٦ وصف العالم **Dobereiner** النوع البكتيري المثبت للنترجين بصورة حرة **Azotobacter paspali** وفي سنة ١٩٧٦ عزل العالم نفسه بالاشتراك مع عالم آخر اسمه **Day** بكتريا حلزونية لها القدرة على تثبيت النترجين وهي **Spirillum lipoferum** . هذا وإن علم احياء التربة المجهرية أخذ بالتطور من خلال الدراسات المستمرة للعلماء المختصين في جميع انحاء العالم .

الفصل الثاني،

« أقسام احياء مجهرية التربة »

١ - تقسيم Winogradsky لاحياء التربة المجهرية :

قسمت احياء التربة المجهرية حسب طبيعة وجودها في التربة على مجموعتين من العالم الروسي وينوكرادسكي : -

أ - احياء التربة المجهرية المستوطنة *Autochthonous microorganisms*

وهي الاحياء المجهرية التي يكون موطنها الاصلي والدائم هي التربة وتوجد في كل انواع الترب ولها دور اساسي في التغيرات الكيميائية الحيوية التي تحدث في داخل التربة . وقد توجد هذه الاحياء في اطوار سكون كالسبورات التي تصبح فعالة عند توفر الظروف الملائمة لنشاطها من جديد أو قد تكون موجودة على هيئة خلايا خضرية فعالة في التربة .

ب - الاحياء المجهرية الدخيلة *Allochthonous microorganisms*

إن هذا النوع من الاحياء المجهرية يجد طريقه الى التربة اما عن طريق معاملة التربة بالمخصبات العضوية سواء عن طريق اضافة بقايا النباتات الخضراء أو مواد معدنية ، وفي حالات اخرى عن طريق تلوث التربة بمياه المجاري وما تطرحه الحيوانات من فضلات مختلفة . إن هذه الاحياء يمكن ان تبقى في التربة مدة من الزمن وتكون غير فعالة لان وجودها غالباً يكون اما في طور السكون أو تنمو مدة قصيرة من الزمن ، كما انها لا تقوم بدور فعال واساس في التحولات الكيميائية الحيوية في التربة للأسباب المذكورة في اعلاه .

٢ - تقسيم أحياء التربة المجهرية بالنسبة الى درجة الحرارة :

إن درجة الحرارة تتحكم في جميع العمليات الحيوية وهي بذلك تعد عاملاً أساساً يؤثر في أحياء التربة وقد أمكن اثبات علاقة الحرارة وكثافة المحتوى الحيوي للتربة من عديد من العلماء المختصين ، وهذه العلاقة لا تتضمن التأثير على الاعداد فقط بل يمتد تأثيرها الى احداث تغييرات وصفية في ميكروبات التربة .

نكل نوع من الكائنات الدقيقة درجة حرارة مثلى للنمو optimum temperature ، كما ان لكل نوع مدى أو نطاقاً حرارياً معيناً بحيث يتوق النشاط الحيوي للميكروب خارج هذا النطاق . وعلى ضوء ما تقدم يمكن وضع ميكروبات التربة في ثلاثة اقسام رئيسة تبعاً لدرجة الحرارة المثلى لها وللمدى الحراري الذي يمكنها النمو فيه :

أ - الانواع المحبة للحرارة المعتدلة Mesophiles

ان معظم احياء التربة المجهرية تعد من الانواع التي تعيش في حرارة متوسطة ، وتكون الدرجة المثلى لها تبين (٢٥ - ٣٥ °م) ويمكنها النمو ايضاً في درجات الحرارة الواقعة بين (١٥ °م) و (٤٥ °م) .

ب - الانواع المحبة للبرودة Psychrophiles :

وهي الميكروبات التي تنمو بصورة افضل في درجات الحرارة التي تقل عن (٢٠ °م) ، وهذا النوع من الاحياء غير شائع وجوده في التربة . ففي فصل الشتاء مثلاً يكون نشاط الاحياء في التربة راجعاً بصفة اساسية للانواع التي تتحمل البرودة وليس للانواع المحبة للبرودة فعلاً .

وهناك العديد من أحياء التربة لها القدرة على النمو في درجات الحرارة المنخفضة التي تقع ما بين درجة الانجماد و (٥ °م) ويزيد نشاطها وتكاثرها عند ارتفاع درجة الحرارة فوق هذه المعدلات .

جـ - الانواع المحبة للحرارة العالية : *Thermophiles*

هذه الانواع واسعة الانتشار وتنمو في درجات الحرارة ما بين (٤٥° م) و (٦٥° م) وبعض انواعها محب للحرارة العالية احياناً الى (٨٠° م) اذ لا يمكنها النمو في درجات حرارة اقل من (٤٠° م) . إضافة الى ذلك فان تأثير الحرارة يتحكم في معدل النشاط الحيوي للاحياء فتزداد معدلات النشاط بزيادة الحرارة حتى تصل الى اقصاها عند درجة الحرارة المثلى التي تلائم هذا النشاط الحيوي . وبغض النظر عن التباين في درجات الحرارة في المناطق المختلفة فان هناك اتجاهًا ثابتًا لزيادة النشاط الحيوي للميكروبات في الجو الدافئ .

أما بالنسبة الى ميكروبات التربة فان اكثرها من النوع الذي تحب الحرارة المعتدلة *Mesophiles* وتأتي الميكروبات التي تحب الحرارة الواطئة بالدرجة الثانية . أما الميكروبات المحبة لدرجات الحرارة العالية فتكون اعدادها واطئة جداً . ففي الصيف مثلاً تكون الطبقة السطحية للتربة (١٠ - ١٥ سم) ذات حرارة اعلى من الطبقات التي تليها في حين يكون سطح التربة في الشتاء ذا درجة حرارة اوطأ من طبقات التي تليه .

إن التغيرات البيئية الموسمية تعد ثانوية ومن الصعوبة تحديد تأثيراتها لتدخلها بتغيرات في درجات الحرارة والغطاء النباتي الذي يختلف حسب الفصول وبقيابا ذلك الغطاء في التربة .

إن المواد العضوية التي تتجمع في فصل الشتاء تبدأ بالتحلل في الفصول الدافئة كفصل الربيع مثلاً حيث تكون اعداد الاحياء المجهرية في اقصى كثرتها، على العكس من فصلي الصيف والشتاء حيث الحرارة العالية في الصيف والبرودة القارسة في الشتاء تقلل اعداد الاحياء المجهرية بوجه عام . كما ان بعض الظروف غير الاعتيادية للمواسم قد تؤثر في طبيعة التغيرات الموسمية للاحياء المجهرية ، ومثال ذلك عندما يكون الصيف حاراً مصحوباً ببعض الامطار والشتاء بارداً وجافاً قليل الامطار فان تلك التقلبات الموسمية تكون مشابهة لتأثير التقلبات بالحرارة والرطوبة وتأثيراتها في مستوى اعداد الاحياء المجهرية بالتربة . كذلك فان التقلبات الموسمية لا تؤثر في اعداد الاحياء المجهرية فحسب وانما تؤثر أيضاً في اختلاف انتشار مجاميع البكتريا وبقية الاحياء المجهرية . ومن خلال بعض الدراسات وجد أن هناك تبايناً موسمياً في نسبة الاكتينومايسيتات المنتشرة في التربة حيث ان نسبة مستعمراتها

النامية في الاطباق تصل الى ٦٠ ٪ من مجموع الاحياء المجهرية الكلية في فصل الصيف ، في حين تصل نسبتها في الربيع الى ٣٠ ٪ أما في الشتاء فتسبثها لا تزيد على ١٣ ٪ .

٢ - تصنيف مايكروبات التربة بالنسبة الى حاجتها للاوكسجين :

إن وجود الاوكسجين أو عدم وجوده يقسم ميكروبات التربة على ثلاثة مجاميع رئيسة والاساس في هذا التقسيم يرجع بالدرجة الرئيسة الى طبيعة نظم انتاج الطاقة . والمجاميع الرئيسة الثلاثة هي : -

أ - الميكروبات الهوائية الاجبارية : *Strict aerobes*

وهي الكائنات الدقيقة التي تحتاج الى الاوكسجين كمستقبل نهائي للالكترونات لغرض الاكسدة . وعندما تكون هذه هي الوسيلة الوحيدة لانتاج الطاقة فان هذا الكائن يكون من نوع الهوائي الاجباري . إن اغلب ميكروبات التربة هوائية ولكن الخواص الفيزيائية للتربة تؤثر في اعداد الميكروبات وخاصة في الاراضي الضحلة حيث ان هناك نسبة قليلة من الاوكسجين تزداد فيها الميكروبات الاجبارية الهوائية في الطبقة العليا من التربة والميكروبات الاجبارية اللاهوائية في الطبقات السفلى من التربة . وهناك عوامل عديدة تؤثر في تهوية التربة منها نسجة التربة *Soil Texture* ونوعية المعادن وارتفاع منسوب الماء الارضي والمادة العضوية إذ تتركز المادة العضوية عادة في الطبقة العليا من التربة وتعد مصدر طاقة للاحياء الدقيقة كما تعد مصطلحات لخواص التربة الفيزيائية ، لذا تقل اعداد الاحياء كلما تعمقنا في التربة نتيجة التغير في الخواص الفيزيائية للتربة . ومن الامثلة على اجناس بكتيرية هوائية اجبارية الاجناس ، *Thiobacillus* , *Nitrobacter* ,

Nitrosomonas إضافة الى ذلك فان جميع الاعفان ومعظم الطحالب تعد هوائية اجبارية وتموت أو تكون ساكنة بغياب الاوكسجين .

ب - الميكروبات اللاهوائية الاختيارية : *Facultative anaerobes*

وهي الكائنات الدقيقة التي تحصل على الطاقة بغياب الاوكسجين ويمكنها النمو ايضاً في وجود الاوكسجين أي انها تستطيع النمو في وجود الاوكسجين او عدم وجوده ، ويكون نموها عادة اكثر في الظروف الهوائية ومن الامثلة عليها بعض الانواع التابعة للجناس *Pseudomonas , Bacillus*

ج - الميكروبات اللاهوائية الاجبارية : *Strict anaerobes*

وهي الكائنات الدقيقة التي لها نظام انتاج الطاقة الذي لا يحتاج الى الاوكسجين اضافة الى ذلك فإن الاوكسجين يكون مسمماً لها . على الرغم من ان الاوكسجين يعد مستقبلاً شائعاً وكفياً للالكترونات فان بعض الكائنات ذات النواة البدائية لها القدرة على الافادة من بعض مستقبلات الالكترون اللاعضوية بعملية تعرف بالتنفس اللاهوائي ويمكن ان تكون التمرات مستقبلات الالكترون اللاعضوية اذا تختزل الى امونيا وثاني اوكسيد النتروز والنيروجين الجزيئي بوساطة البكتريا اللاهوائية الاجبارية *Pseudomonas denitrificans* أو يمكن ان تكون كبريتات اذا تختزل الى كبريتيدات بوساطة البكتريا اللاهوائية الاجبارية ، *Desulfovibrio desulfuricans* أو يمكن ان يكون مستقبل الالكترونات هو غاز ثاني اوكسيد الكاربون إذ يختزل الى غاز الميثان .

٤ - تصنيف احياء التربة المجهرية بالنسبة لمصور الطاقة والكاربون :

تصنف احياء التربة المجهرية بالنسبة لمصور الكاربون الى ،

أ - احياء ذاتية التغذية (*Autotrophs* . أو : *Lithotrophs*)

وهي الاحياء المجهرية التي تستعمل غاز ثاني اوكسيد الكاربون (CO_2) مصدراً للكربون .

ب - أحياء متغايرة التغذية (Heterotropha)

وهي الاحياء المجهرية التي تستعمل المركبات العضوية مصدراً للكربون .
وتصنف أحياء التربة المجهرية بالنسبة لمصدر الطاقة الى :

أ - أحياء ضوئية (Phototropha) :

كما هو واضح من اسمها فهي الاحياء التي يكون فيها الضوء مصدراً للطاقة .

ب - أحياء كيميائية (Chemotropha) :

وهي الاحياء التي تؤكسد المركبات العضوية أو المعدنية لتحصل على الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية المختلفة .

لذلك قسمت احياء التربة المجهرية بالنسبة للتداخل بين مصدر الكربون والطاقة على اربعة اقسام كالآتي : -


أ - أحياء ذاتية التغذية الضوئية (Photoautotropha) :

وهي الاحياء المجهرية الشبيهة بالنباتات إذ تستعمل ثاني اوكسيد الكربون كمصدر للكربون ، والضوء مصدراً للطاقة ، وهذه تضم جميع الطحالب وقسماً من البكتريا من ضمنها الجنس *Rhodospirillum* وكذلك البكتريا الازوانية ،
Purpl bacteria والبكتريا الخضراء ، green bacteria

ب - أحياء ذاتية التغذية الكيميائية (Chemoautotropha) :

· وهي الاحياء المجهرية التي تستعمل CO_2 مصدراً للكربون واكسدة المركبات المعدنية مصدراً للطاقة اللازمة لتحويل CO_2 الى كلوكوز ثم تحويله الى مركبات الخلية العضوية الاخرى . ويشمل هذا القسم عدداً من أجناس البكتريا الاقتصادية وهذه بدورها تقسم على مجاميع اخرى على اساس مركبات العناصر التي تقوم باكسدتها للحصول على الطاقة كما يأتي ، -

١ - البكتريا التي تؤكسد ايونات الامونيوم الى ايونات النترت للحصول على الطاقة مثل الجنس *Nitrosomonas* كما في المعادلة الآتية ،




٢ - البكتريا التي تؤكسد ايونات النترت الى ايونات النترات للحصول على الطاقة مثل الجنس *Nitrobacter* كما في المعادلة الآتية ،



٣ - البكتريا التي تؤكسد مركبات الكبريت الى ايونات الكبريتات للحصول على الطاقة مثل الجنس *Thiobacillus* كما في المعادلة الآتية ،



٤ - البكتريا التي تؤكسد ايونات الحديدوز المضافة للتربة بشكل كبريتات الحديدوز الى رواسب من هيدروكسيد الحديدك للحصول على الطاقة مثل الجنس *Ferrobacillus* :



ج - أحياء متغايرة التغذية كيميائياً : (Chemoheterotrophs)

وهي الاحياء المجهرية التي تستعمل المركبات العضوية مصدراً للكربون والطاقة وهذه تشمل جميع الفطريات والابتدائيات ومعظم البكتريا (وجميع الاكتينومييسيتات) . من الاجناس البكتيرية التابعة للاحياء المتغايرة التغذية كيميائياً ، هي : *Rhizobium* المثبت للنتروجين تعايشاً والجنس : *Pseudomonas* المثبت للنتروجين لا تعايشاً ، والجنس : *P. denitrificans* الذي يختزل النترات الى غاز النتروجين ، والجنس : *Micrococcus* الذي من أنواعه : *M. ureae* المحللة لليوريا ، والجنس : *Cytophaga* المحلل للسيللوز وغيرها .

د - أحياء متغايرة التغذية الضوئية : (photoheterotrophs)

وهذه لغرض اكمال التقسيم ولم يكتشف حتى الآن في التربة أي كائن حي يقع ضمن هذا القسم .

اضافة الى التقسيمات السابقة تقسم بكتريا التربة على قسمين ، مكونة للـسبورات **Spore-formers** مثل الجنس : **Bacillus** والجنس : **Clostridium** وغير مكونة للـسبورات ، **Non-spore formers** مثل جميع الاجناس الاخرى . كذلك توجد في التربة كما في أي وسط اخر بكتريا موجبة وسالبة لصبغة كرام .

ان مصادر الكربون قد تأتي من المركبات العضوية أو من CO_2 كما اشرنا سابقا . ان القسم الكبير من المركبات الغذائية العضوية في التربة تكون في حالة غير ذائبة او غير جاهزة للامتصاص من الاحياء اذ تستفيد منها الميكروبات بصورة تدريجية بعد انحلالها بواسطة الانزيمات التي تفرزها تلك الميكروبات وهي ما نعرف بـ **Exoenzymes** أي الانزيمات التي تفرزها الميكروبات الى الخارج وعكسها الانزيمات المعروفة بـ **Endoenzymes** أي الانزيمات التي تفرزها الميكروبات داخل الخلايا من اجل العمليات الايضية . وهناك انزيمات اخرى سيأتي ذكرها ضمن موضوع انحلال المواد العضوية .

الفصل الثالث

« مجاميع أحياء التربة » Soil Organisms

مقدمة :

تتكون بيئة التربة **Soil Ecosystem** من جزء عضوي **Organic phase** وجزء لاعضوي **Inorganic Phase** وجزء حيوي **Biological phase** . يشكل الجزء العضوي واللاعضوي المصدر الرئيس للكربون والطاقة والنيتروجين والعناصر الغذائية الأخرى الضرورية لازمة لنمو الجزء الحيوي وتكاثره من التربة . يتكون الجزء الحيوي من مجاميع رئيسة من الأحياء التي قسم منها مجهرية **Microorganisms** لا ترى الا بمساعدة المجهر المركب وأحياناً المجهر الإلكتروني وهذه تشمل البكتريا (بضمنها الأكتينومايسيتات) ، والفطريات ، والطحالب ، والابتدائيات والفيروسات . والقسم الثاني يمكن رؤيته بالعين المجردة **Macroorganisms** وهذا يشمل الديدان الأرضية ، والديدان السلكية ، والنيماتودات ، والنمل الأبيض ، والخنافس الخ .

وعلى الرغم من احتواء التربة على أحياء مجهرية متطفلة على جذور النباتات أو تصيب الحيوانات أو الإنسان ، الا أن الجزء الأكبر من الأحياء المستوطنة في التربة تقوم بانجاز وظائف مهمة جداً للتربة بصورة مباشرة وللإنسان بصورة غير مباشرة . من هذه الوظائف تحليل المخلفات العضوية النباتية أو الحيوانية الأصل وتكوين دبال التربة **Soil Humus** . ونواتج التحليل عبارة عن عناصر غذائية مختلفة منها الكربون - والنيتروجين - والكبريت - والفوسفور - والحديد - والمنغنيز الخ وكلها جاهزة للأجيال الجديدة من الأحياء الأخرى .

كذلك المواد العضوية السامة من المصادر النباتية أو المبيدات المضافة الى التربة بقصد السيطرة على الأحياء المرضية هي أيضاً يمكن أن تستعمل من أحياء أخرى كمصدر للكربون والطاقة فتتحلل الى مركباتها المعدنية الأصلية وبذلك تتحول من

مواد سامة الى مواد غير سامة . تجمعات التربة **Soil Aggregates** يمكن أن تتحسن من خلال النشاطات المختلفة للأحياء المجهرية وأقارائها .

ومن الممكن كذلك ان تتحول العناصر الغذائية غير الذائبة وغير الجاهزة للنبات الى شكل ذائب جاهز أو بالعكس . وأخيراً لانغالي اذا قلنا انه لولا وجود المجاميع المختلفة من الأحياء في التربة لما كانت هناك حياة على وجه الأرض وذلك من خلال تجهيزها المستمر لغاز ثاني أو أكسيد الكربون الذي يحتاجه النبات . لقد قدر بأن حوالي $\frac{1}{10}$ من غاز ثاني أو أكسيد الكربون الموجود في الجو تستعمله النباتات المختلفة سنوياً والطحالب في عملية التركيب الضوئي وأن حوالي ٧٠ ٪ أو أكثر من الكربون العضوي يرجع الى الجو كـ CO_2 من خلال النشاطات الحيوية للأحياء المجهرية الموجودة في التربة . يستنتج من ذلك أنه لولا عملية التحلل هذه لنفد غاز CO_2 من الجو خلال عشرات السنين (على فرض أن تكون هذا الغاز من عمليات حرق الأشجار والفحم قليلة جداً ولا يمكن أن تكفي لسد حاجة النبات) .

يمكن التعبير عن نشاط الأحياء بصورة عامة والمجهرية منها بصورة خاصة أحياناً بقياس أعدادها (جدول ١) ويجب أن نلاحظ أنه في هذا الجدول قد تم قياس العدد التقريبي للبكتيريا (والاكتينومايستات) والفطريات (والخمائر) مبني على أساس عدد الخلايا الحية بالأطباق **Plate Count** التي كما هو معروف لا تعطي العدد الحقيقي لما هو موجود أصلاً في التربة وأن طرقياً أخرى حديثة مبنية على أساس قياس كمية الـ **ATP** أو الكتلة الحية **biomass** أو العد المجهرى يمكن أن تعطي قيماً كبرى من ذلك . كذلك يمكن التعبير عن نشاط هذه الأحياء باستعمال مصطلح الكتلة الحية للتربة **Soil Biomass** التي يمكن اعتبارها مؤشراً لمدى خصوبة التربة . تقدر الكتلة الحية أو الوزن الحي للأحياء الموجودة في التربة بحوالي ٠.٥ - ٤ طن متري أو أكثر لكل هكتار من التربة (على عمق ١٥ سم) . يجب أن نلاحظ أن الوزن هذا يتوقف على عوامل كثيرة سوف تشرح لاحقاً . كذلك وعلى الرغم من تغلب البكتيريا على الفطريات بالعدد في بعض الترب بغض النظر عن الفيروسات التي تكون أعدادها اكبر بكثير الا أن الكتلة الحيوية للفطريات تكون اكبر من كتلة البكتيريا بسبب التفرعات الكثيرة للهيفات الفطرية . فيما يلي شرح مفصل لمجاميع التربة من الأحياء المختلفة ذات العلاقة بانتاج الزراعي :

جدول (١) الأعداد التقريبية للأحياء الشائعة في التربة (مارتن ١٩٧٧)

مجموعة الأحياء المجهرية* العدد التريبي / ع تربة جافة	
البكتريا	$10^8 \times 3 - 10^9 \times 5$
الأكتينومييسيتات	$10^6 \times 1 - 10^7 \times 2$
الفطريات	$10^4 \times 5 - 10^5 \times 9$
الخمائر	$10^3 \times 1 - 10^4 \times 1$
الطحالب	$10^2 \times 1 - 10^3 \times 5$
الابتدائيات	$10^1 \times 1 - 10^2 \times 5$
النيماتودا	٥٠ - ٢٠٠

١ - مجموعة بكتريا التربة *Soil Bacteria*

البكتريا : تعريفها ووجودها :

البكتريا كائنات حية مجهرية تصنف ضمن المملكة النباتية وأحياناً ضمن مملكة البروتستا وهي موجودة في كل مكان كالهواء ، والتربة وفي المياه وغيرها من البيئات قسم منها تصنع غذاءها بنفسها بعملية التركيب الضوئي وقسم منها تحتاج الى غذاء جاهز. منها ماهو متحرك منها ماهو غير متحرك بعضها هوائية إجبارية أو لاهوائية إجبارية أو هوائية اختيارية . تختلف بالشكل والحجم من كروية لايزيد قطرها على (٢) ميكرون (١) ميكرون = $\frac{1}{1000}$ ملمتر) الى عصوية قصيرة لايزيد طولها على الميكرون الواحد الى عصوية كبيرة قد يصل طولها بضع ميكومترات .

* اضافة الى ماهو مذكور في الجدول تحوي الترب أعداد كبيرة من الأعفان اللزجة (Slime molds) ، وفاجات البكتريا (bacteriophages) ، والمفصليات ، وديدان الأرض ، وحشرات مختلفة ، وأحياء أخرى

تحتوي جميع الترب على بكتيريا ذاتية التغذية تحصل على الكربون من CO_2 والطاقة من ضوء الشمس (Photoautotrophs) وأخرى عضوية التغذية (Chemoheterotrophs) وثالثة معدنية التغذية تحصل على الكربون من CO_2 والطاقة من أكسدة المركبات المعدنية (Chemoautotrophs) .

وكذلك توجد في التربة بكتيريا تلائمها الحرارة العالية (Thermophiles) وأخرى تلائمها الحرارة المتوسطة Mesophiles وثالثة تلائمها الحرارة المنخفضة Psychrophiles . كما توجد بكتيريا مكونة للسبورات وأخرى غير مكونة لها . وفي التربة أيضاً بكتيريا محللة للسيلولوز أو مؤكدة للكبريت أو مثبتة للنيتروجين أو مختزلة للنترات والكبريتات والحديدك وأشكال أخرى كما موضحة في (جدول رقم ٢) .

طرق عد بكتيريا التربة :

استعملت طرق كثيرة لعد بكتيريا التربة ولكن ما من طريقة واحدة تعطي البعد الحقيقي . لما هو موجود في التربة . وفيما يأتي شرح موجز لقسم من هذه الطرق مع ميزاتها وعيوبها .

من المحتمل أن تكون أقدم هذه الطرق هي طريقة العد المجهرى المباشر Direct Microscopic Count . تتلخص هذه الطريقة بعمل تخافيف من التربة بالماء المعقم ثم يؤخذ حجم معروف (٠.١ مل مثلاً) من أحد التخافيف 10^{-1} - 10^{-6} ، ويفرش على مساحة معروفة من شريحة زجاجية . بعد التجفيف والتثبيت تصنع بأحد الصبغات ثم تحسب عدد الخلايا البكتيرية الموجودة في المجال الميكروسكوبى باستعمال المجهر الضوئى الأعتيادي أو المجهر الألكترونى . عدد المجالات المجهرية معروف - المساحة معروفة - حجم العينة معروف - التخفيف معروف .

من هذه المعلومات يمكن حساب عدد البكتيريا في غرام واحد من التربة الرطبة الذي يمكن تحويله الى غرام تربة جافة . ويمكن الاستعاضة عن الشريحة الزجاجية الأعتيادية بشريحة مخصصة لأجراء عملية العد تسمى شريحة عد خلايا الدم (Haemocytometer) . ميزة هذه الطريقة سهولتها ويمكن لأي مختص بعلم الأحياء المجهرية أن يجريها من دون صعوبات ولكن لها عيوب منها ، أنها تعطي

جدول (٢) أعداد المجاميع الفسجية من البكتريات في ترب مختلفة (خلية / غم تربة) (بلزار ورید ، ١٩٧٧)

نوع التربة	حديقة Garden	حقل Field	مسطحات خضراء غابات Forest Meadow	مالحة Marshland
المجاميع الفسجية				
نسبة الرطوبة	١٧,٩	١٨,١	١٧	٢١,٢
نسبة كاربونات الكالسيوم	٤,٧	٥٠	١١,٤	٧,٦
مجموع البكتريا الهوائية	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
مجموع البكتريا اللاهوائية	٢٨٠,٠٠٠	١٢٧,٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠
بكتريا تحليل اليوريا	٢٧,٠٠٠	٨,٥٠٠	٥,٢٠٠	٨,٨٠٠
بكتريا تخمزل النيتروجين	٨٢٠	٤٠٠	٨٥٠	٢٨٠
بكتريا تحليل البكتين	٥٢٥,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠
بكتريا تحليل البروتين (لاهوائية)	٢٥,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٦,٨٠٠	١٧,٠٠٠
بكتريا تحليل السيللوز (لاهوائية)	٣٦٧	٢٥٠	٢,٦٧	١٨
بكتريا تثبيت النيتروجين (آزوتوباكتر)	٢,٢٥٠	١,٨٨٥	١٨	١٧
بكتريا تثبيت النيتروجين (كلوستريد يوم)	٥,٥٠٠	٧٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٢,٠٢٠
بكتريا التآرت	٨٨٠	١,٧٠١	٢٧	٢٤

عدداً أكبر بكثير من العدد الحقيقي للخلايا البكتيرية الموجودة في التربة لصعوبة التفريق تحت عدسة المجهر بين الخلايا التي كانت حية والخلايا التي كانت ميتة قبل التحضير . كذلك صعوبة التمييز بين خلية البكتيريا وحببية الطين أو المادة العضوية .

طريقة أخرى استعملت لقياس عدد البكتيريا الحية فقط **Viable count** باستعمال اوساط غذائية متخصصة تسمى **Standard Plate Technique** وذلك بعمل تخافيف من التربة في الماء المعقم (١٠^{-١} , ١٠^{-٢} , ١٠^{-٣}) ثم زراعة حجم معين من كل تخفيف (مل واحد) في وسط غذائي ملائم مع ملاحظة وجود عدد من المكررات (٤ أو ٥ مكررات لكل تخفيف) . بعد التحضين مدة من الزمن (٣ أيام أو أكثر) يتم حساب عدد المستعمرات النامية التي يساوي عددها عدد الخلايا البكتيرية التي كانت موجودة في مل واحد من التخفيف على فرض ان كل مستعمرة نمت من خلية واحدة فقط . يحول هذا العدد الى غرام تربة رطبة ثم الى غرام تربة جافة وذلك بضرب عدد المستعمرات في مقلوب التخفيف الذي جاءت منه . هذه الطريقة تعطي أقل من العدد الحقيقي لبكتيريا التربة وذلك للأسباب الآتية :

- ١ - عدم التجانس في أخذ عينة التربة من الحقل ويمكن التغلب عليها بأخذ عينات كثيرة وخلطها لكي تصبح ممثلة للحقل .
- ٢ - عدم التجانس عند تحضير التخافيف وذلك لأن قسماً من البكتيريا تكون نامية أصلاً في التربة بشكل مستعمرات ومن الصعوبة تفريقها عن بعضها مهما كانت عملية الرج كفاءة .
- ٣ - عدم وجود وسط غذائي يلائم جميع الأجناس والأنواع البكتيرية الموجودة في التربة .
- ٤ - تكون المستعمرة البكتيرية النامية أحياناً على سطح الوسط الغذائي ناتجة من أكثر من خلية واحدة .

طريقة العد الأكثر احتمالاً **The Most Probable Number Technique** هي أيضاً استعملت في إيجاد عدد أجناس معينة من البكتيريا كبكتيريا النترجة مثلاً . تتلخص هذه الطريقة بعمل تخافيف من التربة بالماء المعقم (١٠^{-١} , ١٠^{-٢} , ١٠^{-٣}) .

ثم تلقيح أنابيب تحوي بيئة ملائمة لذلك الجنس من البكتريا بـ ١ مل من أحد هذه التخافيف (على الأقل ٥ مكررات لكل تخفيف) . بعد التحضين تحت ظروف ملائمة مدة من الزمن (أسبوع أو أكثر حسب نوع البكتريا) تفحص كل أنبوبة من كل تخفيف لمشاهدة النمو البكتيري (تحول الوسط الغذائي من رائق الى عكر) أو تفحص مجهرياً ثم نحصل على عدد الأنابيب الموجبة (التي أعطت نمواً) من كل تخفيف . وبالرجوع الى جداول أحصائية مخصصة لذلك يمكن معرفة عدد البكتريا لكل غرام تربة .

طريقة أخرى وصفية استعملت لدراسة الحياة الطبيعية للبكتريا بصورة خاصة وبينها وبين الأحياء الأخرى بصورة عامة مباشرة في التربة . وهذه الطريقة قد طورت من العالمين روزي وكولودني وسميت **Rosst and Cholodny Buried Slide Technique** . تتلخص هذه الطريقة بذهن شريحة زجاجية أو اثنتين متلاصقتين بعضهما ببعض في التربة في (بيكر) زجاجي بعد التحضين مدة أسبوع أو أكثر تؤخذ الشريحة وتنظف جيداً من حبيبات التربة العالقة بها ثم يصنع الفشاء الميكروبي النامي عليها بصبغة معينة كصبغة الـ **Phenolic Rose Bengal** ثم يفحص تحت المجهر .

إن تقديرات عدد البكتريا في تربة ما يختلف باختلاف طريقة التقدير فطريقة عد الخلايا الحية بالأطباق تعطي مئات الألوف حتى ٢٠٠ مليون خلية بكتيرية لكل غرام تربة جافة . أما طريقة العد مجهرياً لنفس العينة من التربة فأنها تعطي بحدود عشر مرات أو مئة مرة أكثر من ذلك . لذلك فالطريقة الأولى تعطي فقط بحدود ١٠ ٪ مما نحصل عليه بالطريقة الثانية ولكن ما زالت الأولى هي المفضلة للعيوب الموجودة في الطريقة الثانية المذكورة سابقاً .

يفضل الكثير من الباحثين استعمال الأوساط الغذائية المنتخبة أو الغنية لإيجاد أعداد أنواع محددة من البكتريا . وميزة الوسط الغذائي المنتخبة أنه يحوي على مواد معينة تساعد على نمو نوع محدد من البكتريا دون الأنواع الأخرى . وبهذه الطريقة تمت دراسة أعداد البكتريا المحللة لليوريا - المحللة للبروتين - للسيللوز - للبكتين الخ وذلك بأضافة اليوريا - البروتين - السيللوز - أو البكتين الى الوسط الغذائي قبل التلقيح بتخفيف التربة لجعله منتخباً لمساعدة نمو البكتريا المحللة لهذه المواد .

تعد الدراسات الحديثة عن نشاط البكتيريا في تربة ما بتعبير آخر هو الكتلة الحية (Biomass) لكل هكتار من التربة أو لكل دونم حجم أو وزن. وذلك بتحويل الأعداد التي نحصل عليها بالطرق السابقة الى حجم من التربة الذي يشغله ذلك العدد حسب ما يأتي ،

نفرض إن عدد البكتيريا كان 10^8 لكل سم³ من التربة ولنفرض أن حجم الخلية البكتيرية كمعدل هو 1 مايكروميتر مكعب . فالحجم الذي يشغله هذا العدد من البكتيريا بالنسبة لحجم التربة يحسب كما يأتي ،

$1 \text{ سم}^3 = 1000 \times 1000 \times 1000 = 10^9$ مايكروميتر مكعب. نسبة حجم البكتيريا $\frac{10^8}{10^9} \times 100 = 10\%$ من حجم التربة. لو كان العدد 10^8 فإنه يشغل حجماً قدره 10% من حجم التربة وهكذا بعمليات حسابية بسيطة يمكننا إيجاد حجم البكتيريا في أي حجم من التربة . ولتحويل العدد الى وزن أو كتلة حية نجري الحسابات التالية نفرض أن معدل وزن الخلية البكتيرية الرطب 1.5×10^{-10} غم . فإذا كان عدد البكتيريا في تربة ما 10^8 فإن وزنها يساوي $1.5 \times 10^{-10} \times 10^8$ غم . لتحويلها الى نسبة مئوية فنضرب في 100 فتكون 0.15% : لتحويلها الى وزن هكتار من التربة نحصل على وزن 300 كغم كتلة حية من البكتيريا (على أساس وزن الهكتار من التربة يساوي 200000 كغم على عمق 15 سم) . لتحويلها الى دونم من التربة نقسم على 4 فنحصل على وزن قدره 75 كغم: لو كان عدد البكتيريا 10^8 فيكون الوزن 3000 كغم / هكتار أو 750 كغم / دونم . تقادير الكثير من الباحثين تشير الى تقديرات تتراوح بين 0.1% - 0.4% كتلة حية أي من 100 كغم الى 4000 كغم / هكتار من التربة . من تقديرات الكتلة الحية ويمكننا معرفة خصوبة التربة فيصورة عامة كلما زادت كتلة البكتيريا في تربة ما زاد نشاطها وكلما كانت التربة اكثر خصوبة أيضاً .

لا يمكن للبكتيريا الغير المتحركة ان تكون حرة في محلول الترب ويجب ان تلتصق بحبيبة طين او مادة عضوية عن طريق روابط الكترولستاتية **Electrostatic Bonding** حيث يحمل الطين أو المادة العضوية شحنات سالبة تنجذب لها الخلايا البكتيرية التي تحمل شحنات موجبة في بعض التراكيب المكونة لجدارها فتلتصق بها ولا يمكن للماء المار من خلال التربة الى الماء الأرضي أن يفصلها عن الطين أو المادة العضوية .


٢ - مجموعة أكتينومايسيتات التربة *Soil Actinomycetes*

الأكتينومايسيتات أحياء مجهرية وحيدة الخلية هوائية (عدا الجنس *Actinomyces*) الذي يشكل مايسيليوم متفرعاً شبيهاً بمايسيليوم الفطريات عدا كونه دقيقاً وقطره يتراوح بين ٠.٥ - ١ مايكرون وقد يصل أحياناً إلى ٢ مايكرون . تتكاثر الأكتينومايسيتات بتجزء الهيفات إلى أجزاء كروية أو أسطوانية وقسم منها تتكاثر بتكوين سبورات لا جنسية (كويندبات *Conidia* أو السبورات الموجودة في حافظة السبورات (*sporangiospores*) . المستعمرات النامية على سطح البيئة الفغائية تشبه مستعمرات الفطريات إضافة إلى أنها لا تكون عكازة في الأوساط الفغائية السائلة . لهذه الأسباب اعتقد سابقاً أن الأكتينومايسيتات هي فطريات للتشابه الكبير بين الأثنين شكلاً وتكاثراً ولكن الدراسات أثبتت بما لا يقبل الشك بأنها بكتيريا . فخليتها التي هي من نوع بدائية النواة *Procaryote* وغلافها الذي يتركب كيميائياً من معقدات تتكون من ارتباط كل من السكريات والسكريات الأمينية والأحماض الأمينية (*Peptidoglycan*) ، وبذلك فهو يشابه تماماً غلاف البكتيريا الموجبة لصيغة كرام . أضف إلى ذلك التشابه بينها وبين البكتيريا الأخرى من حيث : حساسيتها للمضادات الحيوية وللبيكتريوفاج وملاءمتها للترب القاعدية وقطر الخلية الدقيق . كل هذه الأمور أدت إلى تصنيفها ضمن البكتيريا وليس الفطريات . في الوقت الحاضر تشكل الرتبة *Actinomycetales* أحد الرتب العشر التي تصنف لها البكتيريا .

تكثر الأكتينومايسيتات في التربة وفي خليط المخلفات العضوية *Composts* وفي الأنهار وحتى في أسفل البحيرات . أعدادها في التربة تأتي بعد أعداد البكتيريا الأخرى وأحياناً تكونان متكافئتين في العدد . معظم الأكتينومايسيتات ورمية التغذية *Saprophyte* تعيش على الأنسجة العضوية الميتة ولكن قسماً قليلاً من الأنواع تسبب أمراضاً للإنسان والحيوان والنبات .

من الممكن إجراء عملية عد لأكتينومايسيتات التربة بطريقة العد المجهري المباشر أو بطريقة الأطباق لعد الخلايا الحية ولكن الأخيرة هي التي تعطي العدد التقريبي لما هو موجود في التربة . لغرض دراسة أعدادها وأجناسها المتغلبة في تربة ما يستعمل أحياناً نفس الوسط الفغائي المستعمل في دراسة بكتيريا التربة الأخرى بشرط أن تكون فترة التحضين أطول بسبب النمو البطيء لها . تشكل مستعمرات

الأكتينومايسيتات النامية في هذا الوسط بين ١ - ٥٠ ٪ من المستعمرات النامية ولكن كمعدل بحدود ١٠ ٪. لذلك يفضل استعمال وسط غذائي متخصص لدراسة الأكتينومايسيتات وفي الوقت الحاضر يستعمل الكيتين مصدرراً للكاربون والطاقة من كثير من أجناس أكتينومايسيتات التربة. لذلك تضاف هذه المادة الى الوسط الغذائي إضافة الى احتواء الوسط على مواد ممانعة لنمو البكتريا الأخرى والفطريات وتكاثرها. ومن مشاكل عملية العد بالأطباق إضافة الى ما ذكر سابقاً صعوبة معرفة ما إذا كانت المستعمرة النامية قد أتت من كونيديا أو من هايفاً أو من جزء من مايسيليوم. بصورة عامة وكمعدل عددها يتراوح بين ١٠ - ٨١٠ خلية تكاثرية / غم تربة. بعض أجناس أكتينومايسيتات التربة الشائعة موضحة في شكل (١)



شكل (١) بعض أجناس أكتينومايسيتات التربة الشائعة .

العوامل التي تؤثر في وجود بكتيريا التربة :-

١ - المادة العضوية

معظم بكتيريا التربة (وجميع الاكتيوماسيتات) تصنف بالنسبة لمصدر الكربون والطاقة بأنها عضوية (متباينة) التغذية أي تستعمل المادة العضوية في بناء بروتوبلازم الخلية . أعداد البكتيريا وكتلتها في الترب المعدنية تتناسب طردياً مع محتواها من المادة العضوية فالتربة الغنية بالدبال Humus تحوي أعداداً كبيرة من البكتيريا بشرط أن تكون العوامل الأخرى ملائمة . إن إضافة المواد الكربونية بصورة مخلفات عضوية نباتية أو حيوانية لها تأثير إيجابي في أعدادها في التربة

فإضافة هذه المخلفات الى تربة ما تشجع نمو البكتيريا والفطريات أولاً ثم تظهر الأكتيوماسيتات في المراحل الأخيرة من التحلل وذلك بعد أستهلاك البكتريا والفطريات للأجزاء العضوية السهلة .

. إن سبب زيادة أعداد الخلايا البكتيرية في الطبقات السطحية من التربة (منطقة الرايزوسفير Rhizosphere) يعود الى كثرة المادة العضوية فيها التي مصدرها بقايا النباتات أو الحيوانات التي تضاف الى التربة وكذلك الإفرازات المستمرة لجذور النباتات النامية من احماض أمينية ومنظمات نمو وفيتامينات وإفرازات أخرى ، إضافة الى الخلايا الميكروبية والحيوانات الصغيرة الميتة التي هي أيضاً يمكن أن تستعمل غذاءً عضوياً للحياء الأخرى . وبصورة عامة يمكن القول أن أية عملية تزيد من المصدر العضوي في التربة سوف تزيد من أعداد بكتريات التربة .

٢ - العناصر المعدنية

البكتيريا كأي كائن حي آخر بحاجة الى العناصر المعدنية المختلفة اضافة الى المادة العضوية . فهي بحاجة الى النيتروجين ، والفوسفور ، والبوتاسيوم ، والكالسيوم ، والصوديوم ، والمغنيسيوم ، والحديد ، والموليبيديوم ... الخ . اعداد بكتيريا التربة بصورة خاصة والحياء الأخرى بصورة عامة تتأثر تأثراً مباشراً بإضافة الاسمدة اللاعضوية بقصد تغذية النبات . وفي بعض الأحيان يكون للأسمدة النيتروجينية تأثير سلبي في بعض الأجناس من البكتيريا . فتكون غاز الأمونيا من

تحلل سماد اليوريا له تأثير قاتل لا بسبب عنصر النيتروجين نفسه فحسب ولكن بسبب الحموضة التي تنتج من أكسدة الأمونيوم الى نترات بعملية الترجمة .

٢ - رطوبة التربة

البكتريا بحاجة الى رطوبة لبناء بروتوبلازم الخلية وللتكاثر والنمو . زيادة الرطوبة (أمطار غزيرة أو الري المستمر) تؤثر في أعدادها بصورة غير مباشرة إذ تولد ظروفًا لا هوائية تساعد على نمو البكتريا اللاهوائية فقط أما البكتريا التي تحتاج الى أوكسجين لنموها فهي إما أن تموت أو تبقى ساكنة لحين توفره . وأحسن رطوبة ملائمة لنمو البكتريا الهوائية ونشاطاتها بين ٥٠ - ٧٥ ٪ من السعة التشبعية للتربة (WHC) . معظم أكتينومايسيتات التربة لا يمكن أن تنمو عندما تكون نسبة الرطوبة بين ٨٥ - ١٠٠ ٪ من السعة التشبعية لأن معظمها هوائية ، جفاف التربة له أيضاً تأثير سلبي في أعدادها ولكن تأثيره يكون أقل في أكتينومايسيتات التربة لامكانها أن تتحمل ظروف جفاف أكثر وقد تصل نسبتها الى حد ٩٠ ٪ من البكتريا الحية في المناطق الجافة وخصوصاً الصحراوية منها ، في هذه الحالة تتغلب الأجناس التي تتكاثر بالكونيديات وخصوصاً الجنس *Streptomyces* لأن الجزء الخضري بحاجة الى رطوبة للنمو والتكاثر .

٤ - درجة الحرارة

الحرارة من العوامل المهمة التي تؤثر في الفعاليات الحيوية ونشاطات أنزيمات الخلية . ولكل جنس من البكتريا درجة حرارة ملائمة له وإذا زادت أو أنخفضت عن ذلك فأنها تؤثر في نموه وتكاثره . معظم بكتريا التربة تقع ضمن المدى الحار المتوسط (Mesophiles) وأحسن نمو لها يكون بين ٢٥ - ٣٥ °م ويمكنها ان تنمو في درجة حرارة بين ١٥ - ٤٥ °م . بعض الأنواع البكتيرية تعطي أحسن نمو لها عند درجة حرارة أقل من ٢٠ °م (Psychrophiles) . بكتريا حقيقية من هذا النوع غير موجودة في التربة لأن البكتريا التي تنمو وتتكاثر في فصل الشتاء يعد من القسم السابق ولكنها مقاومة للبرودة . قسم من البكتريا تفضل درجات الحرارة المرتفعة (Thermophiles) التي تعطي أحسن نمو لها بين ٤٥ - ٦٠ °م . قسم منها لا تنمو عند درجة حرارة أقل من ٤٠ °م . ولا يمكن للأكتينومايسيتات من نوع

Mesophiles أن تنمو في درجة حرارة أقل من 5°C ولا أعلى من 29°C والمدى الحراري لها بين $28 - 37^{\circ}\text{C}$. بعض الأجناس تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتصنف ضمن الـ **Thermophiles** مثل الجنس *Thermomonaspora* و *Thermoactinomyces* .

٥ - درجة تركيز أيون الهيدروجين (pH) للتربة

الترب ذات الظروف الحامضية العالية أو القلوية العالية تؤثر في الكثير من الأنواع البكتيرية . الترب المتعادلة هي الملائمة لنمو معظم أنواع البكتيريا المعروفة . عند رقم pH ٥-٥,٥ تبدأ أعدادها بالتقصان وعند رقم pH ٤ يقل العدد بشكل ملحوظ . بصورة عامة يمكن القول أن البكتيريا تتغلب على الفطريات عدداً ووظيفة عند رقم pH ٧ أو أكثر قليلاً . وتتغلب الفطريات على البكتيريا عدداً ووظيفة عند رقم pH أقل من ٥,٥ . إضافة مادة اللايم (كاربونات الكالسيوم) إلى الترب الحامضية يزيد من أعداد بكتيريا التربة . كثير من أكتينومايسيتات التربة لا يمكن أن تنمو عند pH أقل من ٥ وفي الترب الحامضية لا تزيد أعدادها على ١٪ من الخلايا الحية أما في الترب القلوية فقد تصل أعدادها حتى ٩٥ ٪ من الاحياء الأخرى . في المناطق التي يكثر بها مرض جرب البطاطا *Potato scab* الذي يسببه النوع *Streptomyces scabie* يضطر المزارعون إلى رفع حموضة التربة (خفض رقم الـ pH) بإضافة الكبريت كوسيلة ناجحة لمنع انتشار المرض . كما أن إضافة الاسمدة الامونيومية يمكن أن تزيد من حموضة التربة بسبب أكسدة الامونيوم إلى نترات .

٦ - العمليات الزراعية

عمليات حراثة التربة لها تأثير مباشر أو غير مباشر في نمو بكتيريا التربة وإعدادها فهي تحسن تركيب التربة ونفاذيتها وبالتالي فهي تساعد على حركة الهواء والماء فتولد ظروفاً هوائية تساعد على زيادة أعداد البكتيريا الهوائية كما تعمل الحراثة أيضاً على قلب بقايا النباتات والأدغال داخل التربة فتوفر مصدراً غذائياً جيداً للبكتيريا وبصورة عامة تكون أعداد الخلايا البكتيرية أكثر في التربة المحروثة عنها في التربة البكر وفي التربة المزروعة بمراع أو حشائش عن غير المزروعة .

٧ - عمق التربة :

العمق داخل مقطع التربة من العوامل الاخرى المهمة التي تؤثر في البكتريا ونشاطاتها . كما قلنا سابقاً تتركز البكتريا بصورة خاصة والاحياء الاخرى بصورة عامة في الخمسة عشر سنتمراً الاولى من سطح التربة بسبب زيادة المادة العضوية . وتقل على السطح مباشرة في الترب غير المزروعة او المزروعة بمحاصيل بسبب التأثير القاتل لاشعة الشمس . كذلك تقل كلما تعمقنا في التربة (جدول رقم ٣) بسبب قلة المادة العضوية والاكسجين وزيادة ثاني اوكسيد الكربون . اما في تربة الغابات المظللة او ترب البساتين او ترب المسطحات الخضراء فيكون عدد البكتريا كبيراً في الطبقة السطحية . في الترب العضوية تختلف الصورة حيث تكون اعداد البكتريا كبيرة جداً حتى على عمق ١٦٠ سم من السطح . اعداد الاكتينومايستات هي ايضاً تقل كلما تعمقنا في التربة ولكن نسبتها تكون اكبر من انواع البكتريا الاخر وذلك بسبب إنتقال الكونيديات الى اعماق التربة بواسطة الماء حتى الافق الثالث من قطاع التربة (طبقة C) العميقة فإن عددها يتراوح بين ٢١٠ - ٩١٠ لكل غرام تربة

جدول (٢) توزيع الاحياء المتجهرية في الطبقات المختلفة لقطاع التربة (الكسندر ١٩٧٧) .

العدد لكل غرام تربة $\times 10^3$					
العمق سم	البكتريا الهوائية	البكتريا اللاهوائية	الاكتينومايستات	الفطريات الطحالب	
٨ - ٣	٧٨٠٠	١٩٥٠	٢٠٨٠	١١٩	٢٥
٢٥ - ٢٠	١٨٠٠	٣٧٩	٢٤٥	٥٠	٥
٤٠ - ٣٥	٤٧٢	٩٨	٤٩	١٤	٠,٥
٧٥ - ٦٥	١٠	١	٥	٦	٠,١
١٤٥ - ١٣٥	١	٠,٤	—	٣	—

٨ - ملوحة التربة :

كلما زادت ملوحة التربة كان لها تأثير سلبي على الاحياء المجهرية بصورة عامة . ويمكن القول ان البكتريا يمكن ان تتحمل تراكيز عالية من الملوحة نوعا ما حتى ٨ ملليموز / سم من التوصيل الكهربائي . اما الاكتينومايسيتات فيمكنها ان تتغلب على البكتريا الاخرى عند زيادة ملوحة التربة .

٩ - فصول السنة :

في فصل الربيع والخريف يزداد عدد البكتريا بسبب درجة الحرارة الملائمة ووجود الرطوبة وبقايا المحاصيل التي تغلب في التربة لتصبح فيما بعد غذاءاً جاهزاً للاحياء المجهرية . وعلى العكس ففي فصل الشتاء البارد او فصل الصيف الحار فإن معظم البكتريا والاكتينومايسيتات لا تموت تحت هذه الظروف ولكنها تبقى حية ساكنة او قليلة النشاط لتقاوم فترة البرودة او الانجماد القاسية او الحرارة العالية . وعلى الرغم من ان قسماً منها تموت في هذه الظروف الا انه وجد ان اعدادها في الربيع تساوي عدد ما كانت عليه في الخريف تقريباً . وحتى في المناطق القطبية التي يطول فيها فصل الانجماد بين ٩ - ١٠ اشهر من السنة ودرجة الحرارة لا ترتفع اكثر من ١٠ م خلال الثلاثة اشهر الباقية فقد وجد ان عدد البكتريا يكون بحدود المليون خلية لكل غرام من التربة . وتكون - بالطبع - ساكنة في فصل الانجماد وتصبح نشيطة خلال اشهر الربيع الدافئة .

تصنيف بكتريا التربة :

حسب ما ورد في كتيب (Bergey's Manual) جميع البكتريا Class: Schizomycetes يقع ضمن المملكة النباتية Kingdom: Planta (أحياناً Kingdom: protista) التي تقسم على عشر رتب . ليست كلها موجودة في التربة ولذلك سنركز في موضوعنا هذا على الرتب التي توجد اجناسها في معظم التربة . وكذلك سوف يكون التركيز على بعض الميزات التي يتميز بها الجنس عن الآخر .

الرتبة الاولى : *Pseudomonadales*

البكتريا التابعة لهذه الرتبة تكون ذات شكل عصوي - سالبة لصبغة كرام - متحركة بواسطة سوط واحد (*Monotrichous*) او اكثر من طرق واحد (*Lophotrichous*) او من طرفي الخلية (*Amphitrichous*) غير مكونة للسبورات . قسم منها *Chemoautotrophs* وقسم آخر *Chemoheterotrophs* وقسم ثالث *Photoautotrophs* . الاجناس الموجودة في التربة تابعة للموائل التالية ،

العائلة الاولى *Pseudomonadaceae* : متمثلة بالاجناس *Pseudomonas* .

Acetobacter , *Xanthomonas* . جميعها *Chemoheterotrophs* . بصورة عامة تحوي الترب ملايين من الخلايا التابعة لانواع عديدة من الـ *Pseudomonas* لكل غرام تربية قد تصل نسبة وجودها في بعض الترب بين ٢ - ١٥٪ . معظمها هوائية ووظيفتها أكسدة وتحليل المركبات العضوية . قسم من الانواع لاهوائية . اجبارية مثل *P. denitrificans* التي تختزل النترات الى غاز النيتروجين .

العائلة الثانية *Thiobacteriaceae* : متمثلة بالجنس *Thiobacillus* وبالأخص *T. thiooxidans* التي تقوم بأكسدة الكبريت S الى كبريتات . SO_4^{2-} *T. ferrooxidans* التي تقوم بأكسدة الحديدوز الى حديديك . كلا النوعين *Chemoautotrophs* .

العائلة الثالثة *Nitrobacteriaceae* : متمثلة بالجنس *Nitrosomonas* التي تقوم بأكسدة الامونيوم NH_4^+ الى نترات NO_3^- والجنس *Nitrobacter* التي تقوم بأكسدة النترات الى نترات NO_3^- كلاهما ايضاً *Chemoautotrophs* .

العائلة الرابعة *Caulobacteriaceae* : متمثلة بالجنس *Caulobacter* والجنس *Gallionella* ولكليهما ساق هو عبارة عن ترسبات من هيدروكسيد الحديد (لانهما يؤكسدان الحديدوز الى حديديك) ولذلك يسميان (*Stalked bacteria*) . قد تصل اعداد هذه الاجناس في بعض الترب الى حد ٢٥٠,٠٠٠ خلية لكل غرام تربية .

الرتبة الثانية **Hyphomicrobiales** : متمثلة بالجنس **Hyphomicrobium** الذي يتكاثر بالتبرعم . توجد بصورة رئيسية في البيئات المائية ولكن وجدت أيضاً في التربة .

الرتبة الثالثة **Eubacteriales** او البكتيريا الحقيقية : معظم بكتيريا التربة تابعة لهذه الرتبة . جميعها **Chemoheterotroph** وقسم منها طفيلية . للسهولة سوف نقسمها على المجموعات الآتية :

المجموعة الاولى : العوائل التي تكون الاجناس التابعة لها عصوية الشكل - سالبة لصبغة كرام - متحركة بواسطة مجموعة من الاسواط من جميع اطراف الخلية **Peritrichous** . تشمل العوائل الآتية :

١ - **Azotobacteriaceae** : متمثلة بالجنس **Azotobacter** المثبتة للنيتروجين بصورة حرة بالتربة .

٢ - **Rhizobiaceae** : متمثلة بالجنس **Rhizobium** التي تثبت النتروجين بصورة تعايشية مع النباتات البقلية .

٣ - **Achromobacteriaceae** : متمثلة بالأجناس **Alcaligenes** التي تتراوح نسبة وجودها في التربة بين ٢ - ١٢ % و **Flavobacterium** الذي تتراوح نسبة وجوده بين ٢ - ١٠ % والجنس **Achromobacter** . جميعها تعيش معيشة رمية في التربة **saprophyte** معتمدة على تحليل المخلفات العضوية المختلفة .

٤ - **Enterobacteriaceae** : متمثلة بالأجناس **Escherichia** , **Proteus** , **Shigella** , **Salmonella** , **Erwinia** , **Enterobacter** المرضية التي تصل التربة عن طريق الفضلات لتبقى فيها مدة قصيرة لعدم امكانها منافسة البكتريا الأخرى المتوطنة في التربة .

المجموعة الثانية ، العوائل التي تكون الأجناس التابعة لها عصوية الشكل - موجبة لصبغة كرام - غير متحركة بصورة عامة - غير مكونة للمسبورات . وتشمل ،

١ - **Lactobacillaceae** : متمثلة بالجنس *Lactobacillus* الذي قد يكون له أهمية في عمليات التخمر وإنتاج الحوامض العضوية في التربة الغدقة .

٢ - **Corynebacteriaceae** : متمثلة بالجنس *Corynebacterium* المقارب للجنس *Arthrobacter* وكلاهما يسميان *Coryne- form bacteria* المتعددة الأشكال (pleomorphic) . قد تتراوح نسبة وجود الجنس *Arthrobacter* في بعض الترب بين ٥ - ٦٠ ٪ من البكتريات النامية . وتغلبه هذا يعود الى مقاومته للظروف القاسية فترة طويلة . وكلا الجنسين لهما دور مهم في تحليل المخلفات العضوية .

المجموعة الثالثة ، تشمل عائلة واحدة هي **Bacillaceae** التي أجناسها تكون عصوية الشكل - موجبة لصبغة كرام - متحركة . ومكونة للسبورات . مثل الجنس *Bacillus* الهوائية والجنس *Clostridium* اللاهوائية الإجبارية . قد تتراوح نسبة وجود الجنس الأول بين ٧ - ٦٧ ٪ (حوالي ٦٠ - ٩٠ خلية / غرام تربة) أما الثاني فتتراوح أعداده بين ٢٠ - ٧٠ / غم تربة في المناطق الغدقة .

طريقة عزل كلا الجنسين سهلة جداً وذلك بعمل بستره لتخفيف التربة في الماء المعقم للقضاء على الخلايا الخضرية ثم التحضين تحت الظروف الهوائية في وسط غذائي ملائم لعزل الجنس *Bacillus* أو الظروف اللاهوائية لعزل الجنس *Clostridium* .

المجموعة الرابعة ، تشمل عائلة واحدة **Micrococcaceae** وهي التي تكون أجناسها ذات شكل كروي - موجبة لصبغة كرام - غير متحركة - غير مكونة للسبورات . مثل الأجناس *Staphylococcus* ، *Sarcina* ، *Micrococcus* . نسبة وجود هذه الأجناس في التربة أقل من ٥ ٪ وقد لا توجد في بعض الترب .

الرتبة الرابعة **Actinomycetales**

تشمل مجموعة الأكتينومايسيتات . جميعها **Chemoheterotrophs** موجبة لصبغة كرام . وتضم ثمانية عوائل هي :

١ - **Mycobacteriaceae** : متمثلة بالجنس *Mycobacterium* العصوية الشكل وأحياناً خيطية filamentous - لا تكون سبورات وهي من البكتيريا المقاومة للأحماض acid-fast نظراً لاحتواء الخلية على كمية كبيرة من حامض المايكوليك (mycolic acid) . أكثر الأنواع وجوداً في التربة هو *M. phlei* .

٢ - **Streptomycetaceae** : تتميز البكتيريا التابعة لهذه العائلة بأنها تتكاثر بتكوين سلسلة من الكونيدات (٥ - ٥٠) أو أكثر. مثل الجنس *Streptomyces* .

٣ - **Micromonosporaceae** : تحمل الهيف كونيديوم واحدة مثل الجنس *Micromonospora* أو اثنتين مثل الجنس *Microbispora* أو سلسلة قصيرة من الكونيدات مثل الجنس *Micropolyspora* . كذلك تضم هذه العائلة بعض الأجناس المحبة للحرارة العالية مثل الجنس *Thermomonospora* والجنس *Thermoactinomyces* .

٤ - **Nocardiaceae** : تتميز هذه العائلة بأنها تتكاثر بتجزؤ الهيفات الى أجزاء كروية أو أسطوانية مثل الجنس *Nocardia* الذي يأتي بعد الجنس *Streptomyces* في تغلبه في الكثير من الترب وكذلك الجنس *Pseudonocardia* .

٥ - **Actinomycetaceae** : تتميز بأنها لا تنتج مايسيليوم حقيقي وأنها قد تكون أجناسها لا هوائية إجبارية أو اختيارية مثل الجنس *Actinomyces* .


٦ - **Actinoplanaceae** : تتكاثر بواسطة السبورات التي توجد في المحفظة السبورية sporangiospores مثل الجنس *Streptosporangium* والجنس *Actinoplanes* والجنس *Planobispora* .

٧ - **Dermatophilaceae** : الهيفات في هذه العائلة تتجزأ الى أعداد كبيرة من التراكيب الكروية المتحركة مثل الجنس *Geodermatophilus* .

٨ - **Frankiaceae** : متمثلة بالجنس *Frankia* الذي يعيش داخل عقد جنرية على جذور النباتات غير البقلية ولا يمكن أن يعيش بعيداً عن النبات العائل .

الرتبة الخامسة : Myxobacterales

تسمى البكتريا اللزجة *slime bacteria* تتميز بأن لها طورين من الحياة . طور خضري عبارة عن أشكال من الخلايا العصوية المرنة تتحرك بالانزلاق . تشبه البكتريا الحقيقية ولكنها عديمة الغلاف . تتغذى بصورة رئيسة على البكتريات الأخرى . في أحد مراحل النمو وعند الظروف القاسية تجتمع الخلايا الخضرية لتكوين كتلة من الخلايا الساكنة محمولة على أجسام ثمرية متخصصة (شكل ٢) .



شكل (٢) يوضح الخلايا الخضرية والأجسام الثمرية *Myxobacterium*

توجد بصورة رئيسة على سطح التربة أو المخلفات العضوية حيث وظيفتها تحليل كل من السيللوز والكييتين وحتى الأكار . من الأجناس التابعة لهذه الرتبة *Myxococcus* , *Polyangium* , و *Archangium* . من الممكن عزل بعض هذه الأجناس من التربة وذلك بإضافة كمية قليلة من التربة في وسط طبق بتري يحوي بيئة غذائية صلبة نامية عليها بكتريا من جنس معين . بعد التحضين يمكن مشاهدة الأجسام الثمرية بالعين المجردة . تفرز هذه الكائنات الحية أنزيمات خارجية تحلل الخلايا البكتيرية لاستعملها كغذاء . أعدادها تتراوح بين ٢٠٠٠ - ٦٠٠٠ خلية لكل غرام تربة وأعدادها تكون أكبر في الترب الرطبة .

٣ - مجموعة فطريات التربة *Soil Fungi*

الفطريات : تعريفها ووصفها

الفطريات كائنات حية قد تكون وحيدة الخلية كما في الخمائر *yeasts* أو متعددة الخلايا كما في الأعفان *Molds* . يتكون العفن من مايسيليوم قد يكون مقسماً أو غير مقسم والذي بدوره يتكون من مجموعة من الهيفات . جميع الفطريات عديمة الكلوروفيل (تحتاج الى غذاء عضوي جاهز *chemoheterotrophs*) . تتكاثر لا جنسياً بتكوين الكونيديات *Conidia*

المحمولة على حامل الكونيديات *Conidiophore* أو بتكوين السبورانجيوسورات *sporangiospores* الموجودة داخل *sporangium* المحمولة على الـ *Sporangioophore* أو بالتبرعم *Budding* بالنسبة للخمائر . كذلك يمكن لقسم من الفطريات أن تتكاثر جنسياً بتكوين سورات جنسية مختلفة الأنواع حسب جنس الفطر . ويتركب غلاف الخلية الفطرية كيميائياً من الكيتين أو الكيتوسان أو السيليلوز .

الطرق المستعملة في عد فطريات التربة

طريقة العد بالأطباق *Plate counts* هي أكثر الطرق استعمالاً في عد فطريات التربة وعزلها وتعطي بين ٢٠,٠٠٠ الى حد مليون خلية تكاثرية لكل غرام تربة جافة . من الممكن استعمال بيئة الأكار المغذي في تنميتها بشرط رفع

حموضة الوسط الى حوالي $pH = 4$ حيث لا يمكن للكثير من البكتريا والأكتينومايسيتات أن تنمو عند هذا الرقم . يفضل استعمال بيئات أخرى متخصصة تحتوي على مضاد حيوي كالبنسلين أو الستربتومايسين وصيغة معينة كصبغة الـ *rose bengal* لمنع نمو وانتشار البكتريا (بيئة مارتن) . كذلك يمكن استعمال بيئات أخرى تحوي على نسبة عالية من الدكستروز مصدراً للكربون والطاقة .

على الرغم من أن هذه الطريقة يستعملها الكثير من الباحثين حتى الآن ولكن هناك الكثير من الانتقادات وجهت إليها ، منها أنه من الصعب جداً معرفة ما إذا كانت المستعمرة نامية من سبور أو من جزء من مايسيليوم أو من مايسيليوم كامل .


كذلك في أثناء عملية الرج في أثناء تحضير تخافيف التربة قد يتكسر المايسيليوم أو تتكسر كتلة الكونيديات المتجمعة مع بعضها وكل منها سوف ينمو الى مستعمرة جديدة . أضف الى ذلك عدم وجود وسط غذائي ملائم لتنمية الآلاف من أنواع الفطريات الموجودة في التربة .

من الممكن استعمال طريقة روزي وكولودني للشرائح الزجاجية المدفونة كطريقة وصفية لدراسة طبيعة العلاقة الموجودة بين الفطريات والاحياء الأخرى

أستعملت حديثاً طرق مجهرية مختلفة لقياس أطوال الهيفات الموجودة في عينه من التربة ومنها يمكن قياس الكتلة الحيوية للفطريات في طبقات التربة المختلفة . تقديرات من هذا النوع تعطي أرقاماً تتراوح بين ١٠ - ١٠٠ م لكل غرام تربة وأحياناً تصل الى ٥٠٠ م . عند فرض أن قطر الهيفا حوالي ٥ ميكرون والوزن النوعي لها ١.٢ ووجود ١٠ - ١٠٠ م لكل غرام تربة نحصل على وزن فطريات يتراوح بين ٥٠٠ - ٥٠٠٠ كغم / هكتار من التربة . من هذه الأرقام نستنتج أن الفطريات تتغلب على البكتريا من حيث الكتلة الحية ولكن نلاحظ العكس بالنسبة لأعدادها في التربة .

لعزل أجناس الفطريات المتغلبة ودراستها في تربة ما يجب اللجوء الى الأساط الغذائية المنتجة وذلك بتوفير مصدر الكربون والطاقة والظروف الخاصة بتنمية

كل جنس من أجناس الفطريات . معظم الفطريات التي عزلت ودرست بهذه الطريقة تقع ضمن الفطريات الناقصة وفطريات الزايكو مايستيس *Zygomycetes* التي سوف يتم شرحها لاحقاً شكل (٣) بعض الأجناس الفطرية مثل *Endogen*



شكل (٢) بعض الاجناس الغالبة لفطريات التربة .

والذي يعرف حالياً باسم *Glomus* لا يمكن تنميته على الأوساط الغذائية الصناعية لأنه من الفطريات المتطفلة المفيدة . بالأمكان عزل المايسيليوم والكلامايدوسبوريات التي يكونها هذا الفطر مباشرة من التربة بطرق مختلفة كطريقة الغربلة الرطبة *wet sieving* ويمكن تكثيرها بعد ذلك على نبات عائل متخصص .

العوامل التي تؤثر في وجود فطريات التربة

١ - المادة العضوية

تصنف الفطريات بالنسبة لمصدر الكربون والطاقة ضمن قسم عضوية التغذية **chemoheterotrophs** ولا يمكن لأشعة الشمس أو أكسدة المركبات المعدنية أن تزودها بمصدر الطاقة والكربون اللازم لنموها . إضافة الأسمدة العضوية تزيد من أعداد الفطريات وخصوصاً الأجناس *Trichoderma* و *Fusarium* . *Penicillium* , *Aspergillus* والجنس *Mucor* . إضافة هذه الأسمدة إلى الترب الحامضية سوف يؤدي إلى تغلب الفطريات على باقي الكائنات الحية الأخرى عند توفر الظروف الملائمة الأخرى وخصوصاً النتروجين الجاهز في حالة احتواء السداد العضوي على كمية قليلة منه .

٢ - درجة تركيز أيون الهيدروجين pH

تتغلب الفطريات على البكتيريا في الترب الحامضية ولكن هناك العديد من أنواع الفطريات التي تنمو في مدى واسع من الـ pH يمتد من الحامضي إلى القاعدي وأنواع كثيرة يمكن أن تنمو عند رقم pH ٢ أو ٣ وقسم منها عند pH ٩ أو أكثر . كون الفطريات تسود في الترب الحامضية راجع إلى قلة منافسة البكتيريا لها على المواد الغذائية تحت هذه الظروف حيث أن الفطريات أقل حساسية للزيادة في تركيز أيون الهيدروجين من البكتيريا مما يجعلها تشكل نسبة كبيرة من الأحياء الأخرى في الظروف الحامضية. تغيير pH التربة يمكن أن يكون له دور مهم في القضاء على الفطريات المرضية فمثلاً يكثر مسبب المرض الذي يصيب العائلة الباذنجانية *Plasmodiophora brassicae* في الترب الحامضية . إضافة كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ إلى مثل هذه الترب يمكن أن يقضي على مسبب المرض بصورة نهائية والعكس صحيح بالنسبة لأنواع أخرى .

٣ - تأثير الأسمدة المعدنية

إن إضافة أملاح الأمونيوم يزيد من أعداد فطريات التربة لسببين أولهما أن النتروجين عنصر ضروري لبناء الخلية وثانيهما هو أن أكسدة الأمونيوم تزيد من حموضة التربة وبالتالي توفر ظروفاً ملائمة لنمو الفطريات . إضافة إلى عنصر

التروجين تحتاج الفطريات الى جميع العناصر الغذائية الأخرى اللازمة لنمو أي كائن حي .

٤ - تأثير الرطوبة والتهوية

معظم الأعفان هوائية إجبارية تتركز في الطبقات العليا من التربة . والرطوبة العالية تقلل التهوية وبالتالي توقف نمو الأجزاء الخضرية من العفن . أضف إلى ذلك يكون نشاط الفطريات في تحليل الأسمدة العضوية تحت هذه الظروف قليل جداً لدرجة يمكن أهماله كما أن قلة الرطوبة أو الجفاف له التأثير نفسه . تحت الظروف القاسية من زيادة الرطوبة أو نقصانها تقوم الفطريات بتكوين كمية كبيرة من السبورات الجنسية واللاجنسية للمحافظة على بقائها . ففطر *Penicillium* و *Aspergillus* وغيرها من الفطريات الناقصة تكون أعداداً كبيرة جداً من الكونيديات التي تبقى حية مدة طويلة جداً الى حين ملائمة الظروف أما الفطر *Mucor* و *Rhizopus* فتكون أعداد كبيرة من السبورانجيسبورات . قسم من الفطريات وتحت الظروف القاسية تقوم بتجميع هايفاتها لتكون تراكيب سميقة الجدران تسمى *sclerotia* كما في الأجناس *Botrytis* ، *Verticillium* ، *Sclerotium* ، *Rhizoctonia* . قسم من الفطريات تكون كلامايدوسبورات *Chlamydospores* التي هي عبارة عن سبورات لا جنسية سميقة الجدران . كما في الأجناس *Fusarium* ، *Phytophthora* ، *Thielaviopsis* . قسم من الفطريات تكون رايزومورفات *rhizomorphs* كما في الجنس *Rhizoctonia* . إضافة الى ذلك تكون الكثير من الأجناس الفطرية أعداداً كبيرة من السبورات الجنسية .

٥ - درجة الحرارة

معظم الفطريات من الأنواع تلائمها درجات الحرارة *mesophiles* وهناك بعض الأجناس تلائمها درجات الحرارة العالية *Thermophiles* التي يمكن أن تعيش في المواد العضوية المتخمرة *Composts* التي قد ترتفع درجة حرارتها حتى ٥٥° م . منها بعض الأنواع التابعة للأجناس *Aspergillus* ، *Mucor* ، *Humicola* ، *Chaetomium* . إن الأطباق التي تحضن في درجة ٢٦° م يمكن أن تنمو عليها بعض الأنواع التابعة للأجناس *Cylindrocarpum* .

Mucor Cladosporium , Penicillium . وهذه الأنواع يمكن أن تزداد أعدادها أيضاً كلما تعمقنا داخل مقد التربة .

٦ - العمق داخل قطاع التربة

تتركز الفطريات بصورة عامة قريباً من سطح التربة وربما توجد أعداد كبيرة منها في الأفق الثاني من قطاع التربة (طبقة B) لحقول الحشائش (جدول ٤) . وسبب ذلك قد يرجع الى تكيف بعض الأنواع لظروف قلة الأوكسجين وزيادة كمية غاز ثاني أوكسيد الكاربون كلما تعمقنا في التربة . تقسم الأجناس الفطرية بالطبقة لتأثير CO_2 عليها على ثلاثة أقسام هي :

أولاً : الفطريات الموجودة في جميع طبقات التربة (لا يؤثر تركيز CO_2 فيها) .

ثانياً : الفطريات التي توجد في الطبقات السطحية من التربة (حساسة لتركيز CO_2)

ثالثاً : الفطريات التي لا توجد قريبة من سطح التربة وتزداد كلما تعمقنا في التربة (غير حساسة لتركيز CO_2) .

ان وجود بعض الاجناس الفطرية بعيداً عن سطح التربة قد يفسر بتحور هذه الاجناس الى بعض الأشكال الساكنة التي سبق ذكرها .

٧ - تأثير فصل السنة .

الجدول (٤) يوضح أيضاً التغير في أعداد الفطريات حسب أشهر السنة . وكما ذكرنا في موضوع البكتريا يزداد عدد فطريات التربة في فصلي الربيع والخريف ويقل في فصلي الشتاء والصيف .

جدول (٤) توزيع الفطريات في طبقات تربيتين من الترب الكندية
(الكيندر ١٩٧٧)

عدد الفطريات لكل غرام تربة جافة مضروباً ٢١٠×						
سم	الطبقة	مايس	حزيران تموز	آب	أيلول	العمق
تربة محروثة						
٧ - ٢	A	٣٥	٦	١٠	١٥	٢٢
١٤ - ٧	A	٣٠	٦	٦	٤	٥
٢٨ - ١٤	A	٣	٢	٣	٣	٦
٥٢ - ٣٣	A	٢	٢	١	٥	٥
٦٨ - ٥٢	B	١	٦	٣	٥	٥
٨٤ - ٦٨	B	صتر	صفر	١	٢	٥
تربة حشائش						
٧ - ٢	A	١٩	١٥	٣٨	٤٤	٧
١٤ - ٧	A	١٢	٧	١٣	١٠	٤
٢٨ - ١٤	A	١٣	٤	٥	٥	٤
٥٢ - ٣٣	A	٦	١٩	٧	١٩	٢١
٦٨ - ٥٢	B	٤	١٨	١٧	١٢	٢٥
٨٤ - ٦٨	B	٩	١٨	٣٧	٢١	١٤

٨ - تأثير العمليات الزراعية .

ان اية عملية زراعية تزيد من تهوية التربة وتوفر غذاءً سوف تزيد من أعداد الفطريات . كذلك قسم من الفطريات تتأثر بنوع المحصول المزروع فمثلاً وجد أن الحقول المزروعة الشوفان تحوي أعداداً كبرى من الفطريات مقارنة بالحقول المزروعة بالنرة أو الحنطة بصورة مستمرة . كذلك وجد تغلب الفطر

Aspergillus fumigatus في حقول الشوفان أما في حقول الذرة فقد لوحظ تغلب
الفطر *Penicillium funiculosum* .

وسبب ذلك يعود الى أفراسات معينة من جذور بعض النباتات التي تشجع نمو أنواع
معينة دون الأنواع الأخرى

تصنيف فطريات التربة

تصنف الفطريات ضمن القسم *Mycota* من المملكة النباتية وقد تصنف أحياناً
ضمن مملكة البروتستا . يضم هذا القسم اثنين من تحت القسم *Eumycotina*
(الفطريات الحقيقية) و *Myxomycotina* (الفطريات اللزجة) . تقسم الفطريات
الحقيقية (الأغبان والخمائر) الى (٨) ثمانية صفوف *classes* 8 . وطريقة التكاثر
ونوع السبور الجنسي هما الأساس في التمييز بين هذه الصفوف .

١ - الفطريات الناقصة *Deuteromycetes* أو *Hyphomycetes*

تتميز الاجناس التابعة لهذا الصف في أنها تتكاثر لاجنسياً فقط بتكوين
الكونيديات المحمولة على حامل الكونيديات *Conidiophore* ويكون مايسليوم
الاجناس التابعة لهذا الصف مقسماً . معظم الفطريات الموجودة في التربة والتي
تنمو في بيئة مارتن تابعة لهذا الصف منها :

Penicillium , *Aspergillus* , *Alternaria* , *Botrytis* *Botryotrichum* , *Cladosporium* ,
Culvularia , *Fusarium* *Cylindrocarpon* , *Epicoccum* , *Geotrichum* , *Gliocladium*
Graphium , *Helminthosporium* , *Humicola* , *Monilla* *Rhizoctonia* , *Trichoderma* ,
Verticillium , *Trichothecium*

٢ - الزايكوماسيتات *Zygomycetes*

تتميز الاجناس التابعة لهذا الصف في انها تتكاثر لاجنسياً بتكوين
السبورانجيوسبورات الموجودة داخل سبورانجيوم والمحمولة على حامل السبورانجيوم
Sporangiole وتكاثر جنسياً بتكوين سبورات جنسية تسمى السبورات

الزيجية **Zygosporos** الناتجة من اتحاد أثنين من الهيفات أحدهما ذكري والآخر انثوي (+ و -) . من الامثلة عليها *Mucor, Rhizopus, Mortierella, Cunninghamella*

٢ - الأوومايسيتات **Oomycetes** أو الفطريات البيضية :

وتتميز الأجناس التابعة لها في أنها تتكاثر بتكوين سبورات لاجنسية تسمى **Zoospores** كل منها يتحرك بأثنين من الأسواط وتتكاثر جنسياً بتكوين سبورات جنسية تسمى السبورات البيضية **Oospores** الناتجة من اتحاد الانثريدوم الذكري مع الاووكونيوم الانثوي . ومن الامثلة عليها *Peronospora, Pythium, Aphanomyces, Phytophthora*

٤ - الكتريديومايسيتات: **Chytridiomycetes**

تشابه سابقتها عدا تحرك الزوسبورات بواسطة سوط واحد فقط مثل *Chytridium, Chytriomycetes, Rhizophidium, Olpidium*

٥ - الفطريات الباسيدية **Hymenomycetes** أو **Basidiomycetes**

تتميز الأجناس التابعة لها في أنها تتكاثر لا جنسياً بتكوين الكونيديات وجنسياً بتكوين سبورات جنسية تسمى **basidiospores** كل أربعة منها تكون محمولة على تراكيب متخصصة تسمى باسيديوم **basidium** مثل *Marasmius, Glomus, Agaricus, Pstillaria, Puccinia,*

٦ - الفطريات الكيسية **Pyrenomycetes** أو **Ascomycetes**

وهذه يمكن تقسيمها على قسمين . الأول يشمل الفطريات الكيسية الحقيقية **Euascomycetidae** التي تتكاثر لا جنسياً بالكونيديات وجنسياً بتكوين سبورات كيسية لـ **ascospores** كل ثمانية منها داخل كيس يسمى **ascus** . وتتميز في أن الأكياس السبورية تكون داخل تراكيب متخصصة تسمى **ascocarps** مثل ، *Neurospora, Thielavia, Chaetomium, Sordaria* . القسم الثاني يشمل

الفطريات الكيسية الشبيهة *Hemiascomycetidae* أو الخمائر *yeasts* التي تتكاثر لاجنسياً بالتبرعم أو الانقسام وجنسياً بتكوين الأكياس السبورية التي لا تكون داخل تراكيب الـ *ascocarps* . مثل *Candida*, *Hansenula*, *Torula* , *Sporobolomyces* , *Torulopsis*, *Saccharomyces* , و

الأعفان اللزجة *Slime Molds* أو الـ *Myxomycetes*

تقع هذه الأعفان ضمن الحيز الذي يقع تحت القسم الثاني *Myxomycotina* وتسمى أحياناً الأعفان الخليطة . تشمل كائنات حية رمية التغذية *Saprophyte* لها طوران من الحياة . الأول عبارة عن خلايا أميبية عديمة الجدران تتغذى بنفس طريقة تغذية الأميبا . وعندما يقل المصدر الغذائي تمر بالطور الثاني الذي تتجمع فيه الخلايا الأميبية لتكوين تراكيب شبيهة بالسبورانجيوم . تسمى *Pseudoplasmodium* الذي يحوي بداخله على خلايا شبيهة بالسبورانجيوسبورات . ومن الأمثلة عليها *Dictyostellum*, *Acrasis* و *Acytostellum* . تعيش هذه الفطريات على سطوح التربة الرطبة أو المسطحات الخضراء أو على أشجار الغابات أو أي مكان تتوفر فيه المواد العضوية المتحللة .

٤ - مجموعة طحالب التربة *Soll Algae*

الطحالب : تعريفها ووجودها :

تشكل الطحالب أكثر الأحياء المجهرية التي تقوم بعملية التركيب الضوئي تغلباً في التربة . وأعدادها أقل من أعداد البكتيريا أو الاكتينومايسيتات أو الفطريات . وتوجد كذلك على سطوح مياه الأنهار والبحار ولكن هناك أنواع كثيرة لا توجد إلا في التربة ومنها الأجناس *Botrydium* , *Oedogonium* , *Microcoleus* , *Zygnema* , *Chlorococcum* . هناك أجناس أخرى توجد في التربة والمياه منها *Anabaena* , *Nostoc*, *Oscillatoria* , *Protopoccus*, *Stichococcus* . توجد الطحالب دائماً قريبة من سطح التربة لأنها تقوم بعملية التركيب الضوئي فهي تأخذ CO_2 من الجو والعناصر المعدنية مثل النتروجين ، والفوسفور ، والبوتاسيوم ، والمغنيسيوم ، والكبريت ، والحديد من التربة . تصنف بالنسبة لمصدر الكربون والطاقة ضمن ذاتية التغذية الضوئية ،

Photoautotrophs غير أن هناك بعض الحالات الشاذة حيث وجد الكثير من الباحثين طحالب بعيدة عن سطح التربة وحتى على عمق ١ م في ظلام تام . ووجود هذا النوع من الطحالب داخل هذا العمق من التربة ما زال موضع نقاش حيث أن قسماً من الباحثين يؤكد أنها ضمن الطحالب الاختيارية بالنسبة لمصدر الكربون والطاقة ذاتية التغذية الضوئية اختياريًا **facultative photoautotrophs** أي يمكنها عند عدم توفر ضوء الشمس و CO_2 أن تعيش على المادة العضوية كالفطريات والبكتيريا القسم الآخر من العلماء يؤكد أنها أنتقلت من سطح التربة مع ماء الري أو بوساطة الحشرات أو في أثناء العمليات الزراعية إلى أعماق التربة وأنها توجد بحالة سكون تام لعدم امكانها منافسة الأحياء الأخرى على الغذاء . عند نقل مثل هذه الطحالب إلى سطح التربة تتكاثر وتنمو بصورة طبيعية . لم تحظ طحالب التربة بدراسات مستفيضة من علماء الأحياء المجهرية كما حظيت البكتيريا والفطريات والكثير منهم يفتقد أهميتها في التربة قليلة ولكن الكثير من الدراسات الحديثة ركزت على دور بعض أجناس الطحالب في تثبيت النتروجين وتلك التي تشارك في تكوين مركبات عضوية مختلفة مهمة في تكوين دبال التربة .

الطرق المستعملة في عد طحالب التربة

لأجراء عملية عد طحالب التربة وعزلها يتبع بصورة رئيسة طريقة العد الأكثر احتمالاً وذلك بتحضير تخافيف التربة في الماء المعقم (أعتيادياً ١٠-٢ ، ١٠-١ ، ١٠-٠) ثم تلقيح أنابيب حاوية على الوسط الغذائي المعدني الخاص بالطحالب (خسة مكررات لكل تخفيف) بشرط أن تكون التخافيف متسلسلة . تحضن الأنابيب الملقحة في درجة حرارية ملائمة قريباً من مصدر ضوئي مدة ٤ - ٦ أسابيع . بعد ذلك يتم حساب عدد الأنابيب الموجبة (ذات اللون الأخضر) من كل تخفيف ، ثم باستعمال جداول أحصائية خاصة يمكن حساب عدد الطحالب الحية لكل غرام تربة . الأعداد التي يمكن الحصول عليها بهذه الطريقة تتراوح بين ١٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ خلية . يمكن استعمال طريقة العد المباشر بالمجهر وذلك بأخذ حجم معين من تخفيف معين من التربة بالماء المعقم ووضعه على مساحة محددة من شريحة زجاجية وبعد تجفيفه يتم حساب عدد الطحالب الموجودة في عدد من المجالات المجهرية كما في البكتيريا .

من الصعب الاعتماد على طرق العد السابقة الذكر لأن قسماً من طحالب التربة خيطية وتمطي عدداً قليلاً والقسم الآخر وحيدة الخلية وقسم ثالث تعيش على شكل مستعمرات وتمطي اعداداً كبيرة من الخلايا الحية . ويمكن حساب الكتلة الحية للطحالب وذلك بتحويل العدد الى وزن أو باستخلاص الكلورفيل من التربة باستعمال مذيبيات عضوية خاصة ثم تقدير كمية الصبغة بطرق تحليل متخصصة . هذه القياسات أعطت نتائج تتراوح بين ٧ - ٣٠ كغم طحالب / هكتار وقد حصل بعض الباحثين الى حد ٥٠٠ كغم أو حتى ١٥٠٠ كغم / هكتار .

العوامل التي تؤثر في وجود طحالب التربة

ان جميع العوامل التي درست وهي التي تؤثر في البكتريا والفطريات يمكنها أيضاً أن تؤثر في الطحالب . فالمادة العضوية لها تأثير غير مباشر لكون تحليلها في التربة يعطي غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي تستعمله الطحالب في عملية التركيب الضوئي ولكون قسم من الطحالب يحتمل أن تعيش على المادة العضوية مصدراً للكربون والطاقة . كما أن توفر العناصر المعدنية في التربة ضروري جداً لنمو طحالب التربة وتكاثرها . والصوديوم والكوبلت ضروري لبعض الأنواع والسلكون ضروري لتكاثر الداياتومات *diatoms* . والداياتومات اكثر الطحالب تأثراً في جفاف التربة موازنة بالخضراء أو الخضراء المزرقة التي يمكن أن تبقى ساكنة حتى ١٠ سنوات . pH التربة له تأثير في الأقسام المختلفة من الطحالب ولكل قسم pH ملائم له سوف يذكر بشيء من التفصيل في موضوع التصنيف . المبيدات تؤثر

بصورة مباشرة في الحشائش والادغال ولكنها يمكن ان تؤثر بصورة غير مباشرة في طحالب التربة لأنها نباتات خضراء أيضاً . للأحياء الأخرى تأثيرات سلبية أو إيجابية في طحالب التربة ففي المزارع السائلة أو البحيرات يمكن أن تتكاثر الطحالب بسرعة بوجود البكتريا والابتدائيات لأن الأخيرة تحتاج الى مصدر عضوي للتكاثر وفي أثناء استعمالها وتحليلها لهذا المصدر العضوي سوف يتحرر غاز CO_2 الضروري لتكاثر الطحالب . أما التأثيرات السلبية فهو أن بعض البكتريا (والاكتينومايسيتات) والفطريات يحتمل أن تفرز أنزيمات تقضي على خلايا الطحالب وبالتالي تحليلها . تحلل الطحالب الميتة يجهز عناصر معدنية مختلفة للنباتات والأحياء الأخرى . بهذه الطريقة يمكن أن تساهم الطحالب في زيادة خصوبة التربة . إضافة الى ذلك تتغذى كل من البروتوزوات والنيماتودات وديدان

الأرض على بعض الأجناس من الطحالب وأية مادة تقضي على هذه الحيوانات يمكنها أن تؤدي بصورة غير مباشرة في زيادة الطحالب في التربة ، كما أن عملية ضخ كميات من غاز CO_2 في المزارع السائلة الخاصة بتكاثر الطحالب يمكن أن يزيد من أعدادها أيضاً .

تصنيف طحالب التربة

تصنف الطحالب ضمن المملكة النباتية أو البروتستا . تضم طحالب التربة الأقسام الآتية ،

١ - الطحالب الخضراء *Chlorophyta* أو *chlorophycophyta*

إن معظم الطحالب الخضراء الموجودة في التربة وحيدة الخلية ولكن هناك القليل منها خيطية . صبغة الكلوروفيل والكاروتين والزانثوفيل تكون موجودة داخل تراكيب متخصصة تسمى الكلوروبلاست ، خلية من نوع حقيقية النواة *Eukaryote* . تتغلب على بقية الطحالب في الترب الحامضية . وتتكاثر بتكوين السبورات المتحركة أو الانقسام وأحياناً بالتكاثر الجنسي . ومن الأمثلة عليها ،
Protooccus ، *Chlorococcum* ، *Dactylococcus* ، *Chlamydomonas* ،
Scenedesmus ، *Stichococcus* ، *Ulothrix* ، *Chlorella* ،
Hormidium .

٢ - الطحالب البنية الذهبية *Chrysophycophyta* أو *Bacillariophyta*

وهذه تضم جزءاً مهماً جداً من طحالب التربة وهي الدياتومات *diatoms* قسم منها وحيدة الخلية وقسم تعيش بشكل مستعمرات وقسم خيطية . جميعها حقيقية النواة *Eukaryote* . تكون خلية الدياتومات محاطة بغلاف سميك من السلكا . سميت بالبنية الذهبية لتغلب صبغة بنية الشكل تسمى (Fucoxanthin) إضافة الى صبغة الكلوروفيل . تكون الدياتومات حساسة جداً لحموضة التربة وتلائمها بصورة عامة الترب المتعادلة أو القاعدية . من الأجناس الموجودة في التربة ،
Pinnularia ، *Suriella* ، *Synedra* ، *Achnanthes* ، *cymbella* ، *Fragilaria* ، *Navicula* .

٣ - الطحالب الخضراء المزرقة *Cyanophyta* Cyano أو *Cyanophycophyta*

تصنف الطحالب الخضراء المزرقة حالياً ضمن البكتيريا وذلك لأن خليتها من نوع بدائية النواة *Prokaryote*. قد يكون قسم منها وحيدة الخلية والقسم الآخر خيطية. تحوي على صبغات متخصصة هي الـ *Phycocyanin* وصبغة الـ *Phycocerythrin* إضافة إلى صبغة الكلوروفيل وصبغة الكاروتينويد التي تكون سائبة داخل السايكوبلازم. تفضل الطحالب الخضراء المزرقة التربة المتعادلة إلى القاعدية وهي حساسة لحموضة التربة لدرجة قلة عددها أو انعدامها عند pH أقل من ٥.٢. تتكاثر بصورة رئيسية بالانقسام أو التجزؤ. ومن الأمثلة عليها، *Cylindrospermum*، *Anabaena*، *Microcoleus*، *Lyngbia*، *Chroococcus*، *Calothrix* و *Phormidium*، *Oscillatoria*، *Nostoc*، *Nodularia*، *Tolypothrix*.

معظم الطحالب الخضراء المزرقة في داخلها تراكيب كيسية تسمى الاكياس المتغيرة *heterocysts* تتم فيها عملية تثبيت النتروجين الجوي بصورة حرة. وهذه الوظيفة تعد أهم الوظائف التي تقوم بها طحالب التربة الخضراء المزرقة.

٤ - الطحالب الخضراء المصفرة *Xanthophyta* *Euglenophycophyta*

هذه الطحالب وحيدة الخلية متحركة بواسطة سوط واحد أو مجموعة من الأسواط. ومن أكثر الأجناس المعروفة الجنس *Euglena* وعلى الرغم من احتوائه على صبغة الكلوروفيل لتصنيفه ضمن الطحالب إلا أنه يشابه الابدائيات التي لا تحتوي على الكلوروفيل. لذلك تصنف اليوغليينا من علماء النبات ضمن المملكة النباتية ومن علماء الحيوان ضمن المملكة الحيوانية. هناك بعض الاجناس الأخرى من هذه الطحالب التي يمكن أن توجد في بعض التربة منها *Botrydiopsis*، *Bumilleriopsis*، *Bumilleria*، *Heterothrix*، *Heterococcus*.

الاشنات *Lichens*:

الاشنات عبارة عن كائنات حية تتكون من تجمع فطر وطحلب. الجزء الطحليبي يعود الى أحد اجناس الطحالب الخضراء أو الخضراء المزرقة ويمكنها أن تعيش بصورة مستقلة وحدها. أما الجزء الفطري فإنه يعود الى أحد أجناس

الفطريات انكيسية أو الباسيدية ولا يمكن أن يعيش مستقلاً وحده والاثنان مع بعضهما يعيشان بصورة تكافلية وفق نظام غريب وعجيب اذ يقوم الطحلب (الجزء العلوي) بتكوين الكاربوهيدرات بعملية التركيب الضوئي لكي يوفرها للفطر (الجزء السفلي) الذي تمتد هافاته الى اسفل التربة لكي يقوم بتزويد الطحلب بالعناصر الغذائية الضرورية التي يحصل منها من تحليل المركبات العضوية الموجودة في التربة . توجد الأشنات على سطح التربة ويكون نموها بطيئاً جداً وتكون أنسجة جيلاتينية قوية حول الخلية بحيث تسمح بتشرب الخلية بالماء والأحتفاظ به مدة طويلة لمقاومة الظروف القاسية .

٥ - مجموعة فايروسات التربة Soil Viruses

الفيروس : تعريفة : ووجوده :

درسنا في المواضيع السابقة الأحياء المجهرية من بكتريا وفطريات وطحالب التي يمكننا رؤيتها جميعاً باستعمال المجهر الضوئي المركب بعد تكبيرها بحدود مئة أو ألف مرة . وفي هذا الموضوع سنتناول الفيروسات التي بلغت من الصغر حجماً لا يمكن معه رؤيتها الا باستعمال المجهر الإلكتروني الذي يكبر عشرات أو مئات الألوف من المرات . الفيروس أو جزيئة الفيروس عبارة عن طفيليات إجبارية داخلية (تصنف مواد كيميائية من بعض العلماء) لا يتجاوز قطر الكبيرة منها على ٠,٣ ميكرون والصغيرة منها حوالي ٠,٠٥ ميكرون. تتكون من حامض نووي واحد (DNA أو RNA) محاطة بطبقة بروتينية تسمى capsid تتكون من وحدات بروتينية تسمى Capsosomers وأحياناً تكون الطبقة البروتينية محاطة بغلاف يسمى envelop . تعتمد الفيروسات في نموها وتكاثرها على العائل الذي تصيبه كأن يكون نباتاً أو إنساناً أو حيواناً أو بكتريا أو فطراً أو طحلباً . بصورة عامة لا يحتوي الفيروس على أنزيمات لأنه يعتمد اعتماداً كلياً على الأنزيمات المنتجة من قبل النسيج الحي الذي يصيبه .

الفيروس الذي يهمن في التربة هو ما يسمى بالبكتريوفاج bacteriophage الذي يصيب الخلايا البكتيرية . لكل جنس من البكتريا بل لكل نوع بكتريوفاج خاص به والذي يصيب نوعاً معيناً من البكتريا او سلالة معينة لا يصيب النوع الاخر (جدول ٥) . يتركب البكتريوفاج من الرأس الذي يتراوح قطره بين


جدول (٥) تأثير البكتريوفاج في سلالات
من بكتريا الازوتوباكتر (الكسندر ١٩٧٧)
سلالة البكتريا سلالة البكتريوفاج

PBulg	P	P18	PCan	
				<i>A. chroococcum</i>
-	+	+	-	strain C12
-	+	+	+	strain C18
				<i>A. vinelandii</i>
+		+	-	strain V5
-		-	-	strain P3
				<i>A. beijerinckii</i>
±		+	-	strain B2-e
				+
				-

+ = يصيب السلالة ويؤدي الى موتها ، - = لا يصيب السلالة .

٥.٠ - ١٥.٠ وذنوب قد يصل طوله ٠.٢ ميكرون (شكل ٤) . في حالة اعتبار البكتريوفاج كائنات حية فان اعدادها في التربة اكثر من اعداد الكائنات الحية الاخرى اطلاقاً .

هناك نوعان من البكتريوفاج . النوع الأول يسمى *Lytic bacteriophage* الذي يدخل داخل الخلية البكتيرية ويؤدي الى موتها . فبعد دخول *DNA* الفيروس الى داخل خلية بكتيرية معينة (موضع الاتصال عن طريق الذنب) بمساعدة عنصر معدني ثنائي الشحنة الموجبة كالسيوم أو المغنيسيوم الذي يعمل كجسر يربط الشحنة السالبة للبكتريوفاج بالشحنة السالبة الموجودة في جدار خلية البكتريا يتوقف نشاط خلية البكتريا وفي الوقت نفسه يتوجه نشاطها الى انتاج وحدات *DNA* ووحدات كابسيد مشابهة لتركيب الفيروس . وبعد مدة من الزمن (ساعاتن أو أقل أو اكثر) تموت الخلية البكتيرية وتخرج منها مئات الجزيئات الفيروسية لكي تصيب خلايا أخرى .



شكل (٤) يوضح البكتريوفاج من خلال المجهر الالكتروني .

إذا كانت هذه البكتيريا نامية على سطح بيئة على الأكار المغذي فسوف تتكون مناطق خالية من النمو (بكتيريا ميتة) تسمى **plaques** وكل منها يعد مزرعة نقية من البكتريوفاج الخاص بتلك البكتيريا . أما إذا كانت البكتيريا نامية في مزرعة سائلة فتحول المحلول من الصورة المعكرة الى الصورة الراقية دليل على نقصان اعداد البكتيريا وزيادة اعداد جزيئات الفيروس .

النوع الثاني من البكتريوفاج يسمى **Lysogenic bacteriophage** وهذا النوع لا يقضي على الخلية البكتيرية في المراحل الاولى من دخوله وإنما تبقى الخلايا البكتيرية حاملة للفيروس بداخلها وتنقله الى الاجيال الاخرى مع خروج جزيئات من الفيروس بين فترة واخرى من دون تحلل الخلية البكتيرية ويسمى هذا النوع من البكتريوفاج ايضا باسم البكتريوفاج المؤقت **temperate** وتسمى هذه الظاهرة باسم **Lysogenicity** والخلية البكتيرية الحاملة للفيروس تسمى البكتيريا المحللة

Lysogenic bacteria . يرافق هذه الحالة ظاهرة وراثية تسمى التآبير (الانتقال) **Transduction** إذ ينقل البكتريوفاج جزءاً من المادة الوراثية من خلية بكتيرية الى

اخرى لسلالة من نفس النوع وبالتالي تنتقل للاخيرة صفات وراثية جديدة . قد يحدث ذلك بين الاجناس المتقاربة أيضاً .

الفيروسات يمكن أن تصيب أيضاً خلايا الاكتينوما يسميات وتسمى في هذه الحالة **Actinophage** أو الطحالب خصوصاً الخضراء المزرقه وتسمى في هذه الحالة **Cyanophage** وكذلك الابتدائيات . كذلك تم اكتشاف فيروس يصيب كل جنس من اجناس الفطريات فمثلاً وجد فيروس يصيب الـ **Cephalosporium** , **Aspergillus** , **Mucor** , **Fusarium** , **Gliocladium** ... الخ . وهذه الفيروسات تختلف عن البكتريوفاج من حيث الشكل الخارجي إذ انها لا تحتوي على التركيب الشبيه بالذنب عند الفيروسات التي تصيب الطحالب الخضراء المزرقه فتكون شبيهة بالبكتريوفاج من حيث الشكل وطريقة الاصابة . وهناك ايضاً فيروس متخصص لكل جنس من اجناسها . فقد اكتشف فيروس يصيب الاجناس : **Anabaena** , **Cylindrospermum** , **Oscillatoria** , **Phormidium** ... الخ .

وتعد التربة مأوى كثير من الفيروسات التي تسبب أمراض للنبات كمرض موزائيك التبغ أو الحنطة أو الشوفان حيث يبقى الفيروس في التربة بصورة غير نشطة الى حين زراعة النبات العائل . وقد ينقل بوساطة الديدان الخيطية أو الفطريات أو الحشرات من تربة الى أخرى .

الفيروس الذي يسبب مرض التهاب الكبد للانسان **hepatitis** من الممكن ان ينتقل عن طريق التربة الى الماء الارضي ثم الى الآبار أو مياه الانهار التي تستعمل للشرب . لقد وجد حديثاً ان بإمكان التربة أن تمنع مرور الفيروس الى الماء الارضي إما بادمصاصه الى أجزائها المختلفة أو بعملية بيولوجية لافقاد حيويته **Biological inactivation** . فحبيبات الطين والمادة العضوية وبقايا النباتات العضوية لها القابلية على ادمصاص الفيروس إما عن طريق الاختلاف في الشحنات الكهربائية أو عن طريق قوى أخرى غير معروفة .

الطرق المستعملة في عد بكتريوفاج التربة :

لاجراء عملية عد لبكتريوفاج التربة تقوم بعمل تخافيف من التربة بالماء المعقم (١٠-٠ ، ١٠-١ ، ١٠-٧ مثلاً) ثم توزيع حجم معين من كل منها على سطح الوسط الغذائي في طبق بتري نامية عليه خلايا بكتيرية ثم التحضين مدة ٤٨ ساعة

أو أكثر في ظروف ملائمة . بعدها تجري عملية عد للمناطق الخالية من النمو (plaques) وتحويل العدد الى غرام من التربة على فرض ان كل منها قد نشأت من جزيئة فيروس واحدة . لاجل دراسة وجود بكتريوفاج متخصصة لجنس معين من البكتريا في تربة ما نقوم بتحضير قليل من التربة مع مزعة بكتيرية سائلة من الجنس المراد دراسته مدة ٢٤ - ٤٨ ساعة وذلك لكي نسمح للبكتريوفاج بالتكاثر على حساب البكتريا . بعدها نضيف كمية قليلة من المحلول الرائق الى وسطاً سائلاً آخر يحوي على البكتريا نفسها . وبعد التحضير مدة ٢٤ - ٤٨ ساعة يرشح الوسط باستعمال مرشحات دقيقة تسمح بمرور البكتريوفاج ولا تسمح بمرور الخلايا البكتيرية . وتتم دراسة تأثيره في مزعة جديدة صلبة وعزل مزارع نقية من البكتريوفاج الخاص بذلك الجنس من البكتريا . بهذه الطريقة تم عزل بكتريوفاج خاص لكل من الاجناس البكتيرية التالية : *Bacillus* و *Azotobacter* , *Rhizobium* , *Bdellovibrio* , *Arthrobacter* , *Agrobacterium* , *Mycobacterium* , *Pseudomonas* , *Xanthomonas* , *Clostridium* .

تؤثر البكتريوفاج تأثيراً سلبياً في بعض البكتريا الاقتصادية مثل *Rhizobium* فقد تم عزل بكتريوفاج يصيب تقريباً جميع الانواع التابعة لهذا الجنس . من المحتمل ان عدد العقد الجذرية يقل لدرجة تأثيره في الحاصل يكون شديداً جداً .

٦ - مجموعة ابتدائيات التربة *Sell Protozoa*

الابتدائيات : تعريفها ووجودها :

الابتدائيات احياء وحيدة الخلية يتراوح طولها بين عدة ميكرومترات الى سنتيمتر واحد (جميع ابتدائيات التربة تكون مجهرية) . خليتها من نوع حقيقية النواة (Eukaryote) وتصنف ضمن المملكة الحيوانية أو ضمن مملكة البروتستا . متغايرة التغذية الكيميائية *Chemoheterotrophs* عدا بعض الاجناس الانتقالية التي تحتوي على كلوروبفيل وهي التي تصنف أحياناً ضمن الابتدائيات وأحياناً اخرى ضمن الطحالب . تتكاثر لاجنسياً بالانقسام وقسم تتكاثر جنسياً . تتغذى معتمدة على المواد العضوية واللاعضوية الذائبة (*Saprobic*) أو معتمدة على الخلايا البكتيرية ، بعملية التغذية (*phagotrophic*) ، والاخيرة هي الغذاء الرئيس لها وخصوصاً الاجناس ، *Bacillus* ، *Micrococcus* ، *Escherichia* .

Aerobacter , *Agrobacterium* . عند عدم ملائمة الظروف تنكيس وتبقى في هذه الحالة عدة سنوات . الابتدائيات أبسط حيوانات التربة وأكثرها تغلباً وأحياناً يدرسها علماء الحيوان وأحياناً يدرسها علماء الأحياء المجهرية لأنها كما قلنا تصنف ضمن مملكة البروتستا .

الطرق المستعملة في عد ابتدائيات التربة :

لأجراء عملية عد ابتدائيات التربة وعزلها يتبع طريقة العد الأكثر احتمالاً المستعملة في عد طحالب وبعض أجناس بكتريا التربة مع بعض التحويرات وهي أستعمال وسط غذائي سائل حار على أحد الأجناس البكتيرية السابقة الذكر . ويمكن تحديد الأنايب الموجبة بالفحص المجهرى لعينة من كل أنبوبة . أعدادها في التربة تتراوح بين ١٠,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠٠ خلية لكل غرام تربة وقد يصل العدد الى حد ٣٠٠,٠٠٠ وأحياناً ٥٠٠,٠٠٠ . العدد الذي نحصل عليه بهذه الطريقة يشمل الخلايا الخضرية والمتكيسة . لأجراء عملية عد الخلايا الخضرية فقط أو المتكيسة فقط تعامل عينة من التربة مع حامض HCl تركيز ٢ % مدة ١٢ ساعة لنقضى على الخلايا الخضرية فتبقى المتكيسة وبعدها تجرى عملية عد لابتدائيات التربة قبل المعاملة وبعدها والفرق بين الأثنين يكون عدد الخلايا الخضرية فقط . بالرغم من أن اعدادها أقل من البكتيريا ولكنها كتلة حيوية يمكن أن تكون أكبر منها في بعض الترب . معظم ابتدائيات التربة تكون مشابهة لتلك التي تعيش في الماء ، إلا أنها كما ذكرنا أصغر منها وأكثر تكيفاً لتعيش في أغشية الماء الرفيعة حول جيبات التربة .

تصنيف ابتدائيات التربة :

تصنف ابتدائيات التربة على أساس الأعضاء التي تتحرك بواسطتها وبناء على ذلك قسمت على أربعة مجاميع هي ،

المجموعة الاولى : السوطيات Mastigophora أو Flagellates

تشمل هذه المجموعة الأجناس التي تتحرك بواسطة سوط واحد أو أكثر أحياناً تقسم على قسمين ، الأول *Phytomastigophora* ويشمل الأجناس التي تحتوي على صبغة الكلوروفيل التي تصنع غذاءها بنفسها (تصنف كما ذكرنا سابقاً ضمن

الطحالب في بعض الأحيان) . الثاني Zoomastigophora يشمل الأجناس التي لا تحوي على كلوروفيل فتتغذى تغذية عضوية .

أغلب أجناس ابتدائيات التربة تكون ضمن هذه المجموعة التي قد يتراوح عددها بين ٣.٠٠٠ - ٢٠.٠٠٠ خلية / غم تربة . من الأمثلة عليها الأجناس :
• *Monas* • *Spiromonas* • *Cercobodo* • *Bodo* • *Cercomonas* • *Tetramitus*
• *Spongomonas* • *Heteromita* • *Oikomonas*

المجموعة الثانية : الأميبيات Sarcodina

أجناس هذه المجموعة تتحرك بوساطة أفراسات بروتوبلازمية مؤقتة من جسم الخلية تسمى الأقدام الكاذبة *Pseudopodia* . وبسبب عدم وجود غلاف قوي للخلية يتغير شكلها عند حركة الحيوان الى الأمام أو الى الخلف . بهذه الطريقة تختلف هذه المجموعة عن السابقة أو عن الهدييات التي تحوي على أعضاء حركة ثابتة ودائمة . أعدادها في التربة قد تكون مشابهة للمسوطيات . ومن الأمثلة عليها جناس :
• *Hartmanella* • *Acanthamoeba* • *Amoeba* • *Nuclearia*
• *Naegleria* • *Trinema* • *Euglypha* • *Blomyxa*

المجموعة الثالثة : الهدييات Ciliophora أو Ciliates

تتحرك الأجناس التابعة لهذه المجموعة بوساطة شعيرات قصيرة كثيرة العدد تسمى الأهداب (cilia) . أعدادها في التربة أقل من ١٠٠٠ خلية / غم ومن الأمثلة عليها الأجناس :
• *Colpoda* • *Balantiothorus* • *Paramecium*
• *Vorticella* • *Oxytricha* • *Halteria* • *Gastrostyla* • *Colpidium*

المجموعة الرابعة : الابتدائيات الطفيلية Sporozoa

تشمل الأجناس الطفيلية التي لا تحتوي على أي نوع من أعضاء الحركة (غير متحركة) .

العوامل التي تؤثر في ابتدائيات التربة :

إضافة المخلفات العضوية تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أعداد ابتدائيات التربة . حيث أن قسماً منها يتغذى على المادة العضوية مباشرة والقسم الآخر يتغذى على البكتيريا التي بدورها تنمو وتتكاثر على حساب المادة العضوية . الرطوبة مهمة للقيام بالعمليات الحيوية ولحركة الابتدائيات داخل التربة . معظمها هوائية اجبارية ويمكن وجود الابتدائيات في مجالات واسعة من الـ pH حتى أن بعض الباحثين وجد أنها غير حساسة لا لزيادة ولا لنقصان تركيز أيون الهيدروجين ولكن هناك بعض الأجناس يلائمها رقم pH يتراوح بين ٦ - ٨ وبعض الأميبات توجد بكثرة في الترب الحامضية ولا تلائمها الترب المتعادلة أو القاعدية . أحسن درجة حرارة ملائمة للابتدائيات تكون بين ١٨ - ٣٢ °م . عمليات إدارة التربة المختلفة التي تزيد من أعداد الأحياء المجهرية الأخرى سوف تزيد من أعداد ابتدائيات التربة .

عند الظروف القاسية من قلة الغذاء أو الأوكسجين فإن معظم الأنواع تمر في أطوار سائلة (تنكيس) . فائدة الابتدائيات للتربة هي القيام بعملية تحليل المخلفات العضوية وتحرير العناصر الغذائية المختلفة ولكن قد تضر التربة من ناحية تغذيتها على الأجناس البكتيرية . النافعة .

٧ - مجموعة حيوانات التربة (Macrofona) Soli Animals

إن مدرسنا سابقاً يقع ضمن الأحياء المجهرية التي لا ترى بالعين المجردة (Microfona) . وفي هذا الموضوع نتطرق بصورة مختصرة جداً الى التحدث على الأحياء الكبيرة نوعاً ما التي يمكن رؤية معظمها بالعين المجردة . معظم الترب تحوي اعداداً كبيرة وأنواعاً كثيرة من الحيوانات التي يمكن ان يكون لها دور مهم جداً في عمليات تحسين التربة وتحليل المخلفات . وقد اهتمت دراسة أهميتها من كثير من علماء التربة موازنة بالدراسات المكثفة التي اجريت على الأحياء المجهرية .

تشمل حيوانات التربة ، الديدان الأرضية earthworms ، والديدان السلوكية wireworms ، والنمل الأبيض termites ، والنمل الأعتيادي ants ، والديدان الأليفة millipeds وبعض يرقات الحشرات المختلفة . هذه الحيوانات لها القابلية

على الحفر داخل التربة **burrowing** لعمل حجرات تسكن فيها لها اهمية كبيرة في تحسين تركيب التربة وبالتالي تحسين التهوية ونفاذية الماء داخلها

أما حيوانات التربة التي ليس لها القابلية على الحفر **non-burrowing animals** فتشمل الديدان الخيطية **nematodes** والديدان المسطحة **flatworms** والابتدائيات فانها جميعاً تعيش في انايبب التربة الشعرية المليئة بالماء او في اغشية الماء المتكونة حول حبيبات التربة . وعند جفاف التربة تتكيس كوسيلة لمقاومة الظروف القياسية . هناك حيوانات اخرى تعيش في التربة تشمل انواعاً مختلفة من الخنافس **beetles** ومتساويات الأرجل **isopods** والسوس أو العث **mites** ... الخ . تتغذى هذه الحيوانات على الجزء العضوي من التربة او على الاحياء الاخرى . قسم قليل من هذه الحيوانات كالنمل الأبيض أو متساويات الأرجل لها القابلية على استعمال المخلفات العضوية الحديثة ولكن معظمها يجب ان تاخذ مواد عضوية متحللة قد تحللت من قبل الاحياء الاخرى الموجودة في التربة . فيما يأتي شرح مفصل اكثر لبعض حيوانات التربة .

Earthworms : ديدان الارض

يوجد حوالي ١٨٠٠ نوعاً مصنفاً من ديدان الارض واعداها في التربة تعتمد بصورة رئيسية على توفر الغذاء والماء حيث تبلغ نسبة الماء حوالي ٥٠ - ٩٠ ٪ من وزنها . اذا قلت هذه النسبة بحدود ١٨ ٪ فأنها لاتستطيع الحركة والحفر داخل التربة . معظم ديدان الارض لاتكون نشطة عند رقم **pH** اقل من ٤ وهناك بعض الانواع المقاومة للحموضة . اعدادها تتراوح بين (١) الى (٤٠٠) لكل متر مربع من التربة وتتراوح كتلتها الحية بين غرام واحد الى (٢٥٠) غم لكل متر مربع . ان مرور المخلفات العضوية واجزاء التربة المعدنية داخل جسم دودة الارض يساعد على عملية تحليل المادة العضوية وتحويل عناصر التربة المعدنية غير الذائبة الى عناصر ذائبة تطرح للتربة لتكون جاهزة للنبات . وهذه العملية تساعد ايضاً على زيادة ثباتية تركيب التربة . كذلك فإن حفر ديدان الارض داخل التربة يساعد على

تحسين تهويتها ونفاذية الماء من خلالها . ولهذه الصفة اهمية كبيرة في الترب الطينية او الترب القليلة التهوية اذ تساعد على تحسين نمو النباتات المزروعة .

مفصليات التربة Soil Arthropods

تشمل المفصليات : العقارب scorpions ، والعناكب spiders قمل الخشب wood lice ، والديدان الألفية millipedes ، وأم أربع وأربعين centipedes والفئران ، ويرقات الحشرات ... الخ . ان أهمية هذه الحيوانات في تحليل المواد العضوية وتكوين دبال التربة غير معروفة ولكن من دون شك لها أهمية في الكثير من الترب حيث انه عن طريق تغذيتها تسرع في تحليل المخلفات العضوية الموجودة على سطح التربة خصوصاً في حقول الغابات .

الديدان الخيطية : Nematodes

الديدان الخيطية للتربة عبارة عن ديدان صغيرة مدورة يتراوح طولها بين ٠.٥ - ٤ ملم وقطرها بين ٥٠ - ٢٥٠ ميكرون . يوجد حوالي ٢.٠٠٠ نوع منها موجودة في التربة وحوالي نصف هذا العدد تكون متطفلة على جذور النباتات . عددها يختلف من تربة الى اخرى وكمعدل يتراوح بين ٥ الى ١٠ ملايين لكل متر مربع وهناك بعض البحوث تعطي ارقاماً بحدود ٣٠ مليون . من المحتمل عدم اسهام الديدان الخيطية في تحليل المخلفات العضوية بصورة مباشرة ولم يذكر لها أهمية في تحسين صفات التربة الفيزيائية ولكن لها تأثيرات سلبية على اعداد احياء مجهرية التربة المختلفة اذ تعد تلك الاحياء غذاءها الرئيس .

الفصل الرابع

« دورة الكربون »

Carbon Cycle

مقدمة :


يعد الكربون الحجر الأساس في بناء الخلية الحية وتتراوح نسبته في خلايا الكائنات المجهرية بصورة عامة بين ٤٠ - ٥٠ ٪ من الوزن الجاف حيث تحصل عليه من غاز ثاني اوكسيد الكربون الموجود بكمية محدودة تبلغ حوالي ٠,٣ ٪ من مكونات الهواء الجوي . يتحول غاز CO_2 الى الحالة العضوية بفعل الكائنات الذاتية التغذية الضوئية مثل النباتات الخضراء الراقية على سطح التربة والطحالب التي تعيش في الأوساط المائية وعلى سطح التربة وبعض الأجناس الكثيرة . لذا تعد هذه الكائنات مصدراً لتزويد الكائنات العضوية التغذية من حيوانات وكائنات دقيقة لانتحتوي خلاياها على مادة الكلوروفيل بالمركبات العضوية اللازمة .

عندما يتحول الكربون الى الصورة المرتبطة يصبح غير صالح لتغذية الأجيال الجديدة من النباتات . لذا بات من الضروري ان تتحلل المواد العضوية ويتحول كاربونها العضوي ثانية الى غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي ينطلق مرة اخرى الى الهواء الجوي لضمان استمرار الحياة للكائنات الراقية .

يقدر استهلاك النباتات على سطح الارض من CO_2 حوالي $1,3 \times 10^{11}$ كيلو غرام سنوياً وهي كمية تعادل $\frac{1}{100}$ من كمية CO_2 الموجودة في الهواء الجوي أو $\frac{1}{1000}$ من الكمية الدائبة في المحيطات . ان استمرار استهلاك مثل هذه الكمية الضخمة من CO_2 ووجودها بكمية محدودة في الهواء ومياه البحار تكون عرضة للنفاذ ما لم يتم تعويضها بفعل الكائنات المجهرية .

من مراجعة دورة الكربون (شكل ٥) يظهر ان قسماً من النباتات ترجع الى التربة على هيئة مخلفات نباتية ويؤكل منها من قبل الحيوانات . واخيراً نجد ان هذا القسم ايضاً يأخذ طريقه الى التربة . بالاضافة الى ذلك فالاحياء الدقيقة التي تموت بين فترة واخرى بسبب قلة الغذاء أو لاسباب اخرى تكون ايضاً مصدراً من

مصادر التربة العضوية. جميع هذه المواد مصيرها التحلل الى مكوناتها المعدنية
الاصلية والتي من ضمنها غاز CO_2



شكل (٥) دورة الكربون في الطبيعة


بعض الاعتبارات الكيميائية الحيوية في تحليل المادة العضوية

قبل الدخول في التفاعلات الكيميائية التي لها علاقة بفعل الاحياء المجهرية يجب ان نوضح بعض الاعتبارات الفلسفية المتداخلة في تغذية هذه الاحياء .



- ١ - تجهيز الكائنات الدقيقة بالعناصر اللازمة لتخليق بروتوبلازم الخلية .
- ٢ - امدادها بالطاقة اللازمة لنمو خلاياها وعملاتها الميتابوليكية .
- ٣ - تعمل العناصر الغذائية كمستقبلات للالكترونات المنطلقة من التفاعلات المنتجة للطاقة في الكائن الحي ، ففي الكائنات الهوائية يعمل الأوكسجين كمستقبل نهائي للالكترونات . أما في الكائنات اللاهوائية فتعمل بعض المركبات المعدنية مثل NO_3^- , SO_4^{2-} كمستقبل للالكترونات بدلاً من الأوكسجين إذ تختزل الى H_2S و NH_3 أو N_2 على التوالي . كذلك يمكن لبعض المركبات العضوية أن تعمل كمستقبل للالكترونات مثل حامض البيروفك **Pyruvic acid** الذي يتحول الى ايثانول **ethanol** بوساطة الخمائر او الى حامض اللاكتيك **Lactic acid** بوساطة بكتريا حامض اللاكتيك .

أما الاعتبارات الكيميائية الحيوية حول انتاج الطاقة واستهلاكها من الكائنات الدقيقة خلال مراحل تحليل المادة العضوية ، وقد بينا سابقاً أن CO_2 الذي يتكون خلال عمليات التمثيل الغذائي للاحياء المجهرية الهوائية واللاهوائية من العوامل الضرورية لا لأنه يكمل دورة الكربون فحسب ولكن لتأثيره المباشر ايضاً في نمو بعض الكائنات الدقيقة الذاتية التغذية الكيميائية او الضوئية مثل **Photo- and chemo- autotrophs** تستخدم CO_2 مصدراً وحيداً للكربون في تغذيتها إذ ان الاحياء المجهرية الذاتية التغذية الكيميائية تحتاج بصورة عامة الى الاملاح المعدنية ، CO_2 ، O_2 ، والماء لتخليق المركبات البروتوبلازمية . اما الاحياء المجهرية غير الذاتية (العضوية) التغذية من بكتريا وأكتينومايسيتيات وفطريات فانها تحتاج الى بعض المصادر الكربونية البسيطة التي تغطي احتياجاتها كالكسريات والاحماض العضوية بالإضافة الى العناصر المعدنية . لذا فان الكائنات الدقيقة تحتاج الى امداد مستمر بالطاقة وهذا يتم عن طريق الاكسدة الحيوية للمركبات العضوية وغير العضوية .

ان التفاعلات الكيميائية الحيوية اما ان تكون منتجة للطاقة أو مستهلكة لها . والطاقة التي تنتج يمكن ان تستخدم في اداء عمل معين أو تكون البداية للاستمرار في تفاعل اخر جديد . ان الطاقة من الناحية الكيميائية البحتة تنتقل بصورة تامة من حالة الى اخرى او من الناحية الطبيعية فان جزءاً من هذه الطاقة يفقد بصورة حرارة . الكائنات الدقيقة تحتاج الى الطاقة من اجل نموها وهذا يتم عن طريق تأكسد المواد العضوية وغير العضوية فالكائنات الهوائية الإجبارية والاختيارية العضوية التغذية تؤكسد الكلوكوز مثلاً الى غاز ثاني أكسيد الكربون من أجل الحصول على الطاقة الكبيرة الناتجة من التأكسد كما في المعادلة الآتية ،




أما الهوائية الإجبارية الذاتية التغذية فبإمكانها أن تؤكسد الأمونيوم في ملح النشادر مثلاً الى نترات ثم الى نترات للحصول على الطاقة الناتجة من عملية الأكسدة كما في المعادلة الآتية ،




إن الكائن الدقيق المسؤول عن كلا الحالتين لايحتفظ بداخله على كل هذه الطاقة الناتجة من عملية الأكسدة . نسبة الطاقة المحتجزة داخل الجهاز الحيوي الى الكمية الناتجة من الطاقة Ei/ET تسمى كفاءة الطاقة الحرة **Free energy efficiency** . فعندما يذكر ان كمية الطاقة الناتجة من أكسدة كلوريد الأمونيوم الى نترات هي ٦٦ كالوري فأن الطاقة التي تستفيد منها بكتريا *Nitrosomonas* تكون في الواقع حاصل ضرب الطاقة الناتجة \times كفاءة الطاقة الحرة .

مما تقدم يتضح ان الأوكسجين هو العامل المؤكسد أي ان الطاقة تنطلق بفعل الأوكسجين على سكر الكلوكوز او على كلوريد الامونيوم ، ولكن في الحقيقة تحدث عمليات الأكسدة الحيوية دون اضافة اوكسجين ولكن بالانتزاع الهيدروجين او الالكترونات في المعادلتين الآتيتين ،




فالعامل المؤكسد في المعادلتين ليس الأوكسجين . يتضح مما تقدم انه لأتمام عملية الأكسدة يجب نزع ذرات الهيدروجين أو الألكترونات وهذا ما يحدث فعلاً عند التفاعل مع الاوكسجين الذي يعمل في هذه الحالة كمستقبل للألكترونات او الهيدروجين .

في الكائنات الهوائية لا يكون الأوكسجين السبب المباشر للأكسدة بل هو في الواقع عبارة عن مستقبل للألكترونات التي تنطلق في أثناء العملية ويتكون الماء عن طريق اختزال الأوكسجين بواسطة الألكتروليتات أو الهيدروجين. أما في غياب الأوكسجين (الكائنات اللاهوائية) فانه هناك مركبات أوكسجينية أخرى يمكن ان تعمل كمستقبلات للألكترونات مثل النترات NO_3^- لبعض انواع الجنس *Pseudomonas* ويكون ناتج اختزال النترات هو النيتروجين N_2 والكبريتات SO_4^{2-} في البكتريا *Desulfovibrio desulfuricans* ويكون ناتج الاختزال هو كبريتيد الهيدروجين H_2S ، وثاني اوكسيد الكاربون CO_2 لجنس *Methanobacterium* ويكون ناتج الاختزال هو الميثان CH_4 وهكذا. ان هذه المواد لاتستخدم كمصدر للأوكسجين (كما كان المفهوم سابقاً) ولكن كمستقبلات للهيدروجين. أما الاجناس *Clostridium* اللاهوائية الاجبارية والـ *Lactobacillus* اللاهوائية الاختيارية فهي لاتستخدم مركبات معدنية كمستقبلات للألكترونات. ففي هذه الاجناس من البكتريا يفقد الهيدروجين المنتزع من المركبات العضوية في تفاعلات اخرى مع احد نواتج تكسير الكربوهيدرات ويمكن تمثيل ذلك بالتخمير اللاكتيكي للكلوكوز كما في المعادلة الآتية ،



وليس من الضروري كذلك ان تكون جميع التفاعلات منتجة او مستهلكة للطاقة بالنسبة للكائن المجهرى فكثير من المركبات المعقدة يجب تحويلها اولاً الى صورة ايسط قبل ان تستخدم. مثال ذلك الكائنات الدقيقة التي تحلل السيلولوز حيث تحولوه من صورة السلاسل الطويلة للكاربوهيدرات الى سكريات بسيطة كما في المعادلة الآتية

$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$$



ففي، التفاعل السابق لانتج طاقة تستفيد منها الكائنات النشطة في تحليل السليلوز ولكن الكلوكوز الناتج عنها يمكن للكائن المجهرى ان يحرق منه الطاقة بعمليات التحول الغذائي التي يستخدمها في بناء الخلية وهذا ينطبق ايضاً على المواد العضوية الاخر كالهيميسليلوز واللكتين والمركبات الكربوهيدراتية الاخرى المعقدة التركيب والتي ستشرح بالتفصيل في مواضع قادمة .

إن القيام بعمليات الأكسدة سواء في وجود الأوكسجين أو غيابه لا يكفي
لأكتساب الكائن الحي الطاقة النافعة حيوياً ولكي يتمكن من استخدام الطاقة

بطريقة فعالة في اثناء النمو فانه يجب تنظيم عمليات تخزين الطاقة وإطلاقها تنظيمياً محكماً ويتم ذلك بواسطة مركبات الـ **ADP** والـ **ATP**. فعندما يقوم الكائن الدقيق بأنتاج الطاقة خلال عمليات الأكسدة فانه يستخدم جزءاً منها في تحويل الـ **ADP** الى **ATP** بوجود الفوسفور غير العضوي .



وعند احتياج الكائن الدقيق للطاقة من اجل استخدامها في بناء الخلية أو في التفاعلات الاختزالية بها فإن الـ **ATP** تتحول مرة أخرى الى **ADP** مع التحكم في انطلاق الطاقة منها



النشاط الأنزيمي في التربة :

معظم التفاعلات الكيميائية التي تتم داخل جسم التربة لا يمكن ان تحدث الا بواسطة الأنزيمات المختلفة التي تفرزها الكائنات الدقيقة ولكل تفاعل انزيم خاص به يفرزه كائن حي متخصص تقسم الأنزيمات بصورة عامة على قسمين ،

القسم الاول يسمى Constitutive (Entracellular) enzymes

وهذه تشمل الأنزيمات الموجودة بصورة طبيعية داخل الخلية كأنزيمات دورة الكلايكوليس (glycolysis) وأنزيمات دورة الحامض الكربوكسيلي الثلاثي (T.C.A.) . وهذه الأنزيمات تخرج خارج الخلية فقط عند موتها وتحللها بفعل نشاط احياء أخرى .

القسم الثاني يسمى Inducible (Extracellular) enzymes

وهذه تشمل الأنزيمات غير الموجودة بصورة طبيعية داخل الخلية وإنما تحفز وتكون وتفرز خارج الخلية الحية نتيجة وجود مركبات عضوية معينة كأنزيمات السيلوليز Cellulases التي تتكون نتيجة لوجود السليلوز في بيئة التربة والكيتينيز chitinases التي تتكون نتيجة لوجود الكايتين في بيئة التربة وهكذا .

يقدر نشاط أنزيم معين في تربة ما بإضافة المركب العضوي المناسب لعمل ذلك الأنزيم المطلوب دراسته إلى التربة ثم التحصين في ظروف مناسبة يتم بعدها قياس أحد نواتج التفاعل الناتجة بفعل الأنزيم على ذلك المركب العضوي . كذلك يمكن تقدير الجزء المستهلك من المادة المضافة ، المشكلة الرئيسية بالنسبة لقياس نشاط أنزيم معين في وسط كالتربة هي وجود الخلايا الحية التي يمكن ان تنمو خلال فترة التحصين وبالتالي يمكن أن تؤثر في النتيجة . حيث انها سوف تستهلك قسما من المادة المضافة أو نواتج تحليلها مما قد يؤدي إلى اختفاء أي منها أو بقاء كمية قليلة من تلك المادة أو من نواتج تحليلها وفي كلتا الحالتين يتأثر نشاط الأنزيم المراد دراسته .

بالإمكان التغلب على المشكلة السابقة بطرق عديدة منها إضافة مادة التولوين **Toluene** بتركيز معين إلى عينة التربة كمادة قاتلة للكائنات الحية وبالتالي إيقاف نشاطها في أثناء فترة تقدير الأنزيم . وهذه المادة شائعة الاستعمال عند تقدير نشاط بعض الأنزيمات في التربة كالـ **urease** والفوسفاتيز **phosphatase** والسكريز **saccharase** وأنزيمات أخرى . لأستعمال التولوين عيوب ، منها انها لا تقتل جميع الكائنات الحية كما انها قد تسبب في تحليل خلايا بعض الكائنات الحساسة لها مما يؤدي إلى خروج الأنزيمات الداخلية التي قد تؤثر في عملية القياس . ومن الممكن استعمال طريقة أخرى وهي تعقيم التربة عن طريق الأشعاع ذي الطاقة العالية حيث يسبب هذا الأشعاع فقدان الخلية لحيويتها . في مثل هذه الطريقة يجب تجنب استعمال الجرعات العالية من الأشعاع لكي نسمح للأنزيمات ان تقوم بعملها . كما يمكن استخدام اشعاع الكتروني أو اشعة كاما الناتجة من كوبلت ^{60}Co أو اشعة أكس للغرض نفسه ، وهناك طرق أخرى لأمجال لذكرها .

ان الطرق المذكورة في اعلاه لتقدير النشاط الأنزيمي لتربة ما لاتعد مثالية أو نموذجية عند تقدير الأنزيمات الخارجية التي توجد بصورة حرة في التربة وبصورة عامة فان أنسب الطرق هي تلك التي تتضمن ما يأتي ،

- أ - إيقاف تكوين كميات جديدة من الأنزيمات عن طريق التعقيم .
- ب - إيقاف عملية تكاثر الكائنات المجهرية وبالتالي إيقاف تمثيلها للمواد المضافة أو لنواتج التحلل باتباع أيضاً طريقة التعقيم .

- ج- يجب ان تمنع الطريقة المستعملة تكسير اسطح الخلايا وبذلك لاتصبح المواد في متناول الانزيمات الداخلية للخلية .
- د - يجب ان لا تؤثر الطريقة في الانزيمات الخارجية في العينات المراد دراستها .

لقد أتم علماء كثيرون دراسة تقدير النشاط الانزيمي في التربة وبعض الانزيمات التي درست موضحة في الجدول (٦) مع تفاعلاتها . وسبق لنا ان قلنا ان من النادر وجود تلك الانزيمات بصورة حرة في التربة اذ ان معظمها من الانزيمات الداخلية وتظهر في الوسط نتيجة تحليل الخلايا . هناك عوامل عديدة تؤثر في النشاط الأنزيمي في التربة منها درجة تركيز ايون الهيدروجين والحرارة ودرجة ملوحة التربة وغيرها .

طرق قياس درجة تحليل المادة العضوية :

ان من الصعوبة بمكان قياس درجة تحليل المادة العضوية في التربة نظراً لصعوبة التحكم بظروف التحلل وقياس المادة المتحللة ونواتج تحليلها مع تحديد مصدر تلك المواد . فاذا أخذنا مثلاً تحرر CO_2 من التربة كأساس لقياس مقدار تحليل المواد العضوية فيها فإن النتيجة لاتكون بتلك الدقة وذلك لأن تحرر قسم من هذا الغاز قد يكون ناتجاً عن تنفس الجذور او من خلال تفاعلات كيميائية وحيوية اخرى تجري في التربة ولهذا السبب نلاحظ دائماً عند قياس كمية CO_2 المتحررة من التربة مختبرياً تكون اقل من كمية CO_2 المتحررة من التربة حقلياً خلال القيام ببعض التجارب . بصورة عامة هناك اربعة طرق يمكن بواسطتها قياس درجة تحليل المادة العضوية في تربة ما هي :

- ١ - قياس كمية ثاني اوكسيد الكربون المتحررة من المادة العضوية .
- ٢ - قياس كمية الاوكسجين المستهلكة لأكسدة المادة العضوية .
- ٣ - تقدير النقص في كمية المادة العضوية بالطرق الكيميائية او الوزنية .
- ٤ - تتبع اختفاء مادة معينة مثل السيليلوز او اللكتين أو والهيميسيليلوز .

إن من اكثر الطرق شيوعاً هي طريقة قياس كمية CO_2 المتحررة من المادة العضوية خلال فترة تحضين معينة ، لتقدير كمية CO_2 يمرر هواء خالٍ من هذا الغاز على سطح عينة التربة المعاملة بالمادة العضوية والمحضنة في درجة حرارة ثابتة

جدول (٦) بعض الانزيمات الشائعة في التربة وتفاعلاتها .

تفاعلاتها	الانزيمات
التحلل المائي للنشا	<p>Hydrolysis of starch</p> <p>Amylase</p>
الاحماض الدهنية + كليسرول → الشحوم	<p>Lipid ← glycerol + fatty acids</p> <p>Lipase</p>
التحلل المائي للسيليلوز	<p>Hydrolysis of cellulose</p> <p>Cellulase</p>
تحويل البروتين الى الاحماض الامينية	<p>Conversion of protein to amino acids</p> <p>proteinases</p>
ثاني اوكسيد الكاربون + امونيا → يوريا	<p>Urea → NH₃ + CO₂</p> <p>Urease</p>
كلوكوز → دكستران	<p>Dextran → glucose</p> <p>Dextranase</p>
الكبريتات اللاعضوية → استرات الكبريتات	<p>Sulfate ester → Inorganic sulfate</p> <p>Sulfatase</p>
اوكسجين + ماء → بيروكسيد الهيدروجين	<p>2H₂O₂ → 2H₂O + O₂</p> <p>Catalase</p>
فركتوز + كلوكوز → سكروز	<p>Sucrose → glucose + fructose</p> <p>Invertase</p>

فيحمل تيار الهواء غاز ثاني اوكسيد الكربون المنطلق من التربة حيث يتم تقديره بعد ذلك بالطرق الوزنية او الحجمية بعد امتصاصه في مواد خاصة كهيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم مثلاً. هناك طرق اخرى تستخدم و 'ا' المانومتريات **Manometric method** لقياس درجة تحلل المادة العضوية حيث يجري قياس تبادل الغازات في دورقين من دوارق التنفس بوجود مادة قلوية أو عدم وجودها. فالدورق الاول يمثل كمية الاوكسجين المستهلك في حين يمثل الثاني مجموع الاوكسجين المستهلك و CO_2 المتحرر. الفرق بين قراءات المانومتريات المثبتة على الدوارق تمثل معدل إنطلاق CO_2 . في كلا الطريقتين السابقتين يمكن حساب معدلات التحلل على فترات منتظمة وقصيرة من دون تحريك التربة.

عمليات انحلال المواد العضوية **Decomposition of Organic Matter**

من المحتمل ان اهم وظيفة تقوم بها احياء مجهرية التربة من بكتريات وفطريات وكائنات اخرى هي تحليل المادة العضوية الى عناصرها المعدنية الاصلية ن كاربون ، ونيتروجين ، وكبريت ، وعناصر صغرى .

المقصود بالمادة العضوية هنا هو بقايا النباتات والحيوانات غير المتحللة التي تضاف او تقلب في التربة لغرض الافادة منها سعاداً عضوياً ومواد متباينة في تحللها . المراحل النهائية من التحلل هي ، توفير عناصر غذائية جاهزة للنبات ، وخلايا ميكروبية ، ومواد سوداء اللون تعرف بدبال التربة **Soil humic matter** . وعلى الرغم من ان دبال التربة هو اكثر المواد العضوية مقاومة للتحلل ، الا انه يتحلل ببطء الى العناصر الغذائية المختلفة اضافة الى ذلك فان خلايا الكائنات الحية الموجودة في التربة هي ايضاً تتحلل بعد موتها لتكملة دورة الكاربون والنيتروجين .

أ - تركيب المخلفات العضوية :

تتركب المخلفات العضوية ذات الاصل النباتي من مواد سليولوزية تتراوح نسبتها بين ١٥ - ٦٠ ٪ من الوزن الجاف للنباتات المختلفة ومواد هيميسليلوزية تتراوح نسبتها بين ١٠ - ٣٠ ٪ من الوزن الجاف ، ومواد بروتينية بين ٥ - ١٠ ٪ ، وليكثينات بين ٥ - ٣٠ ٪ ، ونشاء بين ٥ - ٣٠ ٪ ، وسكريات بسيطة واحماض عضوية

واحماض امينية وتتراوح نسبتها بين ٥ - ٣٠ ٪ . اما الدهون والشموع والزيوت والاصباغ فلا تزيد نسبتها على ٢ ٪ من الوزن الجاف للنبات . عدا بعض الاصناف فمثلاً الصنوبريات تحوي الى حد ٢٤ ٪ من هذه المواد .


ب - انحلال المواد العضوية

ان دراسة ميكانيكية تحليل المركبات العضوية المكونة لبقايا النباتات وفهم عملية تكون دبال التربة يحتاج الى دراية واسعة باساسيات علم الكيمياء الحياتية وسوف نحاول جهد الامكان توضيح بعضها في اثناء الشرح . سوف نبدأ بالتحلل الحيوي لأبسط تراكيب النبات وهي السكريات الاحادية متمثلة بتحلل الكلوكوز ثم ننتقل الى المركبات الاكثر تعقيداً وفي الاخر سوف ندرس تحليل اللكتين الذي يعد أكثر المركبات النباتية مقاومة للتحلل . اما تحليل دبال التربة فسوف يشرح في نهاية الموضوع .


١ - السكريات الاحادية Monosaccharides

أ - تركيبها Structures

تشمل السكريات الاحادية كل من الكلوكوز - الكالكتوز ، والمانوز والسكريات الأمينية الخ . تركيبها الكيميائي حسب Hawarth representation يكون كما يأتي ،



α - Glucose



β - Glucose

الفرق بين glucose - B- glucose هو في مجموعة ال OH الواقعة في الكربون رقم ١ ففي التركيب الاول تكون للأعلى وفي الثاني تكون للأسفل .

الكالكثوز مشابه في تركيبه للكلوكوز ماعدا موقع مجموعة ال OH في الكربون رقم ٤ فتكون على العكس . المانوز مشابه لتركيب الكلوكوز عدا ان موقع ال OH في الكربون رقم ٢ تكون بالعكس . ويمكن رسم تركيب - α و β لكل منهما .

تركيب السكريات الامينية ال glucosamine مثلاً هو نفس تركيب الكلوكوز عدا احلال مجموعة امين (NH_2) محل مجموعة ال OH في الكربون رقم ٢ . ال galactosamine مشابه لتركيب الكالكثوز عدا احلال مجموعة الأمين محل مجموعة الهيدروكسيل في الكربون رقم ٢ . ويمكن رسم α , β لكل منهما . وهكذا فبتغيير بسيط في تركيب الكلوكوز يمكن رسم اي مركب من مركبات السكريات الاحادية (للحصول على معلومات تفصيلية اكثر يجب الرجوع الى اي كتاب في موضوع الكيمياء الحياتية)

ب - تحليلها Decomposition

سوف تمثل تحلات السكريات الاحادية بتحلل الكلوكوز . وحدة الكلوكوز صغيرة جداً بحيث يمكن لأي كائن حي ان يأخذه مباشرة الى داخل الخلية من الوسط الذي يعيش فيه سواء كان بيئة غذائية أو تربة . بعد ان يؤخذ الكلوكوز الى داخل الخلية يمر بدورة الكلايكوليسز glycolysis التي هي عبارة عن مجموعة من التفاعلات تنتهي بتكوين حامض البيروفك Pyruvic acid . اذا كانت الظروف المحيطة لاهوائية (تربة غدقة) فسوف يتحول هذا الحامض بوساطة البكتريا اللاهوائية السائدة تحت هذه الظروف الى احماض عضوية مختلفة وكحول يطرح الزائد منها عن حاجة الخلية الى التربة . لذلك يلاحظ وجود كل من الأيثانول وحموض ال Succinic butyric Propionic acetic formic ... السخ في التربة العذقة . اضافة الى تكون غازات الهيدروجين ، وثاني اوكسيد الكربون والميثان ، اما اذا كانت الظروف هوائية فسوف يدخل حامض البيروفك داخل جسم خلية البكتريات او الفطريات الهوائية في دورة حامض الكاربوكسيل الثلاثي T.C.A. ويكون ناتج التحلل النهائي غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي يطرح الى الجو وكمية كبيرة من الطاقة موازنة بالكمية القليلة منها التي تنتج تحت الظروف اللاهوائية .

السؤال إذا كانت الظروف هوائية تماماً فهل سيتحلل كل الكلوكوز المضاف الى التربة بصورة نقية الى CO_2 ؟ الجواب على هذا السؤال طبعاً لا لان قسماً منه او مركباته الوسطية سوف تدخل في بناء خلايا جديدة (كتلة حية) والقسم الآخر سوف يرتبط بجزيئات الدبال او الطين الموجودة في التربة التي تحمل شحنات

سالبة . عملية الربط هذه تكون بوساطة اواصر هيدروجينية او بوساطة قوى اخرى . والقسم الثالث سوف يتحلل الى غاز ثاني اوكسيد الكربون . نسبة كاربون الكلوكوز الذي يتحلل الى غاز CO_2 تختلف من تربة الى اخرى وحسب الظروف البيئية المحيطة ، ولكن بصورة عامة قد تصل هذه النسبة الى حوالي ٧٥ ٪ من الكاربون المضاف الى التربة في الاسبوع الاول والى حوالي ٨٧ ٪ في نهاية الاسبوع الثاني عشر من التحضين .

ويمكن القول بصورة عامة ان جميع اجناس وانواع البكتريا والفطريات بإمكانها ان تحلل الكلوكوز والسكريات الاحادية الاخرى لاستعمالها مصادر جاهزة للطاقة والكاربون .

٢ - السكريات المتعددة Polysaccharides :


تشمل السكريات المتعددة كلاً من السيللوز ، والهيميسيللوز ، والنشاء ، والكتين ، والبكتين الخ وفيما يأتي شرح لتركيب وتحلل كل منها ،

١ - السيللوز : Cellulose

١ - تركيبه : Structure

السيللوز عبارة عن مادة كاربوهيدراتية تتكون من وحدات من الكلوكوز مرتبطة ببعضها طولياً بروابط كلايكوسيدية من نوع 1,4 - β كما في الشكل التالي ١ -

يتكون جزيء السيللوز من حوالي ٢٠٠٠ - ١٠,٠٠٠ وحدة كلوكوز وقد تصل احياناً الى ١٥,٠٠٠ حيث تختلف عدد وحدات الكلوكوز حسب نوع النبات . وتتراوح الاوزان الجزيئية له بين ٢٠٠,٠٠٠ - ٢,٤ مليون . يوجد السيللوز في النباتات البذرية والطحالب وكثير من الفطريات واكياس عدد من الابدائيات ويتركز وجوده في



جدار الخلية على هيئة وحدات دقيقة ذات اشكال عصوية تعرف بـ *micelles* وهذه بنورها تكون وحدات اكبر في التركيب لتشكل اليافاً دقيقة تعرف بـ *micro fibrils* واقطارها الداخلية بين ٠,٢ - ١٠ ميكروميتر. وتتكون الالياف السيللوزية من جزء بلوري *crystalline part* سلاسله مثبتة بوساطة اواصر هيدروجينية وجزء غير ثابت وغير منتظم الشكل. إن وحدة الـ *micell* تحتوي تقريباً على ١٠٠٠ وحدة من الكلوكوز. وبصورة عامة يكون السيللوز من ١٥ - ٦٠ % من الوزن الجاف للنبات. تحتوي الاعشاب الصغيرة والبقليات على نسبة ١٥ % سيللوز. اما المواد الخشبية من اشجار الغابات فتحتوي على اكثر من ٥٠ %.

ب - تحلله *Decomposition* :

تحلل السيللوز يحدث طبقة بعد طبقة اخرى. اي عند تحلل طبقة من الالياف السيللوزية الى وحدات الكلوكوز تليها الطبقة الثانية وهكذا. لا يمكن للاحياء المجهرية المحللة للسيللوز من بكتريات وفطريات ان تأخذ جزيئة السيللوز الكبيرة مباشرة الى داخل الخلية. فلا بد من ان تتكسر الى اجزاء صغيرة فأصغر.

لذلك فالخطوة الاولى من التحلل تتم بالتصاق او ادمصاص الخلية المحللة على جزيئة السيللوز ثم تفرز عليها انزيمات خارجية محفزة تسمى مجتمعة بأنزيمات السيلوليز *Cellulases*. وبفعل هذه الانزيمات ووجود الماء تتكسر جزيئة السيللوز الى *n cellotrioses* وهي عبارة عن ثلاث وحدات من الكلوكوز مرتبط بعضها ببعض ثم الى *n cellobioses* التي هي عبارة عن وحدتين من الكلوكوز

مرتبطتين ببعضها ثم الى **n glucose** . والكلكوز كما اشرنا سابقاً يؤخذ الى داخل الخلية لكي يستعمل مصدراً للكربون والطاقة لبناء كتلة حيوية جديدة .

يقسم بعض المختصين النظام الانزيمي لتحلل السيللوز **The cellulolytic enzymes** على ثلاثة انواع من الانزيمات .

١ - انزيم C_1 (enzyme - C_1) : وهو انزيم لم يتم وصفه حتى الآن وهو يقوم بتحطيم التركيب البلوري **Crystalline structure** ويمد المهاجم الاول في عملية تحلل السيللوز .

٢ - انزيم كلوكونيز **(Cx) exo and endo glucanase (4-1)** و دور هذا الانزيم هو اذابة مكونات السيللوز الى سكريات ثنائية (**cellobiose**) وسكريات احادية (**glucose**)

٣ - انزيم بيتا كلوكوسيريز **B-glucosidase** : وهذا الانزيم يكون الكلكوز في المرحلة الاخيرة من التحلل .


ليس كل السيللوز المضاف بصورة نقية الى التربة يتحلل الى CO_2 في حالة الظروف الهوائية بل ان قسماً منه او من مركباته الوسطية يساهم في بناء خلايا جديدة والقسم الآخر منه او مركباته الوسطية قبل ان تؤخذ الى داخل الخلية ترتبط مع الدبال او الطين الموجود في التربة . والقسم الثالث يتحلل الى غاز CO_2 . نسبة كاربون السيللوز الذي سيتحلل الى ثاني اوكسيد الكاربون تختلف من تربة الى اخرى حسب الظروف البيئية المحيطة . وبصورة عامة قد تصل هذه النسبة الى حوالي ٥٥ % من الكاربون المضاف بشكل سيللوز ، بعد ثلاثة اشهر .

ج - ميكانيكية ارتباط السيللوز بعبيبات الطين او الدبال :

كما ذكرنا اعلاه ان تحلل السيللوز يكون بوساطة مجموعة انزيمات السيلوليز المحفزة وهذا معناه ان اجناس البكتريا والفطريات المتخصصة في تحليل السيللوز لا تحلله في بداية اضافته للتربة كما في الكلكوز وانما تحتاج بعض الوقت لانتاج الانزيم (**Lag phase**) وفي هذه الحالة ستكون الفرصة اطول لتكوين معقدات بين

حبيبات الطين او المادة العضوية (الدبال) مع السيللوز (سيللوز- طين او سيللوز- دبال او طين- سيللوز- دبال). تتكون هذه المعقدات إما بواسطة اواصر هيدروجينية بين المجاميع الكثيرة من الهيدروكسيلات الداخلة في تركيب السيللوز مع الطين او الدبال، او في بعض الاحيان يمدى لمجاميع الـ CH_2OH ان تتأكسد الى مجاميع كاربوكسيل COOH لتكوين مركب آخر يسمى

polyglucuronic acid وذلك بواسطة بكتريا متخصصة للقيام بهذه العملية فقط. وهذا المركب الجديد يمكن ان يكون معقدات مع حبيبات الطين او الدبال عن طريق جسر من الكالسيوم او المغنيسيوم او اي عنصر ثنائي الشحنة الموجبة وذلك لتربط الشحنات السالبة الموجودة على سطوح الطين او المادة العضوية مع الشحنات السالبة لمجاميع الكاربوكسيل كما في الشكل الآتي :



إن عملية تثبيد السيللوز بهذه الطريقة سوف تجعله بعيداً عن متناول الاحياء المجهرية وبالتالي سيصبح أكثر مقاومة للتحلل (يتحلل ولكن ببطء) . إضافة الى ذلك فإن للتربة او مادة الدبال القابلية على تثبيد مجموعة انزيمات السيلليوليز نفسها لان الانزيم عبارة عن بروتين والبروتين يمكن ان يتثبد كما في السيللوز (سوف نلاحظ ذلك لاحقاً) وبالتالي سوف يتحول الانزيم من الحالة النشطة في تحليل السيللوز الى الحالة غير النشطة .

د - ظاهرة مانع الهدم الغذائي Catabolite Repression :

المقصود بهذه الظاهرة ان نواتج التفاعل يمكن ان تعمل على وقف تخليق المزيد من جزيئات الانزيم ، وهذه الظاهرة تكون مسيطرة من جينات معينة موجودة على كروموسوم الخلية . مهمة احد الجينات فتح عملية تكون الانزيم (انزيمات السيلليوليز في هذه الحالة) والآخر مهمته غلق العملية . زيادة تركيز الكلوكوز داخل الخلية عبارة عن مؤشر او انذار للجين الثاني تجعله يغلق تخليق الانزيم الى حين استعمال الكلوكوز الموجود داخل الخلية . نقصان تركيز الكلوكوز الى حد معين تكون مؤشراً للجين الاول لكي يعمل على فتح تخليق الانزيم ثانية وهكذا ، إن لهذه الظاهرة اهمية كبيرة من حيث إفرار الانزيم خارج الخلية من دون بيطرة معناه تكون كميات كبيرة من الكلوكوز أكثر من حاجة الخلية . تكون هذه الكميات الكبيرة من الكلوكوز معناه إعطاء فرصة للاحياء المجهرية الاخرى التي ليس لها القابلية على تحليل السيللوز لكي تستعمل الكلوكوز المتكون وبالتالي سوف تكون خسارة للخلية الاولى التي بذلت مجهوداً كبيراً في تحليل السيللوز . هنا من ناحية ومن ناحية اخرى سوف تكون الفرصة احسن لحبيبات الطين والدبال لكي تثبيد كميات اكبر من السيللوز بالطرق السابقة الذكر .

هـ - الأحياء المجهرية المحللة للسيللوز :

عدد كبير من أجناس البكتريات والأكتينومايسيتات والفطريات لها القابلية على أستعمال السيللوز كمصدر للكاربون والطاقة خصوصاً عند توفر قدر كاف من عنصر النتروجين الضروري لبناء الخلية (جدول ٧) فيعقب إضافة تبن الحنطة الذي يحوي على نسبة عالية من السيللوز زيادة كبيرة في أعداد الفطريات (قد تصل الى ١٠٠ خلية لكل غرام تربة) .

جدول (٧) بعض أجناس الأحياء المجهرية التي لها القدرة على تحليل
السيللوز

الأكثينومايسيتات	البكتريا	الفطريات
<i>Micromonospora</i>	<i>Bacillus</i>	<i>Coprinus</i> <i>Alternaria</i>
<i>Nocardia</i>	<i>Cellulomonas</i>	<i>Fusarium</i> <i>Chaetomium</i>
<i>Streptomyces</i>	<i>Clostridium</i>	<i>Penicillium</i> <i>Fomes</i>
<i>Streptoporangium</i>	<i>Corynebacterium</i>	<i>Rhizoctonia</i> <i>Myrothecium</i>
	<i>Cytophaga</i>	<i>Trametes</i> <i>Polyporus</i>
	<i>Polyangium</i>	<i>Trichothecium</i> <i>Rhizopus</i>
	<i>Pseudomonas</i>	<i>Zygorhynchus</i> <i>Trichoderma</i>
	<i>Sporocytophaga</i>	<i>Verticillium</i>
	<i>Vibrio</i>	<i>Aspergillus</i>
	<i>Cellvibrio</i>	

من المحتمل أن تكون الفطريات هي العامل الأساس في تحليل السيللوز في الأراضي الرطبة ، في حين يحتمل أن تكون البكتريا أكثر أهمية في هذا المجال في المناطق شبه الجاف . وبصورة عامة تكون أجناس الفطريات التي لها القابلية على إنتاج أنزيم السيلليوليز وبالتالي تحليل السيللوز أكثر بكثير من الأجناس البكتيرية القادرة على إنتاج هذا الأنزيم . تختلف أعداد البكتريا الهوائية التي تحلل السيللوز من تربة الى أخرى فقد توجد أحياناً بأعداد تقل عن ١٠٠ وفي أحيان أخرى بأعداد تزيد على ١٠ ملايين لكل غرام تربة .

العوامل التي تؤثر في عملية تحليل السيللوز

جميع العوامل التي درست سابقاً وهي تؤثر في الأحياء المجهرية الموجودة في التربة تؤثر أيضاً في عملية تحليل السيللوز أو أي مركب عضوي آخر يضاف للتربة . وبالنظر لوجود بعض الخصوصيات في هذه العوامل سوف نحاول شرحها بإيجاز ،

١ - توفر نيتروجين جاهز

السليلوز مركب كربوهيدراتي خال من عنصر النيتروجين وأي كائن حي يشارك في تحليله لاستعماله مصدراً للطاقة والكربون بحاجة الى نيتروجين لتكملة بناء الخلية (جدول ٨) . إضافة السليلوز الى تربة فقيرة بالنيتروجين الجاهز تبطيء من تحلله الى درجة كبيرة . لذلك يجب إضافة نيتروجين معدني كسماد

جدول (٨) يبين تأثير إضافة السليلوز والنيتروجين في المجاميع الميكروبية بالتربة .

التربة	المعاملة	عدد الاحياء لكل غرام تربة $\times 10^2$		
		فطريات	بكتريا	اكتينومايسيتات
١) تربة غير معاملة بكاربونات الكالسيوم $pH = ٥,١$	غير معاملة	١١٦	٣,٩٠٠	١,٣٠٠
	اضافة نيتروجين	١١٦	٣,٩٠٠	١,٣٠٠
	اضافة سليلوز	١٦٠	٣,٦٠٠	٦٠٠
	اضافة سليلوز ونيتروجين	٤,٨٠٠	٢,٥٠٠	٤٠٠
٢) تربة معاملة بكاربونات غير معاملة الكالسيوم $pH = ٦,٥$	غير معاملة	٢٥	٧,٧٠٠	٢,٨٠٠
	اضافة نيتروجين	٢٥	٧,٧٠٠	٢,٨٠٠
	اضافة سليلوز	٤٧	١٨,٠٠٠	٢,٢٠٠
	اضافة سليلوز ونيتروجين	٢٩٠	٤٧,٠٠٠	٣,٢٠٠

ملاحظة : الاضافات كانت كما يلي ١ -

سليلوز = ١%


نيتروجين على صورة نترات = ٠,١%

وفترة التحضين كانت مدة ١٧ يوم

نترات الأمونيوم للأسراع في عملية التحلل . في البداية يتناسب تحلل السيللوز طردياً مع النيتروجين المعدني المضاف الى حد توفر جزء واحد من النيتروجين لكل ٣٥ جزءاً من السيللوز . إضافة الأسمدة العضوية واليوريا أو الاحماض الأمينية تزيد من سرعة التحلل أيضاً .

٢ - درجة الحرارة .

ان تحلل السيللوز يمكن أن يتم في مدى حراري واسع فيحدث تحلل حتى في درجات الحرارة القريبة من الانجماد ويحدث تحلل حتى في درجة ٦٥° م . لكن في كلتا الحالتين يكون التحلل بطيئاً الا ان أفضل درجة حرارة ملائمة للتحلل هي القريبة من تلك تحتاجها الأحياء المجهرية المحبة للحرارة المعتدلة (mesophiles) . هناك تأثير واضح لفصول السنة في معدل التحلل (شكل ٦) وقد يكون ذلك راجعاً الى التغيرات في الحرارة والرطوبة من فصل الى آخر بدرجة كبيرة .



شكل (٦) تأثير فصل السنة في عملية تحلل السيللوز بالترربة (الكسندر ١٩٧٧)

٣ - الرطوبة والتهوية

تحلل السيليلوز يتم في ظروف هوائية هـلاهوائية ولكنه يكون أسرع بكثير في الظروف الهوائية لأنه في هذه الظروف يتم التحلل بواسطة عدد كبير من أجناس البكتريا بضمنها الأكتينومايسيتات والفطريات الهوائية . أما عندما تكون الظروف لاهوائية (تربة غدقة) فيتم التحلل بصورة رئيسة بواسطة البكتريا اللاهوائية فقط . أنسب رطوبة ملائمة لتحلل السيليلوز هي بين ٥٠ - ٦٠ ٪ من السعة التشبعية للتربة . ان زيادة الرطوبة على هذا الحد يؤدي الى زيادة نشاط البكتريا اللاهوائية المحللة للسيليلوز في حين تنخفض اعداد الفطريات (والاكثينومايسيتات) المحللة للسيليلوز . وفي مستوى الرطوبة المتوسط فانه يناسب نمو الفطريات والبكتريا الهوائية المحللة للسيليلوز وهناك سلالات تتحمل رطوبة اقل من المتوسط .

٤ - درجة تركيز أيون الهيدروجين pH

تكلّمنا سابقاً عن تأثير الرقم الهيدروجيني في الانواع المختلفة من الاحياء المجهرية وما ذكرناه ينطبق على تحلل السيليلوز حيث يحدث التحلل الجيد عند الظروف المتعادلة او الحامضية او القاعدية قليلاً . الا انه من الممكن أن يحدث تحلل في الترب الحامضية وحتى pH ٤ ؛ أو اقل وكذلك عند أرقام الـ pH العالية . وفي كلتا الحالتين يكون التحلل بطيئاً .

٥ - تأثير وجود أنواع اخرى من الكاربوهيدرات :

لقد لوحظ ان وجود مركبات عضوية سهلة الاستعمال من الاحياء المجهرية كالكلوكوز مثلاً في تربة ما يمكن أن تزيد من سرعة التحلل موازنة بالتربة التي لم يضاف اليها الكلوكوز . إن هذا قد يكون راجعاً الى نمو وتكاثر الاحياء المجهرية على حساب الكلوكوز أولاً وعند نفاذه سوف تضطر الاحياء المجهرية الى استعمال السيليلوز مصدراً للكربون والطاقة لانه يكون مصدرها الوحيد المتوفر .

٦ - درجة ارتباط السيللوز مع اللكتين .

يوجد السيللوز في الأجزاء النباتية مرتبطاً بمركبات أخرى كاللكتين مثلاً وكلما كانت درجة الارتباط هذه أقوى كان التحلل أبطأ . ومن المعلوم أن قوة الارتباط هذه تزيد كلما تقدم بالنبات العمر .

٧ - العمليات الزراعية المختلفة

أي عملية زراعية تؤدي الى زيادة أعداد الأحياء المجهرية المختلفة سوف يكون لها تأثير مباشر في عملية تحلل السيللوز .

٢ - النشاء Starch

تركيبه وتحلله Structure and Decomposition

النشاء مركب كربوهيدراتي يدخل في تركيب أنسجة الخشب وسيقان النبات والدرنات والبصلات والكرومات والثمار والبنور . كما تدخل في تركيبه خلايا الكثير من الأحياء المجهرية . يتكون النشاء من ارتباط وحدات الكلوكوز بروابط كلايكوسيدية من نوع α - 1,4 و α - 1,6 .

عملية تحلله في التربة تكون كتحلل السيللوز ولكن يكون تحلله بصورة عامة أسرع حيث أن عملية كسر روابط من نوع α - بواسطة أنزيمات الأميليز الخارجية تكون أسهل من كسر روابط من نوع β . حوالي ٤٨ % من كاربون النشاء يتحلل خلال الأسبوع الأول وحوالي ٧٢ % خلال الشهر الأول . وتصل النسبة الى حوالي ٨٠ % بعد ثلاثة أشهر من الأضافة .

٣ - الهيميسيليلوزات Hemicelluloses

تركيبها وتحللها Structure and Decomposition

يسمى الهيميسيليلوز بأسم كلايكان glycan ويوجد في الجدرية السميكة من خلايا السيقان والجنور والأوراق ويقسم على قسمين ، الكلايكان المتشابه

homoglycans أي الذي يتركب من سكريات أحادية متشابهة . مثال الـ **xylan** الذي يتركب من وحدات مرتبطة ببعضها من الزايلوز ، والـ **galactan** من الكالكتوز ، والـ **mannan** من المانوز وهكذا . أحياناً يسمى هذا القسم باسم **cellulomonas** . القسم الثاني يسمى الكلايكان المختلف **heteroglycans** أو **polyuronides** المتكونة من **sugars + uronic acid** . يتركب هذا النوع من الهميسيليلوزات من سكريات أحادية مختلفة مع حوامض مختلفة من الـ **uronic acid** فيحتوي الجزيء الواحد منها على ٢ - ٤ أنواع من السكريات وأحياناً خمسة أو ستة أنواع منها اسمائها عبارة عن مركب ينتهي باسم السكر الأكثر وجوداً فيه مثلاً ، **arabinogalactan** ، **arabinoxylan** ، **glucomannan** ، **arabinoglucuronoxylan** وهكذا . يشكل الزايلان أكثر مركبات الهميسيليلوز تغلباً في بقايا النباتات وقد تتراوح نسبته بين ٥ - ٣٠ % من الوزن الجاف للنبات . ولكنه لا يمكن أن يوجد بصورة نقية بل ترتبط به بعض السكريات الأحادية المذكورة في أعلاه .


يكون تحلل الهميسيليلوزات في التربة أسرع من تحلل السيليلوز ولكنه أبطأ من تحلل النشاء . ولنفس الأجناس من البكتريا (وبضمنها الأكتينومايسيتات) والفطريات التي تحلل السيليلوز القابلة على تحليل هذه المركبات الكربوهيدراتية . تكون عملية التحلل بوساطة مجموعة من الأنزيمات تسمى **hemicellulases** مجتمعة باسم مجموعة الهميسيليلوليز

٤ - الكيتين **Chitin**

أ - تركيبه **Structure**

يعتبر الكيتين أكثر أنواع السكريات المتعددة ذات الوحدات الأساسية المكونة من السكريات الأمينية وجوداً في الطبيعة إن طبيعة تركيب هذا المركب الكربوهيدراتي تعطي الكائنات المحتوية عليه قوة ميكانيكية كبيرة . يتركب الكيتين من سلسلة من وحدات الـ **N-acetylglucosamine** مرتبطة ببعضها بروابط كلايكوسيدية من نوع 1,4 - B كما في الشكل الآتي :

يوجد الكيتين في التربة عن طريق أغلفة الحشرات التي تموت داخل التربة أو ينتج في أثناء نمو الفطريات وربما بعض الأحياء الأخرى حيث يوجد مع



البروتينات بطريقة وثيقة ليكون مركباً معقداً يعمل على ثبات الكيتين ضد التحلل الأنزيمي

ب - تحلله Decomposition

التحلل الحيوي للكيتين يكون بطريقتين . الطريق الأول ، عندإضافته الى تربة ما بصورة نقية ففي أول الأمر تبدأ الأحياء المجهرية المتخصصة في إنتاج أنزيمات الكيتينيز Chitinase الخارجية المحفزة . الخطوة الأولى هي تكسير مجاميع الأسيتيل acetyl groups لتكوين مركب يسمى كاييتوسان Chitosan الذي يتكون من وحدات من الكلوكوز أمين المرتبطة بعضها ببعض بواسطة أوأصر من نوع - B 1,4 ومركب آخر هو حامضة الخليك n acetic acid . حامض الخليك يؤخذ داخل الخلية لكي يدخل دورة الـ T.C.A. ليتحلل الى CO₂ وقسم منه يستعمل فيه بناء مركبات الخلية المختلفة . أما الكاييتوسان فان يتكسر بفعل الأنزيمات الى أجزاء صغيرة فأصغر وفي النهاية تتكون مجموع من وحدات الكلوكوز أمين التي تؤخذ داخل الخلية لكي تستعمل مصدراً كاربون وطاقة ويتحلل قسم منها الى CO₂ .

الطريق الثاني، أن الأحياء المجهرية المتخصصة تفرز أنزيمات على الكيتين لتحلله بنفس طريقة تحليل السيللوز أي إلى *n chitinotrioses* ثم إلى *n chitinobioses* وفي النهاية إلى *N- acetylglucosamine* لكي تدخل داخل الخلية في دورة الكلايكوليز بعد انفصال حامض الخليك ثم دورة الـ **T.C.A.**

تحلل الكيتين بصورة عامة أسرع من تحليل السيللوز وقد تصل نسبة المتحلل منه حتى ٦٣ ٪ بعد ٨ أسابيع من الأضافة موازنة بتحلل السيللوز الذي قد تصل نسبة المتحلل منه حوالي ٦٠ ٪ بعد نفسه المدة . نسبة النتروجين في الكيتين عالية إذ إن تحلله في التربة يعطي نيتروجيناً كافياً لسد حاجة الأحياء المجهرية والزائد منه يطرَح للتربة في خلال فترة زمنية تقل عن شهرين يكون حوالي ٣٠ - ٦٠ ٪ من نيتروجين مادة الكيتين قد تحول الى الصورة المعدنية تحت الظروف الهوائية .

ج - ميكانيكية ارتباط الكيتين بحبيبات الطين أو المادة العضوية

بأمكان حبيبات التربة المعدنية أو المادة العضوية أن تحجز أو تقيّد قسماً من الكيتين المضاف الى التربة . ميكانيكية الربط تكون مشابهة للسيللوز مع وجود ميكانيكية جديدة وهي عملية الـ *Protonation* أي أضافة بروتون (*H*) الى مجاميع الـ NH_2 في الكيتوسان لتكوين مجاميع جديدة موجبة الشحنة NH_3^+ يمكنها أن ترتبط مباشرة مع الشحنات السالبة للطين والدبال .

د - الأحياء المجهرية المحللة للكيتين .

ان معظم الأحياء المجهرية المحللة للكيتين تقع ضمن مجموعة الأكتينومايسيتات وقليل جداً من البكتريا الأخرى . أما الفطريات المحللة للكيتين فتشمل أقل من ١ ٪ من المجموع الكلي للكائنات الدقيقة المحللة لهذه المادة . من أجناس الأكتينومايسيتات المحللة للكيتين *Streptomyces* ، *Actinoplanes* ، *Micromonospora* ، *Nocardia* والجنس *Streptosporangium* . أما أجناس الفطريات المحللة فهي *Mortierella* ، *Trichoderma* ، *Verticillium* ، *Paecilomyces* ، والجنس *Gliomastix* . بالإضافة الى ذلك هناك أجناس من البكتريا الأخرى بإمكانها تحليل الكيتين

منها . *Flavobacterium* , *Micrococcus* , *Bacillus* , *Pseudomona* ,
Chromobacterium ، والجنس *Clostridium* , *Cytophaga*

بالنظر لكون أغلب الكائنات الحية المحللة للكيتين تابعة لمجموعة الأكتينومايسيتات فقد أمكن الافادة من هذه الظاهرة في مكافحة بعض الأمراض التي تسببها بعض الأجناس الفطرية وذلك بإضافة الكيتين للتربة في البيت الزجاجي لتشجيع نمو الأكتينومايسيتات التي لمعظمها القابلية على إنتاج المضادات الحيوية التي بدورها يمكن أن تقضي على الكثير من الفطريات المرضية الموجودة في التربة خصوصاً أمراض الذبول التي تسببها بعض أنواع الـ *Fusarium* كما يمكن أن تقضي الأكتينومايسيتات على الفطريات المرضية وذلك بطريقة أخرى وهي انتزاع جزء من الكيتين المكون لجدار خلية الفطريات وتحليله وبالتالي موتها .

٥ - المواد البكتينية *Pectines*

تركيبها وتحللها *Structures and Decomposition*

تكون المواد البكتينية أقل من ١٪ من الوزن الجاف للنباتات ، وهي عبارة عن مركبات متبلعمة من حامض الـ *galacturonic* مرتبط ببعضه بقوى من أسترات الميثانول *esters of methanol* تشمل المواد البكتينية على ،

- ١ - *Protopectin* - التي تكون غير ذائبة في الماء
- ٢ - *Pectin* - جزئياً يكون أستر ذائب في الماء
- ٣ - *Pectic acid* - لا يكون أستر ذائب في الماء أيضاً .

إن الأحياء المسؤولة عن تحليل المواد البكتينية تكون عديدة وأن سرعة تحليلها نوعاً ما سريعة تستغرق أسابيع الى أشهر . الأنزيمات المسؤولة عن تحليلها يمكن أن تقسم على ثلاثة أقسام ،

- ١ - *Protopectinase* ، وهو الأنزيم الذي يحول المادة الأولى من المواد البكتينية *Protopectin* الى بكتين ذائب .

- ٢ - **Pectin methyl esterase** ، وهذا الأنزيم يهاجم حلقات الأنتصال methyl ester للبكتين ليعطي الميثانول methanol وحامض الـ Pectate
 ٣ - **Polygalacturonase** ، إن هذا الأنزيم يهاجم الحلقة المتصلة بين وحدات الـ galacturonic acids للبكتين والحوامض البكتينية الأخرى .

٦ - البروتينات Proteins

أ - تركيبها Structures

قبل البدء بدراسة تحليل البروتينات بواسطة أحياء مجهرية التربة يجب أن نفهم أولاً كيف يتركب البروتين . البروتينات عبارة عن مجموعة من الأحماض الأمينية المرتبطة ببعضها بأواصر ببتيدية . تقسم الأحماض الأمينية على ثلاثة مجاميع من البكتريا المنتجة للأنزيمات الثلاثة الأجناس *Pseudomonas* ، *Erwinia* ، *Bacillus* ، و *Clostridium* والجنس

عند رقم pH = ٧ هي ، الأحماض الأمينية المتعادلة وتشمل ، الكلايسين ، والألانين ، وفينيل ألانين ، والتايروسين ، والسيرين ، والليوسين ، والأيوليوسين ، والسيتستين ... الخ . والأحماض الأمينية الموجبة مثل اللايسين . القسم الثالث يشمل الأحماض الأمينية السالبة وهي حامض الأسبارتك **Aspartic acid** وحامض الكلوتامك **Glutamic acid** (على الطلبة مراجعة أي كتاب في الكيمياء الحيوية لدراسة تركيب كل من الأحماض الأمينية السابقة الذكر وفهمها) .

ب - تحليلها Decomposition

لنفرض أننا قمنا بإضافة بروتين يتكون من تكرار الأحماض الأمينية ، اسبارتك أسد - كلوتامك أسد - لايسين - ألانين كما في الشكل الآتي ، -

عندما تكون الظروف ملائمة من حرارة ورطوبة وعوامل أخرى تبدأ الأحياء المجهرية المتخصصة في تحليل البروتين بإنتاج الانزيمات الخارجية المحفزة التي تسمى مجتمعة بأنزيمات البروتيسز **Proteases** لتكسير الجزئية الكبيرة من البروتين إلى أجزاء تتدرج بالصغر . يقسم المختصين في موضوع أنزيمات التربة هذه المجموعة من الأنزيمات على قسمين : الأول يسمى **exopeptidases** أي

ليس كل البروتين المضاف يتحلل الى غاز CO_2 وقد وجد من خلال التجارب أنه بحدود ٦٠ ٪ من كاربون البروتين يتحلل خلال الأسبوع الأول من اضافته الى التربة وتصل النسبة الى حوالي ٧٠ ٪ في نهاية الأسبوع الرابع والى حوالي ٧٨ ٪ بعد مدة ثلاثة أشهر من التحضين . الكمية الباقية من البروتين تقيد من حبيبات الطين أو المادة العضوية خصوصاً عند أرقام pH أكثر من ٧ إذ يحمل البروتين أو مركباته الوسطية شحنات سالبة أو موجبة في هذه الظروف وهي بوجود عناصر معينة ثنائية الشحنة الموجبة تكون معقدات من : طين - بروتين أو مادة عضوية - بروتين أو طين - بروتين - مادة عضوية . أو في حالة احتوائها على شحنات موجبة يمكن أن تدمص مباشرة على سطوح حبيبات الطين أو المادة العضوية .

كذلك لحبيبات الطين أو المادة العضوية القابلة على تحويل أنزيمات البروتيسز من أنزيمات نشطة الى أنزيمات غير نشطة وبالتالي تؤخر عملية التحلل . نوع الطين الموجودة في التربة له تأثير في عمليات التقييد السابقة الذكر فالترربة الحاوية

على نسبة كبيرة من طين المونت مور ليونيت تحجز كمية كبيرة من البروتين موازنة بطين الألايت مثلاً . أضف الى ذلك إنه كلما زاد وجود الأحماض الأمينية الموجبة أو السالبة الشحنة الداخلة في تركيب جزيئة البروتين كلما كان حجم الكمية المحتجزة من الطين أو المادة العضوية اكبر .

٧ - اللكينيئات Lignins

أ - تركيبها structures

يعد اللكيني ثالث المكونات النباتية من حيث الكمية . فكميته داخل الأنسجة النباتية تلي كميات السيللوز والهيميسيللوز . تصل التربة سنوياً كميات كبيرة من اللكيني بصورة مخلفات نباتية تهاجمها وتحللها انواع كثيرة من الأحياء المجهرية الموجودة في التربة ولكن تحللها يكون أبطأ من تحلل جميع المركبات العضوية المذكورة آنفاً . تختلف نسبة وجود اللكيني في النبات حسب نوع النبات وعمره فالعشائش الصغيرة غير الناضجة والنباتات البقولية تحوي لكتينيات بنسبة ٣ - ٦ ٪ من وزنها الجاف في حين تحوي أشجار الغابات عن كميات كبرى تتراوح بين ١٥ - ٣٥ ٪ . لا يوجد اللكيني النباتي بصورة حرة بل يوجد مرتبطاً بالمواد الكاربوهيدراتية الأخرى .

ويتركب اللكتين كيميائياً من ارتباط مجموعة من الكحول التي لو تتبعنا اصلها لوجدنا أنها قد تكونت من ثاني أكسيد الكربون والماء . وأنواع الكحول هي ، كحول الكونيفيرايـل *confiferyl alcohol* و كحول الكوماريل *Coumaryl alcohol* وكحول السرنجيل *Syringyl alcohol*


ب - تحليلها *Decomposition*

لو أضفنا لكتيناً نقياً الى تربة ما وتركناه في ظروف ملائمة ودرسنا خطوات تحليله لوجدنا أن الخطوة الأولى هي نفسها كما في السيلولوز والبروتين وهي تكون مجموعة من الأنزيمات المتخصصة التي تسمى مجتمعة بأسم لبكتينز *lignases* وهي عبارة عن أنزيمات خارجية محفزة تنتجها أحياء مجهرية متخصصة في تحليل اللكتين . وبوساطة هذه الأنزيمات تتكسر جزيئة اللكتين الى مجموعة كبيرة من أنواع الكحول الثلاثة المذكورة آنفاً . وكل نوع من أنواع الكحول يمكن ان يبقى في التربة أو يؤخذ الى داخل الخلية المحللة لكي تستمر في تحليله وتحرير الكاربون والطاقة اللازم لنموها وتكاثرها .


يقسم المختصون في حقل أنزيمات التربة الأنزيمات التي تقوم بتحليل اللكتين أحياناً على ثلاثة أقسام هي ،

- ١- *Phenol oxidases* أو مؤكسـدات الفينول ، هذه المجموعة من الأنزيمات تؤكسد المركبات الأروماتيكية (العطرية) المحتوية على واحد أو اثنين من الفينولات الهيدروكسيلية ،
- ٢- *Laccases* ، هذا النوع من الأنزيمات يؤكسد المركبات الأروماتيكية المحتوية على أكثر من واحد من المجاميع الهيدروكسيلية فقط .
- ٣- *Peroxidases* ، هذا النوع من الأنزيمات يمكن أن يؤكسد الجزيئات الأروماتيكية أيضاً ولكن بوجود بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2)
الآن لو تتبعنا تحليل إحدى الكحولات المتكونة داخل الخلية ولنفرض أنه كان الـ *confiferyl alcohol* لوجدنا أن تحليله يتم وفق الخطوات الآتية ،


١- أكسدة مجموعة الكحول ($-CH_2OH$) لتكوين الـ ferulic acid .



٢- عملية إزالة سلسلة الكربون المتصلة بحلقة البنزين بطريقة الـ B-oxidation لتكوين حامض الخليك acetic acid مع مركب يسمى Vanillin




٢ - إزالة مجموعة الـ CH_3 demethylation من مركب الـ Vanillin لتكوين مركب يسمى 3,4-dihydroxybenzaldehyde



Vanillin

3,4-dihydroxybenzaldehyde

٤ - أكسدة مجموعة الألدهايد ($-\text{CHO}$) إلى COOH لتكوين مركب يسمى Protocatechuic acid




3,4-dihydroxybenzaldehyde protocatechuic acid

من الممكن أن تسبق عملية إزالة مجموعة الميثيل من مركب الـ Vanillin عملية أكسدة مجموعة الألدهايد فيتكون مركب يسمى Vanillic acid


الذي يتحول الى **Protocatechic acid** بعملية أكسدة مجموعة الـ $(-CHO)$.

٥ - انشقاق حلقة البنزين في المنطقة بين مجموعتي الـ OH بطريقة الـ **Ortho ring cleavage** بواسطة مجموعة من الانزيمات تسمى **dioxygenase** اي تعمل بوجود الاوكسجين فتتكون نتيجة ذلك حوامض عضوية جميعها تدخل في دورة الـ **T.C.A.** لكي تستعمل مصدراً للكربون والطاقة إذ تتحلل في آخر الامر الى غاز ثاني اوكسيد الكربون .




لو تتبعنا تحليل الكحول المسمى **coumaryl** الناتج من تحليل الكنين لوجدنا انه يتحلل على وفق الخطوات الآتية : -

١ - أكسدة مجموعة الكحول CH_2OH - الداخلة في تركيب الكحول لتكوين مركب يسمى **P-hydroxycinnamic acid**




٢ - إضافة مجموعة هيدروكسيل (-OH) الى حلقة البنزين لتكوين مركب يسمى **caffeic acid** وتسمى العملية **hydroxylation**.

٣ - إزالة سلسلة الكربون المتصلة بحلقة البنزين بطريقة الـ **B-Oxidation** لتكوين حامض الخليك **acetic acid** مع مركب **dihydroxybenzaldehyde** 3,4-



٤ - أكسدة مجموعة الألدهايد (-CHO) الى COOH لتكوين مركب يسمى **Protocatechuic acid** يتحلل بنفس الطريقة السابقة.



إن تحليل اللكتينين بوساطة احياء التربة المجهرية يكون ابطأ من تحليل جميع المركبات العضوية المذكورة آنفاً . فلو اضيف اللكتينين بصورة نقية الى تربة ما لاحتمل أن يتحلل بحدود ٤٠ ٪ منه الى CO_2 بعد مدة ثلاثة اشهر . اما الباقي فيبقى في التربة بصورة فينولات حرة او مرتبطة بحبيبات التربة والدبال او بصورة خلايا حية . الصورة تختلف في حالة اضافة بقايا نباتات تحوي على نسبة عالية من اللكتين المرتبط بالمركبات العضوية الاخرى فقد لوحظ في احدى التجارب ان حوالي $\frac{2}{3}$ من الوزن الجاف لبقايا سيقان الذرة قد تحللت خلال ٦ أشهر ولكن $\frac{1}{3}$ اللكتين المكون لها فقط قد تحلل خلال هذه المدة . في هذه التجربة كانت نسبة اللكتين في سيقان الذرة حوالي ١٥ ٪ . تحلل ثلث هذه النسبة فقط معناه بقاء ١٠ ٪ من اللكتين من دون تحليل . وهذه الكمية كانت في الثلث الباقي من سيقان الذرة اي اصبحت نسبة اللكتين في بقايا سيقان الذرة بعد ٦ أشهر بحدود ٣٠ ٪ . وخلال هذه الفترة من التحضين وجد انه قد حدثت تحويرات في تركيب اللكتين نفسه منها : إزالة مجاميع الميثيل ومجاميع السلسلة المستقيمة المتصلة بحلقة البنزين مع زيادة في مجاميع الهيدروكسيل والكاربوكسيل .

ح - العوامل التي تؤثر في عملية تحليل اللكتينين :

جميع العوامل المذكورة آنفاً وهي التي تؤثر في عملية تحليل اي مركب عضوي مضاف الى التربة فإنها تؤثر في تحليل اللكتينين . اضافة الى ذلك عوامل مهمة اخرى وهي نوع النبات وعمره . فمثلاً اللكتين الموجود في بقايا الشوفان وسيقان الذرة والبحت يكون تحلله اسرع من الانواع الموجودة في تبين الحنطة او اوراق الاشجار .

إن هذا الاختلاف يرجع بصورة رئيسة الى القوى التي تربط اللكتين بالمركبات العضوية الاخرى داخل النبات . وكذلك لكنين النباتات الصغيرة السن يتحلل اسرع من لكنين النباتات المتقدمة في العمر للسبب السابق ذكره .

د - الاحياء المجهرية التي تحلل اللكتينين :

اجناس الفطريات التي تحلل اللكتين يمكن ان تنم بصورة رئيسة ضمن الفطريات البازيدية *basidiomycetes* ومنها :

Agaricus , Armillaria, Clavaria, Clitocybe, Coprinus, Cortinellus, Ganoderma, Lenzites, Marasmius, Mycena, Panus. Pholiota. Stereum, Ustulina Schizophyllum, Polystictus, Collybia, Fomes, Polyporus, Poria, Pleurotus.

أما بالنسبة للفطريات الأخرى فنادر ما يمكنها أن تحلل اللكتين ولكن من الممكن لبعضها أن تستعمله مصدراً للكربون والطاقة مثل الأجناس *Aspergillus* ، *Fusarium* ، *Penicillium* .

كما يمكن لبعض أجناس البكتريا الهوائية أن تحلل اللكتين ولكن بدرجة محدودة منها بعض الأنواع التابعة للأجناس : *Flavobacterium Pseudomonas* ، *Xanthomonas , Arthrobacter , Micrococcus*

الفصل الخامس

دبال التربة Soil Humus

الدبال Humus

تعد مادة الدبال من مكونات التربة المهمة التي تتكون كمحصلة للتحلل الحيوي لبقايا النباتات والحيوانات والخلايا الميتة وبعض المواد العضوية التي تنتجها أحياء التربة المختلفة . بصورة عامة حوالي ١٥ - ٣٠ ٪ من كاربون المخلفات العضوية تبقى في التربة بعد سنة من الأضافة . قسم منها يكون موجوداً في خلايا الأحياء المجهرية المقاومة والقسم الآخر موجود في مادة الدبال . أما القسم الثالث فيكون موجوداً على شكل معقدات مع جزء الطين من التربة .

دبال التربة عبارة عن خليط من مركبات عضوية متعددة ولكن الجزء الأكبر (حوالي ٨٠ ٪) يكون بصورة حامض الدبال (humic acid) وحامض الفولنيك (fulvic acid) . وحامض الدبال عبارة عن مادة لونها أسود مائل الى البني تذوب في القاعدة (NaOH) وتترسب في الحامض (HCl) .

حامض الفولنيك يشمل المادة التي تذوب في القاعدة ولا تترسب في الحامض . والمادة الأخيرة تتكون من مركبات عضوية ذات أوزان جزيئية صغيرة نوعاً ما ومن سكريات متعددة ذات أوزان جزيئية كبيرة . أما الجزء من الدبال الذي لا يذوب في القاعدة فيسمى هيومين (humic). قد تصل نسبة السكريات المتعددة في مادة الدبال بين ١٠ - ٣٠ ٪

ميكانيكية تكون الدبال في التربة Humification

ان ميكانيكية تكون الدبال في التربة هي بالحقيقة عبارة عن محصلة لكل مما يأتي ،

١ - بينا سابقاً في تحليل المركبات العضوية المختلفة ذات الأصل النباتي وذكرنا انه في أثناء تحليل اللكنين سوف تتكون مجموعة كبيرة من الفينولات التي يؤخذ قسم منها داخل الخلايا المسؤولة عن عملية التحلل لكي يستعمل مصدراً للكاربون والطاقة . الزائد عن حاجة الخلية سوف يبقى أو يطرح الى التربة .

بعض الفينولات المتكونة في أثناء تحليل اللكنين التي يمكن أن تبقى في التربة موضحة في جدول ٩

جدول (٩) : بعض الفينولات المتكونة في أثناء تحليل اللكنين بواسطة فطريات التربة

1- P- Hydroxybenzaldehyde	7- Vanillin
2- P- Hydroxybenzoic acid	8- Vanillic acid
3- Coniferaldehyde	9- Gualacylglycerol
4- Ferulic acid	10- Protocatechuic acid
5- P- Hydroxycinnamylaldehyde	11- Syringic acid
6- P- Hydroxycinnamic acid	

٢ - قسم من الأجناس الفطرية وبصورة خاصة *Epiccoccum* , *Humicola* , *Aspergillus* , *Trichoderma* , *Alternaria* *Gliocladium* *Cladosporium* , *Helminthosporium* تكون مجموعة كبيرة من الفينولات (جدول ١٠) . وهذه الفينولات قد يرتبط بعضها ببعض لتكون مواد سوداء شبيهة بديال التربة تسمى ميلانين (melanin) . تتكون هذه المادة داخل الخلية الفطرية . الزائدة عن حاجتها من الفينولات أو من الميلانين نفسه سوف يطرح للتربة .

٣ - أشرنا سابقاً الى قسماً من السيللوز ، والنشاء ، والكتيتين ، والبروتين أو مركباتهما الوسطية الناتجة من التحلل الحيوي يمكن أن تبقى في التربة لأنها اما زائدة عن حاجة الخلية المسؤولة عن التحلل أو أنها تكون بعيدة عن تناولها .

٤ - معظم البكتيريا تكون سكريات متعددة حول نفسها تسمى الطبقة اللزجة أو الكابسول . الزائد عن حاجة الخلية من هذه السكريات المتعددة يمكن أن تطرح للتربة .

جدول (١٠) بعض الفينولات التي تكونها بعض أجناس فطريات التربة

حوامض	تولونيات (Toluenes)	غيرها
3,5- Dihydroxy -4- methyl- benzoic	Orcinol	Resorcinol
2,4,6- Trihydroxybenzoic	2,4- Dihydroxy	Pyrogallol
2,3,4- Trihydroxybenzoic	2,6- Dihydroxy	5- Methylpyrogallol
3,5- Dihydroxybenzoic	2,3,5- Trihydroxy	Phloroglucinol
2,4- Dihydroxybenzoic	2,4,6- Trihydroxy	
2,5- Dihydroxybenzoic	2,4,5- Trihydroxy	
2,6- Dihydroxybenzoic	P- Cresol	
P- Hydroxycinnamic	m- Cresol	
P- Hydroxybenzoic		
m- Hydroxybenzoic		
Protocatechuic		
Cresorsellinic		
Orsellinic		
6- Methylsalicylic		
Salicylic		
Caffeic		
Gallic		

ان المركبات العضوية المذكورة في النقاط الأربع أعلاه سوف لاتبقى معظمها في التربة بصورة حده وانما ترتبط مع بعضها بتفاعلات كيميائية فيزيائية (physico chemical reactions) التي هي بالحقيقة عبارة عن تفاعلات تكثيف بين المركبات العضوية العطرية الناتجة من تحليل اللكتين مع الكاربوهيدرات أو مركباتها الوسطية ومع الأحماض الأمينية الناتجة من تحليل البروتين ... الخ .

ان دور الأحياء المجهرية في هذه التفاعلات حسب نظرية kononova أقل بكثير من دورها في تحليل وتكوين المركبات العضوية نفسها ولكن يمكن القول أنه من دون الأحياء المجهرية لاتتم عملية الارتباط لأنها يجب أن تكون بفعل مجموعة من الأنزيمات التي تسمى phenolases أو Peroxidases التي تكونها وتفرزها هذه الأحياء . فوجود الأوكسجين وهذه الأنزيمات سوف تتحول الفينولات الحاوية على مجموعتين من الهيدروكسيل في حلقة البنزين الى quinones . والمركبات الأخيرة

شديدة التفاعل اذ تتفاعل فيما بينها لتكوين مركبات معقدة . وترتبط معها المركبات الفينولية الأقل تفاعلاً والمركبات العضوية الحاوية على مجموعات أمين **amino groups** كالبيتيدات والأحماض الأمينية والسكريات ثنائية الحرة أو الموجودة داخل تركيب السكريات المتعددة بعملية زيمياوية تسمى **Nucleophilic addition** لتكوين مركبات أكثر تعقيداً . وهذه المركبات المعقدة سوف ترتبط مع الميلانين ومع مادة الدبال الموجودة أصلاً في التربة لتبني دبالاً جديداً للدبال القديم وهكذا سوف يبنى بهذه الطريقة دبال التربة .

نظريات أخرى في تكوين دبال التربة

هناك نظريات أخرى في كيفية تكوين دبال التربة حسب آراء بعض الباحثين . بالنظر لأختلاف آرائهم عن رأي **Kononova** في بعض الأمور وجدنا من الضروري ذكر قسم منها باختصار .

أقدم هذه النظريات هي نظرية **Waksman** التي تنص على أن مادة الدبال تتكون بصورة رئيسة من التداخل أو التفاعل بين اللكتين من النبات والبروتين من الأحياء المجهرية لتكون نواة الدبال **Humus nucleus** التي بدورها يمكن أن ترتبط بالدهون والشموع والهيميسيليلوزات والمواد الأخرى المقاومة للتحلل حسب وجهة نظر **Waksman** لتكون مادة الدبال **Humic matter** ان الدبال المتكون حسب رأي الباحث هو حالة غير ثابتة تتأثر بالعوامل الفيزيائية والكيميائية والحيوية للتربة . هذه النظرية تنص على أن نوع اللكتين الذي يتركب منه النبات يؤثر تأثيراً مباشراً في طبيعة الدبال المتكون وأن مادة الهيومين **Humin** هي أول مرحلة من مراحل تكون الدبال . يتبعها التحلل الحيوي البطيء لمادة الهيومين الى حامض الدبال **humic acid** وحامض الفولفك **fulvic acid** .

أما نظرية **Swaby and Ladd** فإنها تركز على دور الأحياء المجهرية بصورة اكبر في تكوين الدبال حيث ذكروا أن جزيئة الدبال تتكون من فينولات ، وسكريات ، وأحماض أمينية ، ومركبات عضوية أخرى يرتبط بعضها ببعض بفعل الأنزيمات عن طريق تكوين الجذور الحرة **free radicals** .

وأخيراً نظرية التركيب الحيوي للدبال **The Microbial synthesis of Humus**

التي تنص على أنه في البداية سوف تستعمل الأحياء المجهرية بقايا النباتات كمصدر للكربون والطاقة حيث تحللها إلى أجزاء متدرجة في الصغر وهي بدورها تؤخذ إلى داخل الخلية المحللة التي سوف تستعمل قسماً منها والقسم الآخر سوف تربطه ببعضه ليكون مركبات هيومية humin ذات أوزان جزيئية عالية . وعند موت هذه الخلايا سوف يخرج الهيومين خارج الخلية ويتحلل القسم الأكبر منه إلى حامض الدبال humic acid وحامض الفولفك fulvic acid .

ونحن بدورنا نقول ان جميع هذه النظريات يمكن أن تتداخل مع بعضها في تكوين دبال التربة لأن جميعها واقعية ومقبولة .

الخواص العامة لدبال التربة

- ١ - للدبال سعة تبادلية كاتأيونية عالية (CEC) تتراوح بين ٢٠٠ - ٣٠٠ ملليمكافىء / ١٠٠ غرام . ان هذا يرجع إلى الزيادة في كمية المجاميع النشطة في التبادل الكاتأيوني مثل مجاميل الكربوكسيل (COOH-) والهيدروكسيل (OH-) وبهذا تزداد قابلية الدبال على التبادل الكاتأيوني وأدماص الكاتأيونات المهمة مثل الأمونيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وعناصر أخرى . لهذه الخاصية أهمية كبيرة إذ يعد سماً يتحلل ببطء ليعطي هذه العناصر الغذائية المهمة لتغذية النبات .
- ٢ - لمادة التربة الدبالية (العضوية) قابلية عالية لأمتصاص الماء والانتفاخ .
- ٣ - للدبال تأثير أصلاحي في تنظيم حموضة التربة Soil buffer capacity
- ٤ - تحسين تركيب التربة وبالتالي تحسين تهويتها وتغذية الماء والجذور .
- ٥ - مادة عضوية سوداء تمتص الحرارة وتساعد على الزراعة الربيعية المبكرة .
- ٦ - قسم من المواد التي يتربك منها الدبال لها تأثيرات مشجعة لنمو النبات (منظمات النمو) .
- ٧ - يساعد الدبال على نمو الكثير من المجاميع المجهرية وبالأخص الأكتينوميسيتات التي تفرز مضادات حيوية ، والفطريات التي يقضى قسم منها على الأحياء المسببة للأمراض وبذلك فهو يساعد في مكافحة الحيوية .

- ٨ - يساعد الدبال على التقليل أو إبطال سمية بعض المواد السامة المتكونة طبيعياً في التربة أو المضافة إليها بقصد مكافحة .
- ٩ - ليست المواد العضوية المكونة للدبال في حالة توازن بل تكون في حالة تغير ديناميكي مستمر إذ تتزايد نسبها باستمرار من ناحية وذلك برجع مواد عضوية خام جديدة الى التربة ، وتتناقص من ناحية أخرى بتأثير عمليات الأنحلال الحيوية .
- ١٠ - تتكون المادة العضوية الدبالية مع المعادن الطينية clay minerals مركبات معقدة كالمعقدات الغروية colloidal complexes .

تحلل الدبال Humus Decomposition

المفهوم الذي يذهب الى أن الدبال هو آخر مرحلة من التحلل هو مفهوم خطأ حيث أنه يتحلل ولكن تحلله بطيء جداً موازنة بتحلل المركبات العضوية النقية الداخلة في تركيبه . نسبة تحلل الدبال قد درست من كثير من الباحثين بقصد معرفة كمية النيتروجين الجاهز التي يمكن أن تضاف الى التربة سنوياً وأصلها من تحلل الدبال ووجد أنها قد تصل الى حد ٥ ٪ . فلو كانت لدينا تربة تحوي ٢ ٪ مادة عضوية فكمية النيتروجين التي يمكن أن تضاف لدونم من التربة بعد سنة تحسب كما يأتي :-

نفرض أن وزن دونم من التربة على عمق ١٥ سم هو ٥٠٠,٠٠٠ كغم وزن الدبال في دونم من التربة = $\frac{2}{100} \times 500,000 = 10,000$ كغم نسبة الكاربون الى النيتروجين في الدبال تتراوح بين 1:10 الى ١٠:١٥ وكمعادل ١٠:١٠ .

نسبة الكاربون في الدبال تتراوح بين ٥٥ ٪ - ٦٠ ٪ ومعادل ٥٧ ٪ فنسبة النيتروجين في الدبال كمعدل هي بحدود ٥,٧ ٪

كمية النيتروجين في الدبال = $\frac{0.7}{100} \times 10,000 = ٥٧٠$ كغم / دونم نسبة المتحلل منه كمعدل بحدود ٥ ٪ .

$\frac{5}{100} \times ٥٧٠ = ٢٨,٥$ كغم نيتروجين / دونم .

إن هذا يعني ان كمية النيتروجين الجاهز في تربة تحوي ٢ ٪ مادة عضوية دبالية سوف يزداد في السنة الأولى بحدود ٢٨,٥ كغم لكل دونم على فرض أنه لا

يوجد غسل للنيتروجين ولا يوجد تطاير ولا أمتصاص من النباتات النامية أو الأحياء المجهرية المحللة .

ويمكن القول بصورة عامة أن الدبال المتكون حديثاً يكون تحلله أسرع من الدبال القديم ، كذلك الدبال (الميلانين) الذي من أصل فطري يكون تحلله أسرع وقد تتراوح نسبة تحلله بين ٥ - ٣٠ ٪ خلال مدة ستة أشهر .

الفصل السادس

« التحولات الحيوية للنيتروجين »

Biological Transformations of Nitrogen

دورة النيتروجين : Nitrogen Cycle

يعد النيتروجين اكثر العناصر الغذائية عرضة للتحولات المايكروبية ويدخل مكوناً رئيساً في بناء جزيئات البروتين التي تعتمد عليها صور الحياة المختلفة اذ ان النيتروجين هو احد المكونات الاساسية لبروتوبلازم النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة . وبما ان النيتروجين يكون عرضة للفقدان عن طريق غسلة من التربة **Leaching** أو عن طريق التطاير **Volatilization** لنا يجب المحافظة عليه بالطرق التي تقلل من فقدانه وينبغي ابقاؤه بكميات مناسبة . وبالنظر لتلك الاهمية بالنسبة للنيتروجين خصوصاً في تغذية النبات فلقد اخذه المهتمون بدراسة احياء التربة بنظر الاعتبار .

إن اكثر النيتروجين في الطبيعة يوجد على هيئة غاز في جو الارض نسبته حوالي (٨٠ %) الا انه فاقد للنشاط الكيماوي ويعد غازاً خاملاً لا تفيد منه الاحياء واغلب اشكال الحياة . ان النباتات والحيوانات والاحياء الدقيقة تعتمد على النيتروجين من اجل التغذية . لذا لا تفيد تلك الكائنات منه ما لم يتم تحويله الى نيتروجين متحد **Combined nitrogen** أو نيتروجين مثبت ، كاتحاده مع الهيدروجين لتكوين الامونيا والامينات او مع الاوكسجين لتكوين النترات .

إن معظم النيتروجين في التربة يوجد على هيئة مركبات عضوية مثل البروتين الذي يحتوي على (١٦ %) نيتروجين . والاحماض النووية **Nucleic acids** والقواعد النيتروجينية البيورينات والبيريميدينات **purines & pyrimidines** والسكريات الامينية **Amino Sugars** مثل **Galactosamine** واليوريا وغيرها . **Glucosamine**

وتعتمد هذه المواد غير قابلة للامتصاص من النبات الا عند تحويلها الى مركبات نيتروجينية لا عضوية (معدنية) فيحولها النبات بدوره الى مركبات نيتروجينية عضوية كالاحماض الامينية والاحماض النووية التي تعد المركبات النيتروجينية الاساسية لمكونات الخلية .

إن المادة العضوية النيتروجينية النباتية تعد المصدر الوحيد لنيتروجين الحيوانات التي تتغذى على النباتات ، والحيوانات وبدورها تطرح المركبات النيتروجينية الى التربة بأشكال مختلفة فاللافقرات تطرح النيتروجين على هيئة امونيا والزواحف والطيور تطرحها على هيئة حامض اليوريك Uric acid واللبائن تطرحها على هيئة يوريا Urea . تختلف نسبة النيتروجين في المواد العضوية الموجودة في التربة فاعلم البقايا النباتية والحيوانية المضافة الى التربة تحتوي على نسبة معينة من البروتين وقد ترتفع هذه النسبة في بعض النباتات كالبقليات وفي بعض مخلفات الحيوانات .

بتأملك دورة النيتروجين (شكل ٧) تجد تحولات عديدة يتعرض لها النيتروجين وهي تحدث في وقت واحد وتكون مشتملة على مركبات عضوية ومركبات غير عضوية (معدنية) وحيثاً مركبات متطايرة وعلى ضوء ذلك يمكن ملاحظة الآتي ، -

- ان عنصر النيتروجين من خلال مروره في دورة النيتروجين يتحرك باتجاهات مختلفة بفعل الميكروبات اذ يتحول جزء بسيط من مخزون النيتروجين الغازي في الجو (N₂) الى مركبات عضوية بوساطة بعض الميكروبات التي تعيش بصورة حرة أو بوساطة بعض الميكروبات التي تتعايش مع بعض النباتات لامدادها بما تحتاجه من النيتروجين .

- يستخدم النيتروجين الموجود في البروتينات والاحماض الامينية المكونة لانسجة النباتات بوساطة الحيوانات اذ يتحول النيتروجين داخل اجسام هذه الحيوانات الى مركبات بسيطة ومركبات معقدة .

- عندما تتعرض اجسام الحيوانات والنباتات الميتة للتحلل بوساطة الميكروبات فانها تؤدي الى انطلاق الامونيا التي تستخدمها النباتات او تؤكسد الى نترات في الظروف المناسبة .

قد تفقد ايونات النتترات (NO_3^-) بواسطة عملية الغسل من التربة أو تستخدم في تغذية النباتات ، أو تختزل مرة أخرى الى اوكسيد النتروز (N_2O) أو نيتروجين غازي (N_2) أو أمونيا (NH_3) الذي يجد طريقة سواء على صورة اوكسيد النيتروز أو نيتروجين غازي أو أمونيا الى الغلاف الجوي مكملًا بذلك دورة عنصر النيتروجين في الطبيعة .

إن أهم عمليات تحول صور النيتروجين خلال الدورة هي معدنة النيتروجين **Nitrogen mineralization** حيث يتم خلال هذه العملية تحليل المخزون الكبير من المواد العضوية المعقدة في التربة وتحويلها الى ايونات غير عضوية (معدنية) كالأمونيا والنتترات التي تستخدم من النباتات ، كما ان معدنة النيتروجين هذه تتسبب في تحليل كل من البروتينات ومتعدد الببتيدات **polypeptides** والاحماض الامينية والاحماض النووية . (**RNA, DNA**) والمواد العضوية الأخرى . وعلى العكس من عملية معدنة النيتروجين فان هناك عملية تمثيل النيتروجين **Nitrogen Immobilization** اذ تعمل على تكوين مكونات بروتوبلازم الخلايا المعقدة من الأمونيا والنتترات . ان استمرار عمليتي معدنة المواد العضوية النيتروجينية وتمثيل النيتروجين اللاعضوي بواسطة الكائنات الحية الدقيقة تحدث في وقت واحد .

إن وجود صور النيتروجين على هيئة نترات يكون عرضة للفقدان من التربة بواسطة الفسل الى الماء الارضي بعيداً عن منطقة جذور النباتات ، وبما ان النباتات تستخدم النيتروجين في الغالب على هيئة امونيا أو نترات فان غسل النترات يعد خسارة في كمية النيتروجين المستهلكة من النباتات . كذلك فان النترات يمكن ان تفقد ايضاً من التربة نهائياً خلال حدوث عملية انطلاق النيتروجين الى الجو ، حيث ان الناتج النهائي لهذه العملية تتمثل في النيتروجين الغازي (N_2) الذي لا تتمكن معظم الكائنات الحية الراقية من استخدامه .

كما ان صور فقدان النيتروجين يعني استنزاف لمخزون التربة منه وهذا ينعكس سلباً على الانتاج الزراعي . وان فقدان النيتروجين يقابل بعمليات تحفظ التوازن في مركبات عنصر النيتروجين ، من هذه العمليات عملية تثبيت النيتروجين ، **Nitrogen Fixation** حيث ان غاز النيتروجين يكون كما ذكرنا سابقاً خاملاً ولا تتمكن النباتات والحيوانات ومعظم الكائنات الحية الدقيقة من استخدامه .

ولكن هناك بعض الميكروبات تكون نشطة في استخدام غاز النيتروجين كمصدر لعنصر النيتروجين في اثناء معيشتها بصورة حرة كما هي الحال في بكتريا *Azotobacter* أو في اثناء معايشة بعض الميكروبات لبعض النباتات كما هي الحال في بكتريا *Rhizobium* والنباتات البقلية . ومن خلال هذه العمليات يحدث تراكم مركبات عضوية نيتروجينية داخل الخلايا الميكروبية السابقة الذكر ، وبعد موت الميكروبات وتحلل خلاياها داخل التربة فان النيتروجين المثبت داخلها يدخل مرة ثانية في دورة النيتروجين وتتم معدنته ضمن عمليات معدنة المركبات العضوية في التربة .

تحلل الاحماض النووية :

إن الاحماض النووية تأتي بالدرجة الثانية بعد البروتينات من حيث اهميتها كمواد نيتروجينية تستخدم في تغذية الميكروبات . توجد الاحماض النووية في الانسجة النباتية والحيوانية وفي بروتوبلازم الخلايا . ان تحلل الاحماض النووية ومصيها تمد من الامور المهمة في خطوات معدنة النيتروجين في التربة . ان الانسجة في الكائنات الحية تحتوي غالباً على نوعين من الاحماض النووية هما ، -

RNA = Ribonucleic acid

DNA = Deoxyribonucleic acid

م / ٩ علم الاحياء التربة المجهرية

يتكون كل حامض من الحوامض المذكورة في اعلاه من نيوكليوتيدات عديدة
Neucleotides تتكون نتيجة لمرمرة وحدات النيوكليوتيدات الاحادية ،
Mononucleotides وهذه الوحدات التركيبية الاحادية تتكون من قاعدة بيورين
Purine أو بيريميدين **Pyrimidine** وسكر وفوسفات .

يدخل سكر الرايبوز **Ribose** في تركيب حامض الـ **RNA** في حين يدخل سكر الـ
Deoxyribose في تركيب حامض الـ **DNA** . أما قواعد الادنين **Adenine**
والكوانين **Guanine** فتوجد في جزيئات كل من الـ **RNA** و **DNA** وهذه تابعة
لقواعد البيورين **Purine** . اما بالنسبة لقواعد البيريميدين **Pyrimidine** فتوجد
السايتوزين **Cytosine** في حامض الـ **DNA** و **RNA** واليوراسيل **Uracil** في
حامض الـ **RNA** ، كذلك الثايمين **Thymine** يوجد في الحامض النووي **DNA** .
إن قواعد البيورين والبيريميدين مرتبطة بطريقة او باخرى في التربة كوجود
الاحماض النووية نفسها . ومن الملاحظ من خلال تجارب الباحثين ان الاحماض
النوية وقواعد البيورين والبيريميدين ومشتقاتها تتحلل بسهولة داخل التربة في
حالة اضافتها بصورة تقيية كما يمكن ان تحتجزها المعادن الطينية في التربة وفي
هذه الحالة فإن تحليلها من الميكروبات يكون صعباً .


إن التحلل الاولي للاحماض النووية يتم بتجزأتها الى اجزاء صغيرة وهذه تتحول
بدورها الى نيوكليوتيدات وحيدة ، **Mononucleotides** . ان العوامل المساعدة في
التحلل هي بعض الانزيمات فينشط انزيم **Ribonuclease** على الحامض النووي
RNA ، في حين ينشط انزيم **Deoxyribonuclease** على الحامض النووي **DNA**
أو يتم التحليل بواسطة انزيمات اخرى ، حيث يتم بواسطتها التحلل المائي لكلا
الحامضين النوويين التي يطلق عليها **Nucleases** .

إن انزيمات **Ribonuclease** الخارجية تتكون بواسطة بعض الاحياء
المجهرية ، فتفرز من بعض الانواع التابعة للجناس البكتيرية التالية ،
Bacillus ، **Mycobacterium** ، **Pseudomonas** . وبعض الانواع التابعة للجناس
الفطرية التالية ،

Mucor ، **Rhizopus** ، **Cephalosporium** ، **Aspergillus** ، **Fusarium** ، **Penicillium**

في حين تفرز انزيمات الـ **Deoxyribonuclease** من بعض الانواع البكتيرية التابعة للاجناس : **Bacillus** و **Arthrobacter** و **Pseudomonas** ، **Clostridium** والانواع الفطرية التابعة للاجناس : **Fusarium** ، **Cladosporium** . كما ان هناك اجناساً بكتيرية عديدة لها القابلية على افراز تلك الانزيمات .

عند تحليل الاحماض النووية فان الوحدات الناتجة من النيكلوتيدات الاحادية لا تتماثل او تتشابه مع بعضها من حيث التركيب الكيميائي حيث يحتوي كل منها على احدى قواعد البيورين والبيريميدين وعلى الرايبوز والديوكسي رايبوز **deoxyribose** بالاضافة الى الفوسفات ، في حين تتشابه النيكلوتيدات الاحادية مع بعضها في المصدر النهائي على الرغم من اختلاف القاعدة النيتروجينية المحتوية عليها حيث ان الميكروبات تحللها للحصول على الطاقة والكاربون والنيتروجين اللازم للنمو وعند تكون النيكلوتيدات الاحادية فان استمرار التحلل يؤدي الى التخلص من مجموعة الفوسفات حيث يتكون مركب من قاعدة البيورين أو البيريميدين المرتبطة بالسكر . أما الخطوة النهائية لتحلل الاحماض النووية فتتمثل في فصل قواعد البيورين او البيريميدين عن جزيء السكر كما يأتي : -



Nucleic acid Mononucleotide

↓


Sugar

+

purine or pyrimidine base

ونتيجة التمثيل الغذائي للسكر يتصاعد غاز ثاني اوكسيد الكربون ، كما يتوقف انتاج الاحماض العضوية **Organic acids** على مدى توفر الاوكسجين .



ان تحليل القواعد النيتروجينية موضح في الشكل (١١) إذ ان نواتج التمثيل الغذائي لهذه القواعد النيتروجينية في التربة من اهمها نواتج تحليل حامض اليوريك . ان تحليل القواعد في الشكل اعلاه تتم بواسطة بعض الانواع البكتيرية التابعة للاجناس : **Clostridium** و **Pseudomonas** و **Micrococcus** ، **Corynebacterium** . حيث ان الاجناس المذكورة لها القابلية على تحليل قواعد البيورين البيريميدين .



تحلل اليوريا :

ان اليوريا تمثل أيضاً إحدى نواتج تحلل القواعد النيتروجينية المكونة للأحماض النووية . حيث تصل اليوريا الى التربة اما عن طريق استخدام الاسمدة الكيماوية باعتبارها واحدة منها او قد تصل الى التربة عن طريق افرازات الحيوانات . كما ان اليوريا تتحلل بسهولة عند اضافتها للتربة حيث يتحول جزء كبير من نيتروجينها الى امونيا خلال ايام قليلة ، كما ان درجة الاس الهيدروجيني pH ترتفع في الاراضي المضافة اليها اليوريا وقد تصل (٨ - ٩) خصوصاً في المواقع الملامسة لجزيئات اليوريا . لهذا السبب وتحت هذه الظروف القلوية يكون الناتج النهائي لتحلل اليوريا عبارة عن غاز الامونيا (NH_3) وان احتمال فقدان هذا الغاز بكميات كبيرة بعد اضافة اليوريا كسماد وتطاييره في الجو بصورة غاز الامونيا .


وكما هو معروف فان اليوريا تستعمل بصورة مكثفة في الزراعة سماً كيميائياً يحتوي على (٤٦ %) نيتروجين ، أو قد تستعمل بصورة غير مباشرة كاستعمال بعض الاسمدة التي عند تحليلها تكون اليوريا مثل سياناميد الكالسيوم **Calcium Cyanamide** الذي يتحلل الى سياناميد وكالسيوم والسياناميد يتحلل الى يوريا ، ولكن هناك احتمال حدوث بعض المشاكل عند اضافة هذا السماد بكثرة وبصورة مستمرة وهو احتمال تحول جزء منه الى مركب معقد التحلل ويكون ذا سمية عالية خصوصاً الى بكتيريا النتريجة ، هذا المركب هو **Dicyandiamide (DCD)** حيث يستعمل في بعض التجارب كمثبط لعملية النتريجة واحتمال تحلله داخل التربة الى يوريا ثم الى امونيا وثاني اوكسيد الكربون ، -



بالنظر لان المرحلة الاولى لتحلل اليوريا تتمثل في فقدان عنصر النيتروجين المضاف على صورة سماد كيميائي قد يصل هذا الفقدان من (١٠ - ٧٠ %) من نيتروجين اليوريا المضافة وذلك عن طريق تطايره على هيئة غاز الامونيا ، لذا تركّز اهتمام العلماء على ايجاد الحلول للسيطرة او للحد من هذا الفقدان ومن هذه التجارب استعمال سماد اليوريا المغلف بالكبريت ، **Sulfur Coated urea** اذ بهذه الطريقة يمكن التقليل من كمية النيتروجين التي تفقد بالتطاير .

إن تحلل اليوريا يكون نشطاً مع ارتفاع درجات الحرارة على الرغم من ان العملية تحدث ايضاً عند الدرجات الواطئة جداً ، كما ان هناك عوامل عديدة تؤثر في تحلل اليوريا كالرطوبة ، وتوفر الاوكسجين ، ودرجة الاس الهيدروجيني pH وغيرها .

كما ان العديد من الميكروبات لها القدرة على افراز انزيم اليوريز **Urease** الذي يساعد على تحلل اليوريا مائياً . كما ان هذا الانزيم يكون موجوداً بصورة دائمية في بعض الانواع من الكائنات الحية . في حين يحفز الانزيم في بعض الانواع الاخرى بعد اضافة اليوريا وتكون معادلة التحلل المائي لليوريا كما يأتي :-



ومن اكثر الاجناس الميكروبية قدرة على تحلل اليوريا هي :-

Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Micrococcus, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium

اضافة الى مجموعة اخرى عديدة من الفطريات والاكيتنومايسيتات كما يندر وجود ميكروبات لاهوائية لها القدرة على تحليل اليوريا اذ ان معظم البكتريا النشطة في تحلل اليوريا لاهوائياً غالباً ما تكون من ميكروبات لاهوائية اختيارية **Facultative anaerobic** . وهناك مجموعة صغيرة من البكتريا الحقيقية تعرف ببكتريا تحلل اليوريا لا لانها اكثر الميكروبات المحللة لليوريا انتشاراً ولكن لمقاومتها التراكمات العالية من اليوريا وتفضل النمو بوجود اليوريا . وهذه البكتريا بعضها كروي والآخر عصوي متجثرم . وتتمكن كلتا المجموعتين من النمو في اوساط قلوية وانتاج كميات كبيرة من غاز الامونيا . ومن احسن الامثلة على البكتريا

المصوية القصيرة هي التي تتبع جنس *Bacillus* وأهمها الأنواع :

Bacillus Pasteurii


Bacillus freudenreichii

كما يمكن تقدير اعداد هذه البكتريا المتجرثمة المحللة لليوريا في التربة بموازنة الاعداد الناتجة من استخدام تخافيف من التربة المبسترة على درجة (٨٠ م) وغيرها من التخافيف غير المبسترة .


تقدر كفاءة انزيم اليوريز في التربة بتقدير كمية الامونيا المتكونة في عينات التربة المحضنة لفترات قصيرة في وجود اليوريا او من خلال حساب اليوريا المستهلكة .

إن اضافة مصادر الكربون كالكلوكوز مثلاً تؤدي الى تشجيع نمو الميكروبات غير الذاتية التغذية وبالتالي زيادة في نشاط انزيم اليوريز وارتفاع اعداد الميكروبات المحللة لليوريا كما موضح في الشكل (٨) .

وقد تقوم بعض الميكروبات بتحليل اليوريا على الرغم من عدم احتوائها على انزيم اليوريز ومن ميكانيكية هذه الميكروبات هو اتحاد اليوريا مع غاز ثاني اوكسيد الكربون وبمساعادات انزيمية مكونة حامض *Allophanic acid* كما في المعادلة الآتية : -



بعد العملية اعلاه يتم تكسير هذا الحامض بواسطة الميكروبات الى الامونيا NH_3 وغاز CO_2 .




شكل (٨) تأثير اضافة الكلوكوز في نشاط انزيم اليوريا *urease* واعداد الكائنات المحللة لليوريا في التربة . (عن الكسندر ١٩٧٧) .

تحلل الاحماض الامينية :


إن الاحماض الامينية الناتجة عن نشاط الانزيمات المحللة للبروتين **proteolytic enzymes** (تحلل البروتين) تستخدم مصادر للكربون والنيتروجين بواسطة اعداد كبيرة من الميكروبات غير ذاتية التغذية التي تتمكن هذه المجاميع من استخدام العديد من هذه المركبات . ان نيتروجين الاحماض الامينية ينطلق على هيئة امونيا التي تستخدمها الميكروبات كمصدر للنيتروجين وذلك قبل تحلل الجزء من الاحماض الامينية المحتوي على الكربون .

من اهم العمليات التي تجري على الاحماض الامينية هي عملية انتزاع الامونيا **Deamination** وعملية انتزاع مجموعة الكربوكسيل (تحرر CO_2) **Decarboxylation** وكما موضحة في المعادلات الآتية :-


١ - الانتزاع المباشر للامونيا : **Direct removal of ammonia**




ب - انتزاع الامونيا بالاكسدة : **Oxidative deamination**



ج - انتزاع الامونيا بالاختزال : **Reductive deamination**



د - انتزاع مجموعة الكربوكسيل (تحرر CO_2) : **Decarboxylation**



بعد انتزاع الامونيا من الاحماض الامينية يتعرض ما تبقى من السلسلة الكاربونية للتحلل لتكوين CO_2 ومركبات كاربونية اخرى . هذه التحولات تكون شائعة في تحلل الاحماض الامينية ولكن هناك بعض الاحماض لا تتحلل بهذه الطريقة فبعضها يكون صعب التحلل وقسم منها تتحول الى مركبات اخرى غير التي ذكرت سابقا .

عملية النشطرة : **Ammonification**

ان الكثير من المواد العضوية النيتروجينية تتعرض للتحلل بفعل الاحياء المجهرية وتختلف هذه المواد من حيث كمية النيتروجين فيها ، فبعضها تحتوي على كمية قليلة من النيتروجين لا تفي بحاجة الميكروب نفسه والبعض الآخر يحتوي على كمية كبيرة تزيد على حاجة الميكروب عندها يتحرر النيتروجين على هيئة امونيا .

ان تحلل اليوريا والبروتين والاحماض الامينية وتكوين الامونيا NH_3 يطلق عليها عملية النشطرة . وهناك العديد من الاحياء المجهرية تساهم بهذه العملية اهمها بعض الانواع التابعة للجناس الآتية من مختلف الاحياء المجهرية ،

Bacillus' clostridium, Pseudomonas, Proteus, Streptomyces, Nocardia, Actinomyces, Penicillium - إن عملية النشطرة تتأثر بعدة عوامل منها ، -

١ - طبيعة المادة العضوية المتعرضة للتحلل . فمنها ما يكون معقد التحليل كالمخلفات الحيوانية الصلبة كالشعر والحوافر والقرن ، ومنها ما يكون سهل التحلل كاليوريا مثلاً .

ب - نسبة الكربون الى النيتروجين (C/ N ratio) في المادة العضوية .

فالنباتات الغنية بالنيتروجين كالبقوليات مثلاً فإن عملية النشرة تكون أسرع ، اما المواد الفقيرة بعنصر النيتروجين اي تكون فيها نسبة الكربون الى النيتروجين عالية فإن الامونيا لا تنطلق من تلك المواد وذلك لان النيتروجين لا يفي بحاجة الميكروبات نفسها .

ج- توفر مصدر طاقة وكاربون سهلة التحلل في التربة ، فمثلاً سكر الكلوكوز يشبث من عملية النشرة لان الميكروبات تتجه الى تحليله بدلاً من المادة العضوية وذلك لسهولة تحلله .

د- الرطوبة والتهوية ، إذ ان الرطوبة مناسبة لعملية النشرة عندما تكون قابلية التربة على الاحتفاظ بالماء تقع بين (٥٠ - ٧٠ ٪) ، وان الظروف الهوائية تكون هي المفضلة لعملية النشرة لعلاقة ذلك بالاحياء المجهرية المسؤولة عن العملية .

هـ- درجة الاس الهيدروجيني (pH) - إذ إن وسط التربة المتعادل pH 7 هو المفضل لعملية النشرة وتقل العملية اذا كان الوسط حامضياً أو قاعدياً .

و- حرارة التربة . ان عملية النشرة تحدث في مدى واسع من الحرارة (من ٢ - ٣٠ °م) وأحياناً (٤٠ °م) . ان معظم الاحياء المساهمة في العملية تفضل الحرارة المتوسطة وهناك احياء مساهمة في العملية تفضل الحرارة العالية (٦٠ - ٧٠ °م) الا انها تكون قليلة نسبياً .

« معدنة وتمثيل النيتروجين »

دورة المعدنة والتمثيل

Mineralization and Immobilization

المعدنة **Mineralization** : المقصود بالمعدنة تحول العنصر من الصورة العضوية الى الصورة اللاعضوية . كتحويل الكربون العضوي الى CO_2 وتحول النيتروجين العضوي الى أمونيا والفسفور العضوي الى حامض الفوسفوريك H_3PO_4

التمثيل **Immobilization** : وهو عملية عكس المعدنة أي التحول من الصورة اللاعضوية الى الصورة العضوية . ويطلق على هذا المصطلح أحياناً تثبيت المغذيات .

الأحياء المجهرية واحتياجاتها من هذه العناصر وبالأخص النيتروجين هي العامل الرئيس المتحكم بهذه الدورة فهي كذلك بحاجة الى كاربون وفوسفور وكبريت - الخ لبناء أجسامها . فالبكتيريا مثلاً بحاجة الى وحدة واحدة من النيتروجين لكل خمس وحدات من الكاربون الممثل . معنى هذا تكون نسبة الكاربون الى النيتروجين (C: N ratio) في أجسام البكتيريا هي 5 : 1 . أما الفطريات فهي بحاجة الى وحدة واحدة نيتروجين لكل عشرة وحدات من الكاربون الممثل . معنى ذلك أن نسبة الكاربون الى النيتروجين في أجسامها هي 10 : 1 .

تأثير الـ C : N ratio على عملية المعالجة والتمثيل :-

إن المصدر الرئيس للكاربون والنيتروجين الذي تحتاجه الأحياء الدقيقة هي المخلفات العضوية التي تضاف أو تقلب بالتربة بقصد الحصول منها على غذاء جاهز للنبات بعد تحليلها . لكنها تكون غذاء للبكتيريا والفطريات والأحياء الأخرى في بادئ الامر فـ تأخذ حاجتها من هذه العناصر وتطرح ما يزيد على حاجتها الى التربة بصورة عناصر جاهزة للنبات . إن العامل الرئيس الذي يحدد فيما إذا كان مخلف - ي معين يحوي على نيتروجين كافٍ لحاجة الأحياء المجهرية أو أقل من حاجتها او أكثر هي نسبة الكاربون الى النيتروجين في ذلك المخلف العضوي .

ويقترح أحد الباحثين ما يأتي ، إذا كانت هذه النسبة أقل من 16:1 فمعناه أن كمية النيتروجين الموجودة في المخلف العضوي هي أكثر من حاجة الأحياء المجهرية .


معنى ذلك أن قسماً من نيتروجين المخلف العضوي سوف يضاف الى التربة بصورة أمونيا في المراحل الأولى من التحلل (mineralization) . أما إذا كانت النسبة أكبر من 16:1 في مخلف عضوي آخر معناه سوف تأخذ الأحياء المجهرية نيتروجين المخلف العضوي وبما أنه لا يكفي لسد حاجتها فسوف تموض النقص من النيتروجين من التربة أي تأخذ جزءاً من النيتروجين الجاهز في التربة . معنى ذلك Immobilization أي تمثيل لجزء من نيتروجين التربة في المراحل الأولى من التحلل .

إن إضافة مخلف عضوي من النوع الثاني (نسبة الـ C:N أكبر من 16:1) مع زراعة نبات معين في نفس وقت الأضافة سوف يؤدي حتماً الى ظهور أعراض نقص النيتروجين على هذا النبات خصوصاً إذا كانت التربة فقيرة في محتواها من النيتروجين . وفي هذه الحالة ينصح بإضافة المخلف العضوي قبل مدة لا تقل عن الشهرين من الزراعة .

باحثون آخرون يعتمدون على النسبة المئوية للنيتروجين ويعدها هي المؤشر لكل من المعدنة والتمثيل . فإذا كانت نسبة النيتروجين في المخلف العضوي أكثر من ١,٨ ٪ فالمحصلة هي معدنة أي إضافة نيتروجين في المراحل الأولى من التحلل ولا ضرر إذا زرع محصول معين في نفس وقت إضافة المخلف العضوي . أما إذا كانت هذه النسبة بين ١,٢ ٪ - ١,٨ ٪ فالمحصلة هي لا معدنة ولا تمثيل في المراحل الأولى من التحلل . معنى هذا أن كمية النيتروجين هذه كافية لسد حاجة الأحياء المجهرية في المراحل الأولى من دون إضافة نيتروجين معدني للتربة . أما إذا كانت النسبة أقل من ١,٢ ٪ فالمحصلة هي أن الأحياء المجهرية سوف تأخذ جزءاً من نيتروجين التربة لأنه هذه الكمية غير كافية لسد حاجتها (Immobilization) . لو حولنا النسب هذه الى C : N ratio سوف نجد أن الحد الحرج هو بحدود 25:1 .

في الشكل (٩) نرى حالة من الحالات التي تبين علاقة مستويات النيتروجين المتعدن والنشاط الميكروبي (تحرر CO_2) عند إضافة مادة عضوية ذات نسبة كربون الى نيتروجين عالية الى التربة أو بمعنى آخر إذا كان المحتوى النيتروجيني للمادة العضوية المضافة الى التربة واطئاً وتأثير ذلك على مستوى النيتروجين الممثل من الأحياء والنيتروجين المتعدن .

إن تعدن النيتروجين العضوي كما أشرنا يختلف بالنسبة الى كميات النيتروجين الموجودة في التربة وفي المواد العضوية المضافة الى التربة . فإذا أضيفت مواد بروتينية الى تربة معينة (مواد غنية بالنيتروجين) ومواد كاربوهيدراتية كالسكريات (فقيرة بالنيتروجين) فسوف نجد أن حالة النيتروجين المتعدن وحجم المجموعة الحيوية بعد مرور فترات معينة من الزمن تختلف في الترب المعاملة بالمصدرين العضويين . ولتوضيح ذلك نبين بمثال توضيحي في الشكل (١٠) تأثير ثلاثة أنواع من البيشات في الموازنة بين النيتروجين المعدني والنيتروجين العضوي علماً بأن النيتروجين المعدني يتكون في التربة والعضوي يتكون في خلايا الكائنات الحية .



شكل (٩)، التغير في مستوى النتراز في التربة خلال تحلل بقايا نباتية ذات محتوى نايتروجيني واطئ (عن تسدال ولسون ١٩٧٥).

الخط البياني (أ) يمثل الحالة في تربة متروكة دافئة ورطبة من دون إض مواد عضوية لها. عملية خسارة النتروجين عن طريق الغسل تكون فيها معدومة لذا نلاحظ أن النتروجين المتعدن يبدأ بالزيادة أما النتروج الممثل فيبقى ثابتاً لأن أعداد الخلايا المجهرية تبقى ثابتة أي تحافظ على أعدادها لعدم وجود مصدر كربوني أو نيتروجيني جديد. إن الزيادة الطفيفة في النتروجين المتعدن في

حقيقتها ناتجة عن موت قسم من الخلايا التي تتحلل في التربة من أحياء أخرى ومن تحليل دبال التربة .


الخط البياني الثاني (ب) يمثل الحالة عند إضافة مادة عضوية بشكل بروتين . نلاحظ بعد مرور فترة من الزمن أن نسبة النتروجين سوف تزداد . كذلك نلاحظ أن كمية النتروجين التي تمثل في خلايا الكائنات الحية تختلف أيضاً فهي بداية الأضافة نجد أن أعداد الخلايا الحية قد إزداد بصورة فجائية وبشكل كبير . أما بعد انتهاء عملية انحلال المادة البروتينية المضافة فإن نسبة النتروجين المتعدن ترجع بصورة اعتيادية يقابلها انخفاض في أعداد الأحياء المجهرية .

الخط البياني الثالث (ج) يمثل حالة أخرى وهي إضافة مادة كاربوهيدراتية الى التربة . وكما معروف فإن السكريات خالية من النتروجين فعند اضافتها سوف تتكاثر الأحياء المجهرية على حساب الكربون . المكون، للمواد الكاربوهيدراتية .

بما أن هذه الأحياء بحاجة الى نيتروجين الى جانب الكربون لبناء الخلية فسوف تقوم بامتصاص النتروجين الجاهز الموجود في التربة . وتستمر هذه الحالة حتى انتهاء تحليل السكر المضاف بعدها تبدأ نسبة النتروجين المتعدن بالزيادة وذلك لمرور الأحياء بعملية انحلال تصنيف من خلالها النتروجين الى التربة . إن هذه الزيادة تكون ضئيلة لأن مصدرها يكون من خلايا الكائنات الحية التي تضاف الى النتروجين الأصلي الموجود بالتربة .

لقد تم التركيز فيما سبق على نقطة مهمة وهي أنه في المراحل الأولى من التحلل يحدث إما معدنة أو تمثيل وحسب الـ C:N ratio لذلك المخلف العضوي وذلك لأنه في المراحل النهائية حتماً سوف يضاف نيتروجين معدني للتربة مهما كانت نسبة الكربون الى النتروجين واسعة . ذلك لأن الأحياء المجهرية المحللة في أثناء استعمالها للكربون سوف تمثل جزءاً منه في خلاياها والجزء الآخر سوف تستعمله مصدراً للطاقة اللازمة لاستمرار عملياتها الحيوية وهذا الجزء سوف يتحلل الى غاز ثاني أكسيد الكربون يطرح للجو . الفطريات مثلاً تمثل جزء كاربون وتطرح مقابله جزئين كـ CO_2 (أي تمثل بحدود ٣٥٪ من الكاربون المستعمل) أما البكتريا فأنها تمثل بحدود ١٠٪ فقط والباقي (٩٠٪ من الكاربون المستعمل) سوف يطرح كـ CO_2 . أضف الى ذلك فإن البكتريا، والفطريات التي نمت وتكاثرت بالعدد على حساب كاربون المخلف العضوي في المراحل الأولى سوف

شكل (١٠) ، تأثير اختلاف مكونات المواد العضوية المضافة الى التربة في النتروجين المتعدن وحجم النشاط الميكروبي (فعالية المايكروبات) .



تحتاج الى كاربون لاستمرار حياتها لذلك فكاربون المخلف العضوي سوف يقل بالتدريج لدرجة أنه سوف يصبح غير كاف لسد حاجتها مما يؤدي الى موت أعداد كبيرة من الأحياء بسبب قلة الكاربون . الأحياء الميتة بدورها سوف تتحلل بفعل أحياء أخرى فيتحلل النيتروجين (والعناصر الأخرى) منها ثانية ويرجع الى التربة بصورة نيتروجين معدني وهكذا إلى أن ترجع الأحياء المجهريّة الى عددها الأصلي وتكون المحصلة النهائية معدنة معظم نيتروجين المخلف العضوي .

بعض الأمثلة الرياضية التي توضح الدورة السابقة : -

مثال ١ :-

أضيف مسحوق البت نسبة ١٪ الى دونم تربة وترك ليتحلل تحت ظروف ملائمة مدة شهرين . فما تأثير ذلك في نيتروجين التربة ؟ إذا علمت أن نسبة الكاربون في مسحوق البت هي ٤٠٪ ونسبة النيتروجين فيه ٣٪ وأنه ٨٠٪ من مسحوق البت سوف تتحلل خلال هذه المدة . أفرض أن التحلل كان تاماً بوساطة فطريات التربة التي تمثل ٣٥٪ ونسبة الكاربون الى النيتروجين فيها ١٠ : ١ .

الحل :

لحل مثل هذا السؤال سر ١٠٠ ، مع انحسابات الى دونم من التربة الذي
وزنه بحدود ٥٠٠,٠٠٠ كغم على عضو

$$\frac{1}{100} \times 500,000 = 5000 \text{ كغم / دونم مسحوق الب.} .$$

$$\frac{40}{100} \times 5000 = 2000 \text{ كغم / دونم كاربون عضوي في مسحوق الب.}$$

$$\frac{3}{100} \times 5000 = 150 \text{ كغم / دونم نيتروجين عضوي في الجت}$$

$$\frac{80}{100} \times 2000 = 1600 \text{ كغم / دونم كاربون متحلل بعد شهرين}$$

$$\frac{80}{100} \times 150 = 120 \text{ كغم / دونم نيتروجين متحلل بعد شهرين}$$

$$\frac{35}{100} \times 1600 = 560 \text{ كغم / دونم كاربون عضوي في الفطريات}$$

$$\frac{560}{10} = 56 \text{ كغم / دونم نيتروجين عضوي في الفطريات}$$

١٢٠ - ٥٦ = ٦٤ كغم / دونم نيتروجين معدني يضاف للتربة في الدورة الأولى من
التحلل إذا العملية mineralization

والآن لنر ماذا يحدث في دورة ثانية ،
قسم كبير من الفطريات سوف تموت بسبب نقص الكاربون . والكاربون
والنيتروجين الداخل في تركيبها سوف تحلله فطريات أخرى لتفرض أنه بحدود ٨٠ %
من الفطريات سوف تموت بسبب نقص الكاربون .

$$\frac{80}{100} \times 560 = 448 \text{ كغم / دونم كاربون عضوي من خلايا ميتة}$$

$$\frac{80}{100} \times 56,8 = 44,8 \text{ كغم / دونم نيتروجين عضوي من خلايا ميتة}$$

لنفرض أن نسبة ما يتحلل من كاربون ونيتروجين الفطريات الميتة من قبل فطريات أخرى هو بحدود ٧٠ ٪ بعد مدة شهرين .

$$\frac{70}{100} \times 448 = 314 \text{ كغم / دونم كاربون متحلل بعد شهرين}$$

$$\frac{70}{100} \times 44,8 = 31 \text{ كغم / دونم نيتروجين متحلل بعد شهرين}$$

$$\frac{35}{100} \times 314 = 110 \text{ كغم / دونم كاربون عضوي ممثل من فطريات أخرى}$$

$$\frac{110}{100} = 11 \text{ كغم / دونم نيتروجين عضوي ممثل من فطريات أخرى}$$

$$31 - 11 = 20 \text{ كغم / دونم نيتروجين معدني يضاف للتربة في الدورة الثانية .}$$

الاستنتاج :

تستنتج من المثال السابق ان كمية النيتروجين المعدني المضافة للتربة في الدورتين هي ٨٤ كغم / دونم . إن لهذه الكمية الكبيرة أهمية من الناحية العملية اذ تزرع مساحات واسعة بنباتات الجت أو البرسيم وتقلب في التربة بهدف الاستفادة منها كسماد نيتروجيني إضافة الى تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية (عناصر غذائية أخرى) للتربة .

لقد فرضنا في المثال السابق أن مدة الدورة محدد بشهرين ولكن مدة الدورة – في الحقيقة – غير معروف بالضبط لأنه يتوقف على جميع عوامل التربة التي درست سابقاً .

مثال ٢ :

أضيف مسحوق تبن الحنطة بنسبة ١ % الى دونم من التربة وترك ليتحلل تحت ظروف ملائمة مدة شهرين .
فما تأثير ذلك في نيتروجين التربة ؟ إذا علمت أن نسبة الكاربون في مسحوق التبن ٤٠ % ونسبة النيتروجين فيه ٠,٥ % وأن ٦٠ % منه سوف يتحلل خلال هذه المدة . افرض أيضاً أن التحلل كله بواسطة الفطريات .

الحل :

$$\frac{1}{100} \times 500,000 = 5000 \text{ كغم / دونم مسحوق التبن .}$$

$$\frac{40}{100} \times 5000 = 2000 \text{ كغم / دونم كاربون عضوي في التبن}$$

$$\frac{0,5}{100} \times 2000 = 10 \text{ كغم / دونم نيتروجين عضوي في التبن}$$

$$\frac{60}{100} \times 2000 = 1200 \text{ كغم / دونم كاربون متحلل بعد شهرين}$$

$$\frac{60}{100} \times 10 = 6 \text{ كغم / دونم نيتروجين متحلل بعد شهرين}$$

$$\frac{20}{100} \times 1200 = 240 \text{ كغم / دونم كاربون عضوي في الفطريات}$$

$$42 = 240 \text{ كغم / دونم نيتروجين عضوي في الفطريات}$$

بما أن الفطريات بحاجة الى ٤٢ كغم نيتروجين والمأخوذ داخل جسمها ١٥ كغم فقط . والنقص هو ٢٧ كغم نيتروجين يؤخذ من التربة .

لهذه العملية إذا تسبب **immobilization** لنيتروجين التربة في الدورة الأولى في هذا المثال فرضنا أن مدة الدورة الأولى شهران ومعنى هذا أنه بعد هذه المدة

يكون في التربة ٤٢٠ كغم كاربون عضوي بشكل فطريات حية في دونم من التربة وهذه تحوي بداخلها على ٤٢ كغم نيتروجين عضوي بشكل فطريات حية . ان هذه الفطريات الحية بحاجة الى زيادة من الكاربون العضوي للأستمرار في الحياة .

الكاربون المتبقي في تبن الحنطة (٤٠ % منه) غير . جاهزة لأنها أرتبطت بعجيبات الطين أو بديل التربة . ماذا يحدث ؟ الذي سوف يحدث أن قسماً من الفطريات سوف تموت بسبب قلة الكاربون لنفرض أنه بحدود ٨٠ % من الفطريات الحية سوف تموت بسبب نقص الكاربون .

$$\frac{80}{100} \times 420 = 336 \text{ كغم / دونم كاربون عضوي في خلايا ميتة}$$

$$\frac{80}{100} \times 42 = 33,6 \text{ كغم / دونم نيتروجين عضوي في خلايا ميتة}$$

الان لنفرض أنه نسبة مايتحلل من كاربون ونيتروجين الفطريات الميتة من فطريات أخرى هو بحدود ٧٠ % بعد مدة شهرين .

$$\frac{70}{100} \times 336 = 235,2 \text{ كغم / دونم كاربون متحلل بعد شهرين}$$

$$\frac{70}{100} \times 33,6 = 23,52 \text{ كغم / دونم نيتروجين متحلل بعد شهرين}$$

$$\frac{35}{100} \times 82 = 28,7 \text{ كغم / دونم كاربون عضوي ممثل من قبل فطريات أخرى}$$

$$\frac{82}{100} \times 8,2 = 6,72 \text{ كغم / دونم نيتروجين عضوي ممثل من فطريات أخرى}$$

بما أن الفطريات بحاجة الى ٨,٢ كغم نيتروجين والمتحلل هو ٢٣,٥ كغم اذا هناك زيادة في النيتروجين قدرها ١٥,٣ كغم تطرح للتربة بصورة نيتروجين معدني بعد الدورة الثانية . حتى بعد هذه الدورة لم تستعد التربة جميع النيتروجين المعدني المأخوذ في الدورة الأولى . لأنه ما مأخوذ هو ٢٧ كغم وما مطروح للتربة هو فقط ١٥,٣ لذلك لم تستعد التربة العجز في النيتروجين المعدني الذي مقداره ١١,٧ كغم . وهكذا تستمر الدورات الى أن تأتي مرحلة تستعيد فيها التربة جميع النيتروجين المأخوذ منها اضافة الى جزء كبير من نيتروجين تبين الحنطة المضاف .

ما مدة كل دورة ؟ وما المدة اللازمة لكي يضيف تبين الحنطة نيتروجيناً معدنياً للتربة ؟ الجواب على هذه الأسئلة غير معروف ولكن يمكن معرفته بأجراء تجارب مختبرية وحقلية لمدد معينة من الزمن . ان اضافة تبين الحنطة الى التربة ليس للأستفادة منه كمصدر للنيتروجين فحسب ولكن يضاف بصورة رئيسية بهدف الاستفادة منه في تحسين الصفات الفيزيائية للتربة وهناك الاف الأطنان من بقايا الحنطة والشعير تترك بالتربة سنوياً لهذا الهدف .

بنفس الطريقة السابقة يمكن حل كل من المثالين في حالة كون التحلل كاملاً كان بوساطة البكتريا التي تمثل بحدود ١٠ ٪ ونسبة الكاربون الى النيتروجين فيها ١٠/٠

Nitrogen Mineralization : معدنة النيتروجين :

ان النباتات بصورة عامة تحتاج الى عنصر النيتروجين بكميات كبيرة . اذ ان النباتات تقوم بتمثيل مركبات النيتروجين اللاعضوية (المعدنية) مثل النترات والامونيوم .

كما ان المواد النيتروجينية العضوية الموجودة في التربة اضافة الى المخلفات النباتية تكون مواد غير قابلة للاستخدام من النباتات . ان الاتجاه نحو تحول هذه المواد العضوية المحتوية على النيتروجين الى مواد لاعضوية قابلة للحركة والامتصاص يعد هدفاً اساسياً وضرورياً لاعادة استخدام عنصر النيتروجين كغذاء مهم من اجل تحسين خصوبة التربة . وان عملية تحول النيتروجين من الصور العضوية الى صور لاعضوية (معدنية) قابلة للحركة والتمثيل تعرف بعملية معدنة النيتروجين .

كما ذكر سابقاً ان اغلب النيتروجين الموجود في التربة هو على هيئة مواد عضوية غير متيسرة للنبات ولا بد من تحليلها من اجل ان يصبح النيتروجين جاهزاً للنباتات .

فالنباتات تمتص المركبات النيتروجينية اللاعضوية بسرعة ولهذا السبب نلاحظ استجابة النباتات للاسمدة المعدنية تكون اسرع من مفعول الاسمدة العضوية التي تحتاج الى وقت من اجل تحليلها .

ان ميكروبات التربة تكون نشطة جداً في عملية تحويل النيتروجين العضوي الى نيتروجين لاعضوي (معدني) وهذا التحول هو الذي اطلقنا عليه سابقاً عملية معدنة النيتروجين ، وقد تتحرر الامونيا في اثناء عملية المعدنة عندما تكون كمية النيتروجين في المادة العضوية المتحللة كبيرة وتزيد عن حاجة الميكروب ، او قد تنطلق الامونيا عندما تكون كمية النيتروجين قليلة بحيث لا تكفي الا لسد حاجة الميكروبات .

ان النيتروجين اللاعضوي المتكون نتيجة المعدنة تستغله النباتات والاحياء المجهرية وقسم منه يفقد خلال عملية الغسل على هيئة نترات ، او يفقد بعملية اختزال النترات على هيئة N_2 ، N_2O أو NH_3 ولهذا فالنيتروجين اللاعضوي المتبقي في التربة هو عبارة عن كمية النيتروجين المتكون من عملية المعدنة مطروحاً منه النيتروجين الذي تستعمله النباتات والاحياء المجهرية والذي يفقد بالغسل وعملية اختزال النترات كما موضح في المعادلة التالية ، -

$$\Delta Ni = Nm - [Na + Np + N] + Nd$$

حيث ان ،

ΔNi = كمية النيتروجين اللاعضوي (المعدني)

Nm = النيتروجين العضوي التي تمت معدنته .

Na = النيتروجين الممثل بواسطة الميكروبات .

Np = النيتروجين الممثل بواسطة النباتات .

Ni = النيتروجين المفقود بواسطة الغسل .

Nd = النيتروجين المفقود بواسطة عملية اختزال النترات .

Nitrogen Immobilization

تمثيل النيتروجين اللاعضوي :

نتيجة لعملية تحليل المادة العضوية النيتروجينية السابقة الذكر تتكون مركبات نيتروجينية لاعضوية تمتصها النباتات ، كما ان ميكروبات التربة ايضا بحاجة لهذه المركبات النيتروجينية لبناء مكوناتها . وان عملية استغلال النيتروجين اللاعضوي في التربة وبناء مكونات الخلية النيتروجينية العضوية يطلق عليه تمثيل النيتروجين .

كما ان الاحياء المجهرية لا تحتاج الى النيتروجين فقط وانما تحتاج الى البوتاسيوم والفسفور والكبريت وغيرها من العناصر ولكن احتياج الاحياء لهذه العناصر لا يكون بتلك الدرجة الكبيرة لان حاجتها لهذه العناصر تكون بكميات قليلة ، كذلك فان الميكروبات توفر هذه العناصر لنفسها وللنباتات عن طريق تحليلها للمواد المختلفة .

هناك علاقة بين معدنة النيتروجين وتمثيله كما بينا سابقاً ، فالمعدنة تحول النيتروجين العضوي الى نيتروجين لا عضوي (معدني) ، اما عملية التمثيل فهي بناء النيتروجين العضوي من النيتروجين اللاعضوي . ان المواد العضوية الغنية بالنيتروجين التي تكون فيها نسبة النيتروجين اكثر من (١,٨ %) تكون عملية المعدنة فيها جيدة ، اما في المواد العضوية الفقيرة بالنيتروجين التي تكون فيها نسبة النيتروجين اقل من (١,٨ %) فتكون عملية المعدنة بطيئة وعملية التمثيل تكون جيدة وسريعة . مما تقدم فهناك مستوى حرج للنيتروجين **Critical nitrogen level** والذي تم شرحه سابقاً باسهاب يعبر عنه بنسبة الكربون الى النيتروجين **C / N ratio** والتي تساوي عادة ٢٠ / ١ - ٣٠ وعند الزيادة عن تلك النسبة تزداد عملية التمثيل واذا قلت عن تلك النسبة فان عملية المعدنة تنشط . والنيتروجين اللاعضوي قد يستغل على هيئة املاح الامونيوم او على هيئة نترات بعد تأكسد الامونيا الى نترات بعملية النترجة .

ان قلب المخلفات النباتية غير المتحللة في التربة تعتبر من العمليات الزراع التي تجري باستمرار بهدف المحافظة على المادة العضوية والعناصر الغذائية . ان تلك العملية تؤدي دائماً الى انخفاض محتوى التربة من المواد النيتروجينية غير العضوية لفترة قصيرة .

ان عدم تمثيل النيتروجين يؤثر في نمو الميكروبات وتحلل المواد العضوية وان عملية التمثيل تحدث عادة عند وجود النشاط الميكروبي . كما لا تحدث ايضاً معدنة كاملة للنيتروجين حتى في حالة اضافة البروتين النقي الى التربة لان جزءاً منه يستعمل في تمثيل خلايا الكائنات الدقيقة . وتعد املاح الامونيوم اسهل مصادر عنصر النيتروجين تمثيلاً بواسطة اغلب الانواع البكتيرية والاكثينومايسيتات والفطريات . وتعد الامونيا المرتبطة او غير القابلة للاستخلاص من التربة غير قابلة الاستخدام بواسطة الميكروبات . ان المركبات النيتروجينية او الاحماض الامينية تضاف الى المزارع المختبرية كمواد مشجعة للنمو . ولكن يمكن ان يستعمل نيتروجين تلك المواد بسهولة بعد حدوث عملية النشدة لها (تحرر الامونيا) .

تنمو العديد من الاكثينومايسيتات والبكتريا السالبة لصبغة كرام بسهولة في وجود املاح الامونيوم او النترات وعدم وجود الاحماض الامينية في الوسط ، كما ان هناك بعض الميكروبات لا تتمكن من استخدام النترات كما يفشل بعضها في تمثيل الامونيا واستخدامها مصدراً وحيداً للنيتروجين . ان الميكروبات الممثلة للنترات يمكنها كذلك استخدام الامونيوم حيث ان استخدام النترات يعد درجة اعلى في التطور الفسيولوجي . وفي حالة المزارع المختبرية التي تحتوي على الامونيوم والنترات نجد ان ايونات الامونيوم تختفي في البداية وقد تبقى النترات الى حين اختفاء الامونيا تماماً . وبطريقة مشابهة لذلك نجد ان الامونيا تفضل على النترات خلال تحليل المادة العضوية ، ولكن يمكن تمثيل النترات بكميات كبيرة بعد انخفاض تركيز الامونيا .

ان استخدام اصطلاح معامل النيتروجين هو للتعبير عن النقص الحاصل في المواد النيتروجينية غير العضوية (المعدنية) عند اضافة مواد عضوية ذات نسبة كاربون الى نيتروجين عالية . ويعرف معامل النيتروجين بأنه : عدد الوحدات من النيتروجين غير العضوي التي تمثل بواسطة مائة وحدة (١٠٠) من المادة العضوية المتحللة او من الناحية العملية ويعرف معامل النيتروجين بأنه كمية النيتروجين التي يجب اضافتها لمنع حدوث التمثيل الكامل للنيتروجين في الوسط المحيط .

ويقدر معامل النيتروجين باضافة مزيد من الامونيا الى المخلفات النباتية ثم تقدير كميات النيتروجين غير العضوي المتكونة على فترات خلال تحليل هذه المخلفات .

وتختلف قيمة معامل النيتروجين من (٠,١) أو اقل الى (١,٣) . وفي حالة المحاصيل الكاملة النمو نجد ان معامل النيتروجين عادة ما يتراوح بين (٠,٥) الى (١,٣) وذلك عند اضافة النيتروجين في بداية التحلل , ولكن قد يساعد ترك المادة الكربونية للتغفن بعض الوقت قبل اضافة الاسمدة الكيماوية على انخفاض معامل النيتروجين وذلك نتيجة لانخفاض نسبة الكربون الى النيتروجين للمادة العضوية الناتجة : ويعد معامل النيتروجين قيمة تمثل التوازن الناشئ بين كل من عمليتي المعدنة والتمثيل حيث تحدث كلا العمليتين عند تحلل اية مادة عضوية بفض النظر عن نسبة النيتروجين في تلك المادة . ويعد تقدير عمليتي المعدنة والتمثيل كليهما في وقت واحد ذا اهمية بالغة حيث تدل النتائج الحاصلة من خلال التجارب لبعض العلماء على مصير التحولات التي تطرأ على عنصر النيتروجين في وقت معين . من امثلة ذلك هو التحولات التي تطرأ بعد اضافة مواد عضوية ذات نسبة كاربون الى نيتروجين عالية كأن تكون (١ : ٧٠) حيث تفوق او تغلب عملية التمثيل على عملية المعدنة - كما اشرنا سابقاً - وتكون المحصلة النهائية اختفاء صور النيتروجين المعدنة , في حين ان المواد العضوية ذات نسبة الكاربون الى النيتروجين الواطئة كأن تكون (١ : ١٥) يؤدي اضافتها الى حدوث المعدنة بمعدلات اعلى من عملية التمثيل وهذا يؤدي بالتالي الى زيادة المحتوى الكلي من النيتروجين اللاعضوي (المعدني) .

تعد عملية تمثيل المواد النتروجينية غير العضوية مهمة من الناحية الزراعية من عدة جوانب . وكما هو معروف تعد النباتات منافسات غير قوية للميكروبات في الحصول على النيتروجين غير العضوي عند وجوده بكميات غير كافية للنمو ولكل من الكائنات الحية الدقيقة والراقية . وتعد عملية التمثيل التي تصاحب اضافة المخلفات النباتية الفقيرة في النيتروجين (ذات نسبة كاربون الى نيتروجين عالية) غير مرغوب فيها خلال موسم نمو النباتات , في حين نجد هذه العملية ذاتها قد تكون مفيدة خاصة في الخريف في اراضي المناطق المعتدلة وذلك نظراً لارتباط الامونيا والنترات بمكونات التربة وعدم فقدھا بوساطة الغسل في فصل الشتاء التالي , وعند فصل الربيع الذي يلي ذلك تتم معدنة جزء على الاقل من النيتروجين المتحد في بروتوبلازم الخلايا الى امونيا ونترات التي يمكن استخدامها بوساطة النباتات .

ونتيجة لما تقدم فإن لفصول السنة وتعاقبها ذات فائدة في تحديد مدى الفائدة او الضرر الناتج عن عملية المعدنة على الانتاج الزراعي .

عملية النتجة : Nitrification


إن المحصلة النهائية لمعدنة النيتروجين العضوي في التربة تنتهي بتكوين الامونيوم التي تعد أكثر صور عنصر النيتروجين المعدنية اختزالاً . من هذه النقطة أي تكوين ايونات الامونيوم تبدأ عملية النتجة في الظروف الطبيعية إذ تؤدي هذه العملية الى تكون النترات NO_3^- أو النتريت NO_2^- إن أهمية الميكروبات الخاصة بعملية النتجة تنحصر في المقدرة على تكوين ايونات النترات التي تعد من اهم صور النيتروجين تمثيلاً من النباتات .

ولقد عرف انتاج املاح النترات خلال حكم نابليون وذلك لاستخدام املاح النترات في صناعة البارود Gun powder في فرنسا لاستعمالها في حروب نابليون ، حيث تم ذلك بخلط التربة والسماد العضوي و كاربونات الكالسيوم CaCO_3 ولقد فسرت هذه الطريقة لتكون النترات نتيجة حدوث بعض التفاعلات الكيميائية بين الاوكسجين والامونيا بوجود عامل مساعد هو التربة ، الا ان العالم باستور اعتبر ان تكون النترات بهذه الطريقة ما هو الا عملية حيوية كتحويل الكحول الى الخل وتبعه علماء اثبتوا ذلك عملياً كالعالمين Schloesing و Muntz وقام العالم وينوكرادسكي Winogradsky بعد ذلك بعزل الميكروبات المسؤولة عن التحولات الحيوية المؤدية الى تكوين النترات .


خطوات عملية النتجة :

- ١ - اكسدة الامونيوم الى النتريت .
- ٢ - اكسدة النتريت الى النترات .

ان الخطوة الاولى من عملية الاكسدة تكون مهمة لعدم امكان تحول الامونيا تحت الظروف غير الاعتيادية مباشرة الى نتريت . ومن خلال بحوث بعض العلماء فانها تتحول الى $\text{NH}^+ \text{Hydroxylamine}$ وهنا بدوره يتحول الى OH (Nitroxyl) . وهذا الاخير يعد مركباً وسطياً غير ثابت فتمت الظروف الطبيعية (الهوائية) فإنه يتحول الى نتريت ، اما اذا كانت الظروف غير طبيعية (ظروف لاهوائية) فإنه يتحول الى اوكسيد النتروز (N_2O) كما في المعادلات الآتية : -



وتعرف العملية في اعلاه بالـ **Nitrosification** ، ويمكن كتابة المعادلة بالنسبة للخطوة الاولى وهي اكسدة ايونات الامونيوم الى ايونات النتريت تحت الظروف الطبيعية كما يأتي ،



أما الخطوة الثانية من خطوات عملية النتجة فهي التي تتمثل باكسدة ايونات النتريت الى ايونات النترات كما في المعادلة الآتية .


$$\text{NO}_2^- + 1 \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_3^- + 17.5 \text{ kcal}$$

Nitrifying bacteria : البكتيريا التي تقوم بعملية النتجة :

ان البكتيريا التي تقوم بعملية النتجة تنبع عائلة **Nitrobacteriaceae** ، حيث تحتوي على بكتيريا مختلفة الاشكال فمنها العصوية والكروية بعضها متحرك والبعض الآخر غير متحرك . كما ان بكتيريا النتجة هي من النوع الهوائي الاجباري ، **strict aerobes** ، وذاتية التغذية الكيميائية ، **Chemoautotrophic bacteria** ، أي انها تستمد طاقتها من اكسدة المواد اللاعضوية (المعدنية) وتستمد كاربونها من ثاني اوكسيد الكربون . كما وجد في بعض السلالات المسؤولة عن عملية النتجة أن مصدر الكربون يمكن ان يكون هو المادة العضوية .

تنتمي الى العائلة المذكورة في اعلاه سبعة أجناس تقوم اربعة اجناس منها بعملية اكسدة الامونيوم الى النتريت (الخطوة الاولى) والثلاثة اجناس الاخرى تكون مسؤولة عن عملية اكسدة النتريت الى النترات (الخطوة الثانية) أهم الاجناس التابعة للمجموعة الاولى هي **Nitrosomonas** إذ يعد اهم الاجناس والاكثر انتشاراً في التربة شكل (١٢) وهي عبارة عن عصيات قصيرة سالبة لصبغة كرام بعضها

متحرك وبعضها غير متحرك . اما الاجناس الثلاثة الاخرى المسؤولة عن الخطوة الاولى فهي ، *Nitrosolobus Nitrosococcus, Nitrospora*



شكل (١٢) صورة مأخوذة بالميكروسكوب الالكتروني لبكتريا ، *Nitrosomonas europaea* .

أما اهم الاجناس التي تقوم بالخطوة الثانية من عملية النترجة فهو الجنس ، *Nitrobacter* وهي عصيات قصيرة تتكاثر بالتبرعم وسالبة لصبغة كرام وغير متحركة . وهناك جنسا ، *Nitrospira* ، *Nitrococcus* يقومان باكسدة النترت الى النترات ايضاً .

وهناك بكتريا غير ذاتية التغذية تقوم بعملية النترجة ايضا ، حيث اكتشفت اخيرا هذه الانواع اضافة الى بعض الاكتينومايسيتات والفطريات في حالة وجود كميات من ايونات الامونيوم تزيد على حاجة هذه الاحياء وتقوم بنفس العملية .

ان الشيء الذي تختلف فيه تلك الاحياء عن الاحياء الذاتية التغذية هو تمكنها من تكون النترت ايضا من مركبات عضوية نيتروجينية مثل مركبات النيتروفينول ، *Nitrophenols*

العوامل التي تؤثر في عملية النترجة :

١ - وجود المركبات النيتروجينية في التربة :

ان توفر المركبات النيتروجينية اللاعضوية (المعدنية) الى حد معين يحفز عملية النترجة اذ ان توفر املاح الامونيوم مثلا في التربة تنشط بكتريا ال *Nitrosomonas* لأكسدة ايونات الامونيوم الى النترت . ولكن اذا كانت تلك الاملاح موجودة بكميات كبيرة فقد تؤثر في بكتريا ال *Nitrobacter* المسؤولة عن اكسدة النترت الى النترات .

٢ - درجة الحرارة :

ان درجة الحرارة المتوسطة هي المفضلة لعملية النترجة . الا ان النترجة يمكن ان تتم في مدى واسع من درجات الحرارة بين 5°C - 40°C م حيث ان العملية تكون بطيئة في ظروف حرارة اقل من 5°C م واكثر من 40°C م .

٣ - رقم الاس الهيدروجيني pH :

من المعروف ان بكتريا النترجة تكون حساسة جدا لدرجة الحموضة حيث يحدث تثبيط للعملية في pH أقل من (٥) وان رقم ال pH المفضل لعملية النترجة هو المتعادل او المائل قليلاً الى القلوية ويمكن تحديد المدى المفضل لدرجة الاس الهيدروجيني بين ٦,٥ - ٨,٥ .

٤ - الرطوبة والتهوية :

ان الرطوبة المناسبة لعملية النترجة في التربة هي بين ٦٠ - ٦٥ ٪ من القابلية التشبعية للتربة ، وان زيادة الرطوبة يؤدي الى نقص الاوكسجين في التربة والذي يعد من الامور الاساسية لاتمام عملية الاكسدة ، كذلك فان قلة الرطوبة عن الحد المذكور في اعلاه يقلل من عملية النترجة وذلك لتأثيره في نشاط بكتريا النترجة .

٥ - العمليات الزراعية المختلفة :

يمكن تلخيص العمليات الزراعية بنوع المحاصيل المزروعة فمنها ما ينشط العملية ومنها ما يزيد من العملية حسب نوع الافرازات التي تفرزها تلك المحاصيل

وكذلك معاملة التربة بالاسمدة النيتروجينية بالحدود الموصى بها تكون منشطة لبكتريا النتجة . تحضير الارض قبل الزراعة مهمة ايضاً اذ ان توفير ظروف هوائية وتحسين تركيب التربة عن طريق الحرث وغيرها . كما ان استخدام المبيدات بتركيز عالية وبصورة مستمرة له مساوئ وتاثير في عملية النتجة وتأثيرها يكون كتاثير مخلفات المعامل الصناعية وما تطرحه من ملوثات للتربة والماء . واخيراً ، إن استعمال اللقاحات البكتيرية الخاصة بالاحياء التي تقوم بعملية النتجة يزيد من خصوبة التربة نتيجة زيادة عملية النتجة الى الحدود التي لا تسبب ضرراً لتراكم النترات بكميات كبيرة في الماء الارضى الذي تصل اليه من التربة عن طريق الغسل بالماء .

ومن الحقائق الثابتة عن عملية النتجة ما يأتي : -

١ - لا تتكون النترات في التربة الا عندما تكون هناك ايونات النتريت اي ان تكون النترات يتوقف على وجود النتريت .

٢ - ان عملية النتجة لا تتم الا تحت الظروف الهوائية .

٣ - ان تأكسد الامونيا في التربة يجري على سطحيات الحبيبات للتربة وان هذا التأكسد يشمل ايونات الامونيوم القابلة للتبادل Exchangeable ammonium فقط .

زيادة ايونات الامونيوم المتبادلة في التربة تؤدي الى زيادة محتملة في نترات التربة تحت الظروف الطبيعية .

٤ - تكون عمليات الاكسدة سريعة عندما تحتوي التربة على كميات مناسبة من الكالسيوم والفوسفور وكذلك على كميات متوازنة من العناصر الأثرية Trace elements كالحديد والزرنيخ والنحاس وغيرها ، وقد ثبت أن قابلية اكسدة بكتريا الـ *Nitrobacter* لا يونات النتريت تزداد عندما تكون هناك كميات معينة من عنصر المولبدوم (Mo) في التربة .

٥ - ان الميكروبات التي تقوم بهذه العملية الحيوية هي بكتريا بالدرجة الاولى الا انه توجد هناك بعض الانواع من الفطريات ما يقوم بهذه العملية ايضاً مثال بعض الانواع التابعة للجنس *Aspergillus* .

٦ - لا تتراكم ايونات النتريت في التربة في الظروف الطبيعية المناسبة حيث تتأكسد مباشرة الى ايونات النترات .

٧ - ان تكون النترات يكون بطيئاً جداً في درجات الحرارة الواطئة وتزداد بزيادة

درجات الحرارة ، وإن انسب درجة حرارة لعملية التترجة هي المعتدلة

Mesophiles

أما تكون الامونيا فيحدث في درجات حرارة عالية قد تصل الى ٧٠° م أو أكثر .

النترات والتلوث البيئي :

على الرغم من اهمية النترات باعتبارها ايونات ضرورية للتغذية الا انها تعد ايضاً من اهم المواد الملوثة للبيئة وتكون غير مرغوبة نتيجة للدور الفعال الذي تقوم به في هذا المجال . ونتيجة للاستخدام الكثيف للمخصبات الكيماوية النيتروجينية في التربة يفوق الحاجة اليها فان تراكم النترات يزداد في التربة مع زيادة تلوث المياه والانتاج الزراعي . ان استعمال الاسمدة الكيماوية النيتروجينية ولاسيما املاح الامونيوم واليوريا بكميات كبيرة في التربة يؤدي بالتالي الى زيادة في كمية النترات الناتجة عن عملية التترجة ويفقد جزءاً منها عن طريق الاختزال وانطلاق النيتروجين ، **Denitrification** وجزء منه يترشح من خلال التربة ليصل الى المياه الجوفية ويلوثها . وتصل النترات ايضاً الى المياه السطحية كالانهار والبحيرات اذ تصبح المياه ملوثة بالنترات وإن هذه الحالة تؤدي الى ، -


١ - ظاهرة الازدهار الغذائي **Eutrophication** وتعني انتعاش نمو الطحالب والنباتات في المسطحات المائية نتيجة لزيادة المحتوى الغذائي للمياه وإن وصول (٠.٣) جزء بالمليون من النترات الى تلك المسطحات كافية لاجداث هذه الظاهرة . ان هذه الظاهرة تؤثر في تغيير طعم المياه ورائحته وبذلك تصبح معاملة تلك المياه مكلفة جداً بعد تنقيتها من الطحالب . قد يحدث نقص في كمية الاوكسجين عندما تزداد الاعداد البكتيرية في تلك المياه مما يؤثر في حياة الاحياء المائية كالاسماك وغيرها نتيجة لاستهلاك الاوكسجين في اكسدة الزيادة في المواد العضوية المتراكمة في تلك المياه . كما ان نمو هذه النباتات في البحيرات والمسطحات المائية قد يعيق الملاحة النهرية (اعاقه حركة الزوارق) .

٢ - ان تلوث مياه الشرب بايونات النترات يؤدي الى مرض **Methemoglobinemia** الذي يصيب الاطفال بصورة خاصة ويعرف بمرض زرقة العيون ، حيث ان وجود النترات أكثر من (١٠) أجزاء بالمليون في مياه

الشرب او الخضراوات قد يؤدي الى حدوث هذا المرض بسبب اختزال النترات في القناة الهضمية الى النتريت . وبوصول النتريت الى الدم يتفاعل مع الهيموغلوبين مكوناً مركب **Methemoglobin** وهذا المركب يؤدي بدوره الى اعاقه عملية نقل الدم في الجسم . ولا تعد هذه العملية ذات تأثير يذكر عند الرضع الذين هو دون الثلاثة اشهر من اعمارهم لتعاملهم المباشر والكلي بالماء .

وبالنظر لحدوث هذا النوع من المرض نتيجة لاستهلاك المياه الملوثة بالنترات فقد اوصت منظمة الصحة العالمية WHO والعديد من البلدان بعدم احتواء مياه الشرب على تراكيز من النترات تتعدى (١٠) أجزاء بالمليون ، وهو التركيز الذي ثبت ان الحالات المرضية السابق ذكرها للاطفال تكون نادرة الحدوث عندما يكون تركيز النترات في مياه الشرب أقل من (١٠) أجزاء بالمليون . كما ان هناك نباتات تستهلك النترات الموجودة في التربة وتخزنها بكميات كبيرة داخل خلاياها كما في الخضراوات مثل البنجر ، والسبانخ ، والكرفس ، والخس وبعض المحاصيل العلفية مثل الذرة والشوفان . ان المرض المذكور آنفاً يصيب الاطفال بصفة خاصة ويحتمل ان يصيب الحيوانات للسبب نفسه ويعرف في هذه الحالة بـ **Animal Methemoglobinemia** .

٣ - هناك خطورة اخرى ، لتراكم كميات كبيرة من النتريت في التربة نتيجة لتكوين مركبات النتروز أمين **Nitrosamine** . اذ ان توفر امينات ثانوية **Secondary amine** في التربة التي قد تضاف كمبيدات حيث ان بعض المبيدات الحشرية من الناحية الكيميائية عبارة عن امينات ثانوية ، كما ان البقايا النباتية غالباً ما تحتوي على هذه المركبات او تكونها بعض الاحياء المجهرية في اثناء نشاطها على المبيدات وغيرها من المواد الطبيعية . تتفاعل هذه الامينات مع النتريت فيتكون مركب **Nitrosamine** وهو يعد مادة مسرطنة **Carcinogenic** عند وصوله للانسان عن طريق الماء او الخضراوات -



إذ أن R ، R يمكن أن تكون مجموعة مثيلية أو سلسلة كاربونية مستقيمة أو حلقة. أن مركبات النتروز أمين جلبت الانتباه حديثاً نظراً لأنه بات واضحاً أنها تسبب حدوث بعض الأمراض السرطانية والطفورات وبعض المظاهر الشاذة وأحياناً وفاة الاجنة. ولم تظهر حتى الآن مشاكل بيئية ناجحة عن مركبات النتروز أمين وذلك لقلة احتمال تكونها في التربة، ولكن مدى فاعلية هذه المجموعة من المركبات يجعل تقويم الاضرار الناشئة عن وجودها ضرورية.

وفي الظروف الاعتيادية لا يوجد النتريت في التربة ولكنها قد تظهر بكميات كبيرة في التربة وتتكون باستمرار في اثناء عملية النترجة واختزال النترات. وكذلك بعض النباتات التي تستهلك من قبل الانسان كغذاء يمكنها امتصاص هذه المركبات ولكن حتى الآن لا يتوفر الدليل على انتاج هذه المواد الكيميائية في التربة في الظروف الطبيعية.

لقد شهدت السنوات الاخيرة زيادة كبيرة في اضافة المركبات النيتروجينية للتربة وذلك اما على صورة اسمدة كيميائية تضاف بهدف زيادة الانتاج الزراعي أو على صورة كميات ضخمة من سمد الفضلات الحيوانية من اجل التخلص منها أو على صورة المخلفات الصلبة والمتبقية من معاملة مياه مجاري المدن للعمل على تلاشي تلوث المياه القريبة. لذا تحدث عملية النترجة بسرعة واضحة للاسمدة الكيميائية المحتوية في الغالب على املاح الامونيوم واليوربا في حين نجدها على العكس بطيئة بالنسبة للمواد العضوية النيتروجينية الموجودة في المخلفات العضوية. ويبدو واضحاً مدى امكانية مساهمة الاسمدة في زيادة محتوى التربة والمياه من النترات اذا ما اخذ بنظر الاعتبار النمو المستمر في صناعة الاسمدة خلال السنوات الماضية والحاجة الماسة الى التوسع في مثل هذه الصناعة وخصوصاً في الوقت الحاضر للمحافظة على مصادر الغذاء في الدول المتقدمة ولسد نقص التغذية واحتياجات السكان في الدول النامية. ولكن الضرر ينتج من عدم استخدام المحاصيل الزراعية لتلك الاسمدة المضافة الى التربة بصورة كاملة بل تستخدم جزءاً قليلاً منها، اذ نجد ان اغلب الجزء المتبقي في التربة يتأكسد الى النترات التي تتعرض اثر تكونها لفعل عمليتي الغسل بمياه التربة وانطلاق النيتروجين بعملية الـ **Denitrification**.

مما تقدم يتضح خطورة تراكم النترات في التربة وتلويثها للمياه والخضر ولهذا السبب تضاف بعض المواد الكيميائية مع المخصبات الكيميائية النيتروجينية مثل كبريتات الامونيوم واليوريا وغيرها وذلك للتقليل من كميات النترات المتكونة على شرط ان تكون هذه المواد ليست سامة وغير ملوثة للبيئة ولا مكلفة اقتصادياً وان يكون استعمالها بتركيزات قليلة فعالاً في تثبيط عملية النترجة في التربة . وتشمل هذه المواد الامثلة الآتية :-

Chlorinated pyridines , Sodium or potassium azide , Trichloracetamide , pyrimidines , 2- chloro - 6 (trichloromethyl) pyridine (N- serve) , Dicyandiamide (DCD).

وبغیرها من المواد الأخرى .

ولقد اظهرت النتائج أن المواد N-serve و DCD هي من المواد الكفءة في عملية تثبيط النترجة من خلال استعمالها بكميات قليلة جداً وليس لها تأثير سمي يذكر وتحللها في التربة الى مواد غير سامة كما ثبتت كفاءتها في المجال التطبيقي أيضاً . إن تثبيط عملية النترجة معناه تحويل صيغة النيتروجين وتراكمه على شكل ايونات الامونيوم بدلاً من النترات . إذ ان ايونات الامونيوم لا تكون عرضة للفصل بالمياه اضافة الى ارتباطها بغرويات التربة على عكس النترات التي تكون حرة في محلول التربة . وهذه الحالة تكون لها فائدة كبرى لتجهيز النباتات بالنيتروجين وعلى طول فترة النمو كذلك الوقاية من احتمال تلوث التربة بالنترات . كما يجب الاخذ بنظر الاعتبار عند استعمال تلك المواد الكيميائية هو اختيار انسب التركيزات المثبطة لعملية النترجة بحسب نوع النبات المزروع والمدة اللازمة للتثبيط ، ونوع التربة ، وسرعة عملية النترجة ، وحالة المناخ ، وكمية الاسمدة الكيميائية المضافة وغيرها من العوامل التي تؤثر في التربة وخصوصاً على عملية النترجة .

اختزال النترات وانطلاق النيتروجين :

Nitrate Reduction & Denitrification

ان خطوات معدنة النيتروجين خلال دورته تسبب انطلاقه اما على هيئة مركبات معدنية او يحول الى صور عضوية بعملية التمثيل وتؤدي عملية النترجة الى تحول صور النيتروجين من الحالة المختزلة الى صورة مؤكسدة . كما ان هناك حالة فقد للنيتروجين عن طريق تطايره الى الجو على هيئة غازات نيتروجينية وتسمى الخطوة

الآخيرة عملية انطلاق النيتروجين ومعناها اختزال الميكروبات للنترات والتثبيت وانطلاق النيتروجين الغازي N_2 وأكاسيد النيتروجين كأكسيد النتروز N_2O . وفي أغلب الأحيان يكون الناتج النهائي لاختزال النترات إما N_2 أو N_2O وأحياناً NO وعملية تحويل النترات إلى مركبات نيتروجينية غازية تسمى عملية الـ **Dentrification** (انطلاق النيتروجين) ، وفي هذه العملية يتكون غاز النيتروجين N_2 بوسيلة حيوية وبما أن النيتروجين وهو في هذه الحالة يكون غير جاهز للحياة كمصدر نيتروجيني كالنترات مثلاً لذا تعد عملية انطلاق النيتروجين عملية ضارة من هذه الناحية .


وعندما تستخدم الميكروبات أيونات النترات والتثبيت كمصدر للنيتروجين اللازم للنمو فإن تلك الميكروبات تختزل تلك الأيونات إلى الأمونيا التي تساهم بتحويل صور النيتروجين إلى شكل ملائم لتكوين الأحماض الأمينية داخل الخلية . ولكن عملية انطلاق النيتروجين تعني فقد النيتروجين وتطايره إلى الجو ولا يدخل في تكوين الخلية .

وتعد عملية انطلاق النيتروجين إحدى طرق التنفس التي تحل فيها النترات محل غاز الأوكسجين لذلك يطلق عليها أيضاً تسمية عملية التنفس النتراتي في حين يطلق على استخدام النترات كمادة غذائية تسمية (تمثيل النترات) وكلا الحالتين تعمان تفاعلات اختزال وإن الناتج النهائي لعملية التنفس النتراتي عبارة عن غازات متطايرة ، أما في حالة تمثيل النترات فإن الناتج النهائي يدخل في تركيب مكونات الخلية .

عند توفير النترات في التربة فإن احتمال تصاعد مركبات غازية نيتروجينية على شكل N_2 ، N_2O ، NO كنتيجة لعملية اختزال النترات خصوصاً في الظروف اللاهوائية . لذا فإن عملية اختزال النترات تحدث فقط عندما تكون الظروف في التربة غير هوائية فنقوم بعض الأنواع الميكروبية باستخدام الأوكسجين الموجود في المركبات النترائية وذلك للقيام بفعاليتها الحيوية إذ يمكنها استخدام النترات كمستقبل نهائي للإلكترونات ومن المحتمل أن تكون نواتج هذه العملية غاز الأمونيا إضافة إلى النيتروجين الجزيئي N_2 وأوكسيد النتروز N_2O وأوكسيد النترريك NO .

إن عمليات مختلفة يتداخل بعضها ببعض في عملية اختزال النترات كما هو موضح في الشكل (١٣) حيث أن النترات تختزل إلى الأمونيا وهي الحالة المؤكسدة

لاستعمالها كمصدر نيتروجيني من اجل النمو وكذلك بالامكان استعمال النترات كمستقبل للالكترونات في عملية انتاج الطاقة .



Representative genera of dissimilatory NH_3 -formers:

Aeromonas
Bacillus (certain species)
Enterobacter
Erwinia
Flavobacterium
Micrococcus
Mycobacterium
Nocardia
Staphylococcus
Vibrio

Representative genera of N_2 -formers:

Bacillus (certain species)
Hyphomicrobium
Moraxella
Pseudomonas
Spirillum
Thiobacillus (one species)

شكل (١٣) موازنة بين العمليات المختلفة لاختزال النترات والاحياء المسؤولة .

الاحياء المسؤولة عن عملية اختزال النترات وانطلاق النيتروجين :

ان انطلاق النيتروجين يحدث بواسطة بعض الميكروبات المتخصصة ، وعملية اختزال النترات ليست هي العملية الوحيدة التي تعتمد عليها تلك الميكروبات بل انها تعتمد اضافة الى ذلك على تحليل البروتين وعملية الشدرة وغيرها من التحولات الحيوية .

ان البكتريا التي تسبب انطلاق النيتروجين تنتشر في الاراضي المزروعة اذ تصل اعدادها الى مليون خلية او اكثر في الغرام الواحد من التربة وتزداد اعدادها في منطقة الرايزوسفير (المنطقة المحيطة بالجذور) . ان عملية انطلاق النيتروجين تحدث في ظروف خاصة وهي الظروف التي تجعل الميكروبات المسؤولة تتحول من التنفس الهوائي الى القيام بعملية انطلاق النيتروجين (التنفس النتراتي) . ان الفطريات واللاكتينومايسيتات لاتساهم جميعاً في عملية انطلاق النيتروجين بل يقتصر على عدد محدد من الأنواع البكتيرية ذاتية او غير ذاتية التغذية ، من أهمها :

Paracoccus denitrificans

Pseudomonas denitrificans

Pseudomonas aeruginosa.

Bacillus Licheniformis.

Thiobacillus denitrificans



Chromobacterium Sp.

Hypomicrobium Sp.


Corynebacterium Sp.

Serratia Sp.

وقد وجد أن ميكروب *Parococcus denitrificans* ا، التي التغذية اختياراً ينمو بوجود الهواء او عدم وجوده عند توفر المواد العضوية او الهيدروجين مصدراً للطاقة ومستخدماً الاوكسجين أو النترات كمستقبل للهيدروجين . أما ميكروب *Thiobacillus denitrificans* ذاتي التغذية الكيميائية المؤكسد للكبريت فله القدرة على النمو اللاهوائي عند توفر املاح النترات حيث يمكنه استخدام الكبريتيد والكبريت العنصري او الثايوكبريتات كمصدر للطاقة ويحولها جميعاً الى كبريتات ويحول كذلك النترات الى النيتروجين الجزيئي N_2 كما في المعادلات الآتية ، -



أما الاحياء غير ذاتية التغذية والمذكورة آنفاً فتتمكن ايضاً من استخدام المواد الكاربوهيدراتية كالكلوكوز مثلاً كمصدر للطاقة وتستطيع ايضاً اختزال النترات وتحرر غاز النيتروجين ،



وهناك عوامل بيئية اساسية تؤثر في الميكروبات التي تقوم بعملية انطلاق النيتروجين منها عوامل طبيعية ، وكمية المادة العضوية في التربة ، والتهوية ، ومستوى الرطوبة ، درجة الاس الهيدروجيني ودرجة الحرارة .

إن عملية انطلاق النيتروجين تكون اقل في الاراضي التي تفتقر الى وجود الكربون ويعتمد مدى كفاءة المادة العضوية على تشجيع انطلاق النيتروجين في الاراضي المغورة بالما مع مدى قابلية هذه المواد للاستخدام من قبل الميكروبات .

ويعد الاوكسجين من أهم البيئية الحاسبة المحددة لنمو بكتريا انطلاق النيتروجين ويعزى ذلك الى تأثير هذا الغاز في واحد او اكثر من الميكروبات التي تقوم بهذه العملية .

كما ان انطلاق النيتروجين في الاراضي الجيدة الصرف يرتبط ارتباطاً واضحاً بمستوى الرطوبة حيث تزداد عملية انطلاق النيتروجين من النترات المضافة بارتفاع نسبة الرطوبة في الاماكن السيئة الصرف وذلك لتحديد مدى انتشار الاوكسجين الى مواقع نشاط الميكروبات المسؤولة .

ويعد الاس الهيدروجيني كذلك من العوامل البيئية المؤثرة في نشاط بكتريا انطلاق النيتروجين اذ تعد معظم هذه الانواع من البكتريا حساسة للتركيز العالي من ايون الهيدروجين .

كما ان درجة الحرارة تقوم بدور اساسي في عملية انطلاق النيتروجين اذ ان اقصى معدل للعملية تكون عند درجة حرارة بين ٢٥ م و ٣٥ م ويمكن للعملية ان


تستمر حتى درجة ٦٥° م ولكنها تتوقف تماماً عند درجة ٧٠° م أو أكثر . كما إن العملية تكون بطيئة عند درجة حرارة ٢° م أو أقل .

ويشير تصاعد غاز النيتروجين N_2 بسرعة عند درجات الحرارة العالية الى وجود ميكروبات تفضل الحرارة العالية متخصصة في هذه العملية .

انطلاق النيتروجين والتلوث البيئي (تلوث الهواء) :

ان عملية انطلاق النيتروجين تؤثر تأثيراً سلبياً ومباشراً في خصوبة التربة فهي تؤدي الى اختزال النترات وتقليل كميتها في التربة ، وان الدراسات الحالية تشير الى ان هذه العملية تؤدي الى فقدان كمية كبيرة من نيتروجين التربة ولهذا السبب لابد من السيطرة على هذه العملية بتغيير الظروف التي تشجعها وهي التي اشير اليها سابقاً . كما ان عملية انطلاق النيتروجين تساهم بتلوث الهواء الجوي باوكسيد النتروز N_2O الذي يكون له دور في ازالة جزء من الاوزون O_3 وتحطيمه في الجو .

هناك طبقة متموجة يصل سمكها قرابة (٣ كم) وتقع على ارتفاعات عالية وفي الغلاف الغازي المحيط بالارض (على بعد حوالي ٢٥ كم) وتحتوي على كمية حيوية من جزيئة الاوكسجين O_3 (بحدود ٠.٠٠١ بالمائة) وهي تعرف بطبقة الاوزون اذ يتحول الاوكسجين الى بخار سام ذي لون مائل الى الزرقة يعرف بالاوزون نتيجة لتفاعلات ضوئية على ارتفاعات كبيرة : $2O_2$





ان لهذه الطبقة اهمية كبرى لامتناسها اشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة اذ ان استمرار نقص هذه الطبقة حول الارض سوف يؤدي الى زيادة تعرض الانسان للاشعة فوق البنفسجية مسببة سرطان الجلد كما يؤدي ذلك الى حدوث اضرار في الحيوان والنبات على حد سواء .

ان الميكروبات تقوم بدور اساسي في دورات اكاسيد النتروجين في الجو ولذلك تؤثر بصورة غير مباشرة على تعرض الحياة على كوكب الارض للتأثيرات الضارة للاشعة فوق البنفسجية . اضافة الى تسرب كميات من NO و NO_2 الى الجو نتيجة لاحتراق الفحم والبتروول والغازات الطبيعية وغيرها من انواع الوقود التي تستخدم في

الصناعة ووقود السيارات فهناك دراسات تشير الى ان الميكروبات لها دوراً ايضاً في انطلاق هذه الغازات الملوثة الى الجو بكميات تفوق بدرجة عالية (قد تصل الى عشرات المرات) الكميات الناتجة عن فعل الانسان . حيث تعمل ميكروبات التربة والبحار على انتاج اوكسيد النترك NO الذي يتأكسد بدوره في الجو الى NO_2 وكذلك يعد انطلاق اوكسيد النتروز N_2O نتيجة فعالية الميكروبات في اختزال النتترات من المخضبات الكيميائية النيتروجينية التي تضاف بكميات كبيرة جداً للتربة كسماد نيتروجيني .

ان غاز N_2O لا يمد ضاراً عند وجوده قرب سطح التربة بتركيز قليلة ولكن اذا كان هذا الغاز ينطلق بكميات كبيرة فبالامكان وصوله الى طبقات الجو العليا ويؤدي دوراً في ازالة جزء من مركب الاوزون .

وكما ذكرنا سابقاً فان الاوزون يعد حاجزاً ضرورياً لحماية الكائنات الحية الدقيقة من التأثير الضار لفعل الاشعة فوق البنفسجية عند اطوال موجات اقل من 300nm وكما اشرنا فان غياب هذا الحزام الواقى ضد الاشعة فوق البنفسجية يحتمل ان يؤثر في الانسان ويعد من نمو النباتات وخلق حالة غير متوازنة على سطح الكرة الارضية تشمل جميع الكائنات الحية . وتدخل ميكروبات انطلاق النيتروجين في التأثير في مركب الاوزون نظراً لانتاجها الغاز N_2O بعملية اختزال النتترات الموجودة في المركبات النيتروجينية المستخدمة كاسمدة بهدف زيادة الانتاج الزراعي ، اذ ينتشر غاز اوكسيد النتروز في طبقات الغلاف الجوي ويتأكسد الى اوكسيد النترك NO . وبالتالي فان كلاً من N_2O , NO يعملان على تدمير بعض الكميات من الاوزون حسب المعادلات الاتية ،



ان بعض العلماء يعلل ازالة بعض جزيئات الاوكسجين من طبقة الاوزون يعود الى تراكيز اوكسيد النترك المصاحبة لزيادة غازات الغلاف الجوي خلال فترات الفعالية الشمسية العالية وتعد هذه احدى النظريات الرئيسة التي تفسر مشكلة تلاشي الاوزون ونقصه وما تزال الدراسات مستمرة في هذا المجال لايجاد السبب الرئيس المؤثر في هذه الطبقة .

وتشير قياسات النصف الاول من عام ١٩٨٨ التي اجراها جمع من العلماء في محطة مكموردو (Mecmurdo) في القطب الجنوبي الى ان مستويات اكاسيد النيتروجين في فجوة الاوزون المكتشفة هناك قليلة جداً . وهناك اجراءات مستقبلية لحماية طبقة الاوزون ومنها الحد من المواد الكيميائية التي تؤثر في هذه الطبقة وإيجاد البدائل فمثلاً قامت اليابان بعد النصف الثاني من عام ١٩٨٨ من جانبها بتقليل استعمال الكلورفلور كاربون في المواد التي تدخل في صناعة المنظفات الصناعية وتخفيضها الى النصف بحلول عام ١٩٩٩ وإيجاد بدائل غير ضارة بطبقة الاوزون حيث ان اليابان تصنع حوالي ١٥ ٪ من جملة انتاج العالم من هذه الكيماويات . يعد مركب الكلورفلور كاربون اهم مدمر لطبقة الاوزون اذ ان له تأثيراً مشابهاً لتأثير غاز CO_2 وذلك في حجز بعض الاشعة تحت الحمراء عن الارض وهذا ما يجعله محتفظاً بالحرارة على سطحه . ان المواد المذكورة في اعلاه ترتفع ببطء الى طبقة الستراتوسفير التي تمتد الى مسافة ٢٠ كم فوق طبقة الاوزون وبسبب تأثير اشعة الشمس تتحول الى ذرات الفلور والكلور التي يرجع اليها السبب في تدمير حزام الاوزون الواقى .

بسبب استنزاف طبقة الاوزون من الجو نتيجة لتصادم الابخرة الكيماوية وغيرها ، وحدثت ظواهر اخرى مثل تسمم التربة والماء بالاسمدة والمبيدات وظاهرة البيوت الخضراء ، اتجه العلماء في العالم الى مكافحة التلوث بهدف تشجيع مشروعات التنمية والتخفيف من غائلة الفقر في العالم الثالث بطريقة لاتضر بالبيئة . ويجب ان يكون هناك تضامن انساني بين الجيل الحالي والمستقبل يهدف الى هذه الغاية وهي منع التلوث او التقليل منه قدر الامكان .

مما تقدم يتضح ان الميكروبات تقوم بدور حرج غير مباشر في دورة الاوزون في طبقات الجو اذ تعمل على تقليل الكميات الموجودة منه مؤدية بذلك الى الحد من الحماية الطبيعية ضد فعل الاشعاعات الضارة . ومن المعتقد حالياً ان الاستعمال الكثيف للاسمدة النيتروجينية بهدف رفع القيمة الغذائية لسكان المناطق الفقيرة في كثير من دول العالم والحصول على الطعام اللازم لمواجهة الزيادة المستمرة في تعداد السكان قد يؤدي الى تراكم كميات كبيرة من النترات اثر اكسدة هذه الاسمدة وبالتالي ينتج الكثير من غاز اوكسيد النتروز N_2O عند اختزال هذه النترات المتكونة . وعلى الرغم من عدم توفر الادلة الكافية على كيفية حدوث تغيير واضح في محتوى الغلاف الجوي من غاز اوكسيد النتروز الا ان امكانية حدوث التغييرات المهمة الناشئة عن وجود هذا الغاز تدعو بلا شك الى اجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال من اجل تحديد الدور الذي يقوم به هذا الغاز في التأثير في طبقة الاوزون .

الفصل السابع

التثبيت الحيوي للنيتروجين

Biological - Nitrogen Fixation

ان اهمية عنصر النيتروجين تأتي من كونه يدخل في تركيب البروتين والاحماض النووية في الخلية الحية . كما ان وجوده بشكل غاز في الهواء يجعله عديم الفائدة مالم يتحد مع الهيدروجين لتكوين الامونيا او مع الاوكسجين لتكوين النترات مثلاً . ان عملية الاتحاد هذه يمكن الحصول عليها بعد تحويل النيتروجين الى شكل قابل للدخول في تفاعلات الايض التي تعتمد عليها جميع اشكال الحياة . ان تحول النيتروجين الى الشكل الذي يؤهله للدخول في الفعاليات الحيوية يمكن ان يحصل بطريقة حيوية بواسطة الاحياء المجهرية بعملية تدعى : تثبيت النيتروجين **Nitrogen Fixation** وتعرف بأنها عملية اختزال النيتروجين الجوي الى امونيا بمساعدة انزيم النيتروجيناز **Nitrogenase** وتوفر مصدراً للطاقة **ATP** وايون موجب ثنائي التكافؤ مثل المغنسيوم **Mg** أو المنغنيز Mn^{++} او غيرها مع وجود عامل اختزال **Reductant** يمنح الالكترونات ومستلم الالكترونات الذي يختزل . وتثبيت النيتروجين اما ان يكون بصورة لاتكافلية (حرة) او بصورة تكافلية .

ان النيتروجين يزال باستمرار من التربة خلال عملية او فعل الغسل **Leaching** **action** للماء الذي يزيل النترات بعد تكوينها ومن ثم فلا بد من اضافة النيتروجين الصالح للاستعمال باستمرار الى التربة للحفاظ على المحتوى النيتروجيني لها .

- يكون التجهيز الطبيعي للنيتروجين المثبت محدوداً جداً ويشمل -
- ١ - كميات قليلة من النيتروجين المثبت على شكل ايونات الامونيوم والنترات الموجودة في ماء المطر .
 - ٢ - زيادة خصوبة التربة قد تضيف نيتروجين مثبت كزيادة محتوى التربة من المادة العضوية وغيرها .

ان العمليتين السابقتين لاتعوض كمية النيتروجين المفقود من التربة بوساطة عملية اختزال النترات **Denitrification** لذا لا بد من تثبيت النيتروجين بطرق اخرى ، وتمثل الكائنات المجهرية اكثر الوسائل اهمية في عملية التثبيت هذه .

ان ٨٥ % تقريباً من النيتروجين المثبت هو نيتروجين مثبت حياتياً ، اذ ان تثبيت النيتروجين صناعياً يكون بكميات قليلة . ان عملية التثبيت تستهلك كميات كبيرة من النيتروجين الجوي تقدر بـ ٢٠٠ / ١٠ طن سنوياً بالطرق الحيوية والصناعية اضافة الى كميات اخرى مساوية لها تقريباً تستهلك عن طريق الترسيب في البحر وفي القشرة الارضية على شكل املاح النترات والنتروز والامونيوم . ان تعويض هذه الكمية الكبيرة يتم بوساطة طريقتين رئيسيتين هما ،



- أ - عملية اختزال النترات **Denitrification** ، اذ تتحول فيها النترات الى نيتروجين جزيئي N_2 او اوكسيد النتروز N_2O في اغلب الاحيان .
- ب - التعويض عن طريق التطاير **Volatilization** حيث يتم تعويض النيتروجين الجوي عن طريق تطاير الامونيا من التربة الى الجو لقلّة امتصاص جزيئات التربة لها ، وتقدر كمية النيتروجين المتطاير على هيئة غازات نيتروجينية الى الجو بـ ١٨٥ × ١٠ سنوياً .

ان عملية تثبيت النيتروجين تجري كما بينا آنفاً بمساعدة انزيم النتروجينيز والصفات لهذا الانزيم هو وجود نوعين من البروتين اللذين يحتويان على بعض المعادن ،

- ١ - البروتين الاول ، يحتوي على المولبدنوم **Mo** والحديد وكبريت في مجموعة الثايول ويدعى هذا البروتين **Mo-Fe protein** ويرمز له بالحرف **(X)** ويطلق عليه ايضاً **Molybdoiron protein** ويتراوح وزنه الجزيئي بين (١٠٠,٠٠٠ - ١٢٠,٠٠٠)
- ٢ - البروتين الثاني ، يحتوي على حديد وكبريت ويدعى بروتين **(Iron protein)** **Fe** ويرمز له بالحرف **(Y)** ووزنه الجزيئي حوالي (٥٠,٠٠٠) .

ان البروتينين المذكورين آنفاً يكونان غير فعالين عند وجودهما بصورة منفصلة ، الا ان جزيئة الانزيم الفعالة تتكون من اتحاد هذين الجزأين بعضهما ببعض وهناك تشابه كبير في الوظيفة والتركيب الكيميائي لهذا الانزيم حتى في حالة كون الكائنات الحية التي يستخلص منها بعيدة في السلم التصنيفي .

ان لانزيم النيتروجينز القدرة على نقل الالكترونات من حوامل الالكترونات الى النيتروجين وله القدرة ايضاً على نقل الكترونين فقط في كل حالة يشترك فيها وهناك اقتراح بحصول ثلاث حالات لانتقال الالكترونات ليصبح مجموع الالكترونات المنقولة ستة وذلك لاختزال جزيئة النيتروجين الى امونيا كما هو موضح كالآتي :



كما ان عملية تثبيت النيتروجين تحتاج الى مانح للالكترونات ، **Electron donor** كما تحتاج ايضاً الى حامل للالكترونات ، **Electron carrier** . فبالنسبة لمانح الالكترونات فانه يختلف باختلاف الاحياء من الناحية الفسلجية وباختلاف طرق معيشتها ، فالاحياء المجهرية الحرة المعيشة وغير ذاتية التغذية واللاهوائية مثال بكتريا **Clostridium** فيكون مانح الالكترونات كاربوهيدراتي مثل البايروفيت **pyruvate** و الفاكيتوكلوتاريث **α-Keto glutarate** . ويكون محرراً الالكترونات بعملية التخمر **Fermentation** . اما في الاحياء الهوائية فان الالكترونات تتحرر عن طريق الاكسدة . وبالنسبة للاحياء الهوائية التي تعيش بصورة تكافلية مع النبات فان النبات يقوم بتوفير المواد الوسطية التي تكون مصدراً لتلك الالكترونات فلقد وجد ان **NADPH₂** يشكل مانحاً للالكترونات كما هو الحال في بكتريا الـ **Azotobacter vinelandii** على الرغم من ان الـ **NADP** يعد حاملاً للالكترونات لا محرراً لها ، ولكن بما ان هذا المركب لا يملك القدرة على تمرير هذه الالكترونات الى انزيم النيتروجينز مباشرة دون حملها بواسطة مواد لذلك يمكن عده مانحاً للالكترونات في هذه الحالة ولذلك تنتقل الالكترونات فيه الى حاملها الآخر ثم الى انزيم النيتروجينز .

كذلك فان عملية تثبيت النيتروجين تحتاج الى ما يحمل الالكترونات وهذه المواد لها القدرة على حمل الالكترونات ونقل من انزيم الى آخر. ان حاملات الالكترونات التي تشترك في عملية تثبيت النيتروجين هي من نوع الفيرودوكسينات **Ferredoxins** والفلافودوكسينات **Flavodoxins** التي لها القدرة على نقل الالكترونات الى انزيم النيتروجينز الذي يساعد بدوره على اختزال النيتروجين الجزيئي الى امونيا .. وقد تم



العثور على هذه الحوامل في بكتريا لاهوائية اختبارية وبكتريا هوائية وبكتريا تكافلية مثبتة للنيتروجين وبكتريا لاهوائية مجبرة وبكتريا ضوئية التغذية والطحالب الخضراء الزرقاء وفي النباتات أيضاً .

تتميز حاملات الالكترونات هذه بامتلاكها جهد اكسدة واختزالاً واطئاً اي انها تستطيع استلام الالكترونات من مواد لها جهد اكسدة واختزال اعلى منها مثل ، $NADPH_2$ ثم تحولها الى مواد اوطأ جهداً وكذلك بتفاعلاتها العكسية عندما تتأكسد وتختزل ، اي ان لها القدرة على التحول من حالة اكسدة الى حالة اختزال وهذا التحول عكسي . ان عمل هذه الحوامل ليس انزيمياً حيث اتضح مؤخراً بانهما المختزلان الطبيعيان الوحيدان لانزيم النيتروجينز .

ان البحث مايزال مستمراً حول تفاصيل عملية تثبيت النيتروجين وظهر من نتائج الابحاث ان بروتين - Fe من انزيم النيتروجينز هو الذي يختزل اولاً بواسطة حامل الالكترونات الفيرودوكسين **Ferredoxin** في الخلية الحية ثم يقوم الـ **ATP** بتوفير طاقة لتنشيط الالكترونات المنقولة الى البروتين هذا لكي يتم نقلها الى الجزيئة الثانية من البروتين في انزيم النيتروجينز وهو بروتين - Mo-Fe الذي يقوم باختزال النيتروجين الجزيئي الى امونيا .

ان حاملات الالكترونات الفيرودوكسينات **Ferredoxins** هي عبارة عن بروتينات تحتوي على الحديد والكبريت ولها القدرة على الاختزال والتأكسد بصورة عكسية وتملك جهد اكسدة واختزال واطيء وتشارك هذه البروتينات في تفاعلات عديدة مثل اختزال انزيم النيتروجينز وانزيم الهيدروجينز وغيرها . اما الفلافودوكسينات **Flavodoxins** فهي ايضاً بروتينات تنتمي الى مجموعة الـ **Flavoprotein** وفعاليتها الحيوية مشابهة للفيرودوكسينات لكنها اقل كفاءة في نقل الالكترونات لان لها جهد اكسدة واختزال اعلى بقليل من جهد الفيرودوكسينات .


ان بروتين - Mo-Fe هو الذي يقوم باختزال النيتروجين الجزيئي الى الامونيا ، في حين يقوم البروتين - Fe باختزال الاستيلين **(C₂H₂) Acetylene** الى الاثيلين **(C₂H₄) Ethylene** شكل (١٤) .




يعد النيتروجينز انزيمياً خاصاً جداً للأسباب الآتية ، -

- ١ - يكون حساساً لدرجات الحرارة الواطئة .
- ٢ - وحساساً جداً للاوكسجين وتكون الوقاية له من الاوكسجين كما يأتي ، -
أ - في البقليات بوساطة الهيموكلوبين البقلي **Leghaemoglobin**
ب - في بكتريا الازوتوباكتر **Azotobacter** بوساطة الشمع .
ج - في الطحالب الخضراء المزرقة بوساطة اماكن ذات جدار خلوي سميك تعرف بالاكياس المتغايرة **Heterocysts** . اضافة الى ذلك فان هناك انواعاً بكتيرية هوائية اجبارية مثل **Azotobacter Vineladli** تستطيع استخدام الاوكسجين الموجود في البيئة عن طريق التنفس وبهذا تحتفظ ببيئة لاهوائية تحيط بأنزيم النيتروجينز .
- ٣ - يكون حساساً جداً لأيونات الامونيوم NH_4^+ .
- ٤ - يمتلك جهازاً اختزالياً واسعاً حيث يختزل الاستيلين الى الاثيلين وهذه العملية تعد تقنية خاصة لقياس فعالية الانزيم .


ان الجهاز الاختزالي للانزيم يشمل بالاضافة الى اختزال النيتروجين الجزيئي عمليات اختزالية اخرى وكل خطوة تحتاج الى عدد من الالكترونات وبصورة عامة تكون كما يأتي . -



ونستطيع تتبع التفاعلات في اعلاه بصورة عامة كما في المخطط الآتي ، -




ومن ملاحظة التفاعلات الاختزالية ايضا نجد ان انزيم النيتروجينز له القدرة على اختزال البروتونات (H^+) الى غاز الهيدروجين (H_2) عند عدم توفر النيتروجين بوجود محرر الالكترونات ، وان الهيدروجين يعمل كعامل تنافسي لكنه ضعيف في عملية تثبيت النيتروجين . أما في البكتريا التي تحتوي على انزيم الهيدروجينز والفيروكسين مثل بكتريا الـ **Clostridium** فان غاز الهيدروجين قد يستعمل عامل اختزال في عملية التثبيت :-




هناك طريقتان رئيستان لتقدير التثبيت الجوي للنيتروجين ،
١- باستخدام نظير النيتروجين $^{15}N_2$ حيث تتمكن الميكروبات المثبتة للنيتروجين من استخدام هذا الغاز ودمجه في بروتوبلازم الخلايا ، الا ان هذه الطريقة مكلفة اقتصادياً وتحتاج الى جهاز : **Mass Spectrometer** .

٢ - قياس مقدرة الميكروبات على تكوين غاز الاثيلين C_2H_4 من غاز الاستيلين C_2H_2 ، حيث ان الميكروبات التي لها القدرة على تثبيت النيتروجين الجوي يمكنها اختزال جزيء الاستيلين الذي يحتوي على رابطة أو أصرة ثلاثية $HC \equiv CH$ ان اختزال النيتروجين الذي يحتوي ايضاً على أصرة ثلاثية في العملية الاولى ينتج عنه تكون الامونيا ،



واختزال الاستيلين C_2H_2 ينتج عنه تكون الاثيلين C_2H_4 في العملية الثانية ،



Acetylene → Ethylene

يتم تثبيت النيتروجين بواسطة نوعين من الكائنات منها تعيش بصورة حرة واخرى تعيش في علاقة تكافلية مع نباتات مختلفة . ان هذه البكتريا لها القدرة على اختزال غاز النيتروجين وتحويله في النهاية الى مجموعة امين NH_2^- للاحماض الامينية التي تؤلف البروتينات . وتحدث هذه العملية في عدد من الخطوات إذ يتم تنشيط غاز النيتروجين أولاً ثم يختزل الى الامونيا . يحتاج هذا التفاعل الاجمالي الى استهلاك هائل للطاقة حيث تصرف حوالي (١٥) جزيئة ATP لكل جزيئة نيتروجين يتم تثبيتها . بعد ذلك يتم دمج الامونيا المتكونة داخل الخلية في الاحماض الامينية بواسطة عملية نقل مجموعة الامين ، **Transamination** .

وعلى سبيل المثال فان المتطلبات اللازمة لتثبيت (١٥٠) كغم نيتروجين في التثبيت التكافلي هي (١٠٠٠) كغم كاربوهيدرات ، أي ما يعادل ١٥ - ٢٠ ٪ من صافي انتاج النبات من الكاربوهيدرات . أما المتطلبات اللازمة لتثبيت الكمية في حالة التثبيت بصورة حرة فالمثبتات الهوائية مثل *Azotobacter* و *Bejerinkia* هي (٤٠٠٠) كغم كاربوهيدرات والمثبتات اللاهوائية مثل ، *Clostridium* و *Desulfovibrio* ، *Methanobacterium* . فانها تحتاج الى (٢٠٠٠) كغم لتثبيت نفس الكمية اعلاه .

وبصورة عامة فان اختزال غاز النيتروجين الى الامونيا NH_3 يحتاج أو يتطلب طاقة عالية جداً وعلى ضوء الدراسات الاخيرة قدرت تلك المتطلبات من الناحية الكيميائية والبايوكيميائية ومن النواحي النظرية والتطبيقية كما يأتي : -

Chemical	K cal/ kg NH ₄ -N produced
<hr/>	<hr/>
Theoretical	5100
practical	1500
(production + processing)	
Biochemical	
<hr/>	<hr/>
Theoretical	5100
practical	
Rhizobium	15.000 – 20.000
Azotobacter	100.000 – 400.000

تثبيت النيتروجين بصورة لا تكافلية (بصورة حرة) :

Non Symbiotic Nitrogen Fixation

إن الاحياء التي تقوم بهذه العملية تعيش بصورة حرة في التربة وتثبت النيتروجين وذلك للاستفادة منه في بناء مكونات الخلية وبعد موت الخلايا ينطلق هذا النيتروجين المثبت داخل الاحياء الى التربة ليفيد منه النبات ويطلق على هذا النوع من التثبيت بالتثبيت اللاتكافلي للنيتروجين .


لقد تم التعرف على هذا النوع من التثبيت عندما استطاع العالم الروسي Winogradsky سنة ١٨٩٥ من عزل بكتريا لاهوائية في التربة لها القدرة على تثبيت النيتروجين بصورة حرة وهذا النوع هو *Clostridium pasteurianum* .

كما أعقب ذلك عزل بكتريا هوائية لها القدرة على تثبيت النيتروجين بصورة حرة تتبع الجنس *Azotobacter* وبعد ذلك تم التعرف على أنواع أخرى من البكتريا هوائية ولا هوائية وبكتريا التركيب الضوئي وبعض الانواع من الطحالب الخضراء المزرقه .

إن البكتريا الرئيسة التي تقوم بتثبيت النيتروجين بصورة لا تكافلية تتبع لعائلة *Azotobacteriaceae* حيث تضم هذه العائلة انواعاً ذات كفاءة عالية في تثبيت النيتروجين الجوي ، خلاياها عصوية او بيضوية سالبة لصبغة كرام ولا تكون سبورات بعضها يكون حويصلات cysts وغير ذاتية التغذية هوائية اجبارية

وتعيش في التربة والمياه وعلى سطوح اوراق النباتات . تضم هذه العائلة اربعة اجناس تختلف فيما بينها ببعض الصفات وهي :

Azotobacter , Azomonas , Beijerinckia , Derrxia واهم الاجناس المذكورة اعلاه هو جنس الـ **Azotobacter** وهي اول بكتريا هوائية عرفت بقابليتها على تثبيت النيتروجين الجوي وقد عزلها العالم Beijerick سنة ١٩٠١ من التربة . خلايا هذا الجنس كبيرة بيضوية الشكل وتوجد إما بصورة منفردة او في ازواج بعضها متحرك بواسطة أسواط محيطية **Peritrichous** وبعضها غير متحرك . سالبة لصبغة كرام في الغالب او متغيرة الصبغة احياناً . ولا تكون سبورات الا انها تكون حويصلات **cysts** شكل (١٥) وتتكون الحويصلة عندما تتجمع كميات كبيرة من حامض **polyhydroxy butyric acid (PHB)** الذي يخزن في البكتريا المتقدمة في العمر ويتحول شكلها من البيضوي الى الكروي وتفقد حركتها مع ازدياد سمك جدارها وتتجمع محتويات الخلية في الوسط لتكون الجسم المركزي للحويصلة الذي يحاط بغلاف داخلي يسمى **Intine** وغلاف خارجي يعرف بـ **Exine** .



شكل (١٥) يوضح البكتريا المثبتة للنيتروجين بصورة حرة النوع : **Azotobacter Vinelandii** وتظهر الخلايا المضطربة للبكتريا الفتية بشكلها العصوي والمتقدمة بالعمر كروية ذات حوصلة .

والحيوية تكون أقل مقاومة للحرارة من السبورات الا انها تقاوم الجفاف . تنمو بكتريا الازوتوباكتر على وسط الاكار مانيتول وتكون مستعمراتها شفافة تشبه قطرات الماء ثم تتحول تدريجياً ويصبح لونها داكناً . أما في الاوساط السائلة فتكون اغشية بيضاء ثم تتحول الى بنية داكنة . وتكون هذه البكتريا مادة مخاطية كثيفة حول الخلية لتكون ما يشبه الحافظة Capsule . تحتاج البكتريا الى المركبات العضوية مصدراً للكربون في اثناء نموها مثل السكريات والاحماض القلوية والكحول ، كما تفضل درجة حرارة بين ٢٠ - ٣٠ م وال pH المفضل لها بين (٧ - ٧,٥) حيث انها لا تنمو في الوسط الحامضي .

يشمل جنس الـ *Azotobacter* على أربعة انواع جدول (١٢) اكثرها انتشاراً هو النوع *A. Chroococcum* . تنتشر بكتريا الازوتوباكتر في التربة والمياه وعلى اسطح النباتات والبكتريا الموجودة على اسطح جذور النباتات تكون انشط من تلك التي توجد في التربة وذلك لانها تفيد من افرازات الجذور مصدراً للكربون . ان النوعين *A. Chroococcum* و *A. vinelandii* تعد من اكثر الانواع انتشاراً في الترب العراقية .

جدول (١٢) الصفات المهمة التيها تميز الانواع البكتيرية التابعة الى الجنس *Azotobacter*

تاريخ العزل واسم العالم	الاصابة بالفاجات المراضة	تكوين مواد لزجة	تكوين حوصلة - الاوراط	استخدام الكاربوهيدرات	تكوين صلبة غير ذائبة بالماء	تكوين صلبة ذائبة براقة ذائبة بالماء
عزل عام ١٩١١ من Belierick	+	التربة	+	محيطية Peritrichous	-	-
عزل عام ١٩١٣ من Lipman	+	التربة	+	محيطية peritrichous	-	-
					عقراء A. Vinelandii	
					-	-
					+	+
					-	-
					عقراء A. chroococcum	

<i>bellernicki</i>	-	بنية	-	-	-	عزل عام ١٩٠٤ من Bellernick
<i>A. Papali</i>	خضراء	-	-	-	محيطة <i>perfrichous</i>	عزل عام ١٩١٦ من Dobereiner
					+	الترية
					+	-

تقاس كفاءة البكتريا المثبتة للنيتروجين بتنمية البكتريا على وسط خالٍ من النيتروجين ثم تقدر كمية النيتروجين إما بطريقة كلدال Kjeldahl أو باستخدام النماذج المشعة ^{15}N أو اختبار اختزال الاستيلين : Acetylene Reduction Test .
ر. كمية الاثيلين المتكونة من الاستيلين حيث يستعمل جهاز الـ (G.C)
لـ Gas chromatoc لهذا الغرض كما اوضحنا ذلك سابقاً .

كما تقاس كفاءة هذه البكتريا في تثبيت النيتروجين ايضاً في المختبر بوساطة استهلاكها للسكر ، حيث يبلغ مقدار النيتروجين المثبت من اكثرية الانواع التابعة الى الـ *Azotobacter* من (٥ - ٢٠) ملغم لكل غرام واحد سكر تستهلكه البكتريا ، أما كفاءة بكتريا الـ *Clostridium* فتكون اقل حيث انها تثبت من (٦ - ٨) ملغم نيتروجين لكل غرام واحد . اما انواع الطحالب الخضراء المزرقه التي لها القابلية على تثبيت النيتروجين فتكون كفاءتها من (٣٠ - ١١٥) مايكروغرام نيتروجين لكل ١ سم^٢ من الوسط الغذائي السائل الخاص بالطحالب لمدة ٦٠ يوم مع توفر الضوء الكافي في درجة حرارة بين ٣٠ - ٣٥ °م .

العوامل التي تؤثر في عملية تثبيت النيتروجين بصورة لا تكافلية (بصورة حرة) :

- ١- وجود المركبات النيتروجينية في التربة ، إذ ان وجود كميات كبيرة من املاح الامونيوم والنترات تؤدي الى تثبيط عملية تثبيت النيتروجين حيث ان الاحياء المسؤولة عن التثبيت تفضل الايونات الجاهزة كمصدر للنيتروجين وذلك لسهولة استغلالها والاستفادة منها .
- ٢- وجود السكريات البسيطة في التربة : اذ تعد هذه السكريات مصدراً كاربونياً سهل الاستغلال من الاحياء التي تقوم بعملية تثبيت النيتروجين بصورة حرة ، اضافة الى توفير الطاقة اللازمة لعملية التثبيت نتيجة استهلاك هذه السكريات .
- ٣- وجود بعض العناصر الخاصة في التربة كالمولبدنيوم والحديد ، حيث يدخل هذان العنصران في تركيب جزيئة انزيم النيتروجيناز كما هو موضح سابقاً ولهذا السبب تزداد كفاءة التثبيت .
- ٤- درجة الاس الهيدروجيني (pH) ، ان الوسط الحامضي يقلل من نشاط البكتريا المثبتة للنيتروجين بصورة حرة ، وبصورة عامة تقل اعدادها في pH اقل من (٥) وهناك بعض الحالات الاستثنائية التي لا تتأثر بدرجة الحموضة

مثل الاجناس : *Clostridium* , *Beijerinckia*

٥ - درجة الحرارة : إن الدرجة الحرارية المثل - بصورة عامة - لعملية تثبيت النيتروجين بصورة حرة تقع بين ٢٠ و ٣٠° م حيث ان نشاط البكتريا المسؤولة تقل في درجات الحرارة العالية والواطة على حد سواء .

٦ - الرطوبة والتهوية : ان الرطوبة المناسبة لعملية التثبيت هي الرطوبة الواقعة بين ٦٠ - ٦٥ ٪ من القابلية التشبعة للتربة حيث ان الجفاف غير ملائم لعملية التثبيت . كذلك تكون الرطوبة الزائدة وخصوصاً في التربة الغدقة حيث تتوفر ظروف لاهوائية غير ملائمة لعملية التثبيت ما عدا بعض البكتريا اللاهوائية اختيائراً مثل بكتريا *Clostridium* وهي في الغالب اقل من البكتريا الهوائية التي لها القدرة على تثبيت النيتروجين بصورة حرة .

٧ - وجود بعض الفاجات المتخصصة في اصابة الانواع التي تقوم بعملية التثبيت في التربة . فكلما كانت اعدادها كبيرة في التربة فهناك احتمال شل حركة ونشاط تلك البكتريا مما يقلل من كفاءة تثبيت النيتروجين .

تثبيت النيتروجين بصورة تكافلية : *Symbiotic Nitrogen Fixation*

هناك مجموعة من الاحياء تعيش تكافلياً مع بعض النباتات ولا تتمكن من تثبيت النيتروجين الا عند وجودها في النبات . وفي هذه الحالة تستفيد الاحياء المجهرية والنباتات من النيتروجين المثبت ويطلق على هذه العملية تسمية التثبيت التكافلي للنيتروجين . والتكافل لغوياً يعرف « بالعيش معاً » *Living together* وقدماً كانت تطبق على العلاقات التطفلية اما حالياً فتستعمل لوصف العلاقات ذات المنفعة المتبادلة . والتي نحن في صددنا .

ان اهم الاجناس التي تثبت النيتروجين بصورة تكافلية هو جنس الرايزوبيوم *Rhizobium* . تنتمي هذه البكتريا الى عائلة *Rhizobiaceae* ولها القدرة على تكوين عقد جذرية على جذور النباتات البقلية شكل (١٦) . وهي عبارة عن خلايا عسوية هوائية سالبة لصبغة كرام ، متحركة ولا تكون سبورات . تستخدم بكتريا الرايزوبيوم مصادر كاربون عضوية مختلفة مثل المانيتول والكلوكوز ومصدراً نيتروجينياً كالامونيا والنترات . اما في حالة خلو الوسط من اي مصدر نيتروجيني



شكل (١٦) يوضح المقعد على جذور نبات البازلاء المتكونة بواسطة بكتريا الـ

Rhizobium leguminosarum

فانها تستخدم النيتروجين الجوي . ويستخدم وسط ، **Manitol yeast Extract Agar** لعزل بكتريا الرايزوبيوم اذ تنمو على شكل مستعمرات شفافة مخاطية يتحول لونها بالتدريج الى اللون الابيض .

بكتريا العقد في التربة :

عندما تتحلل العقد الجذرية تتحرر البكتريا الى التربة وعند غياب العائل النباتي المناسب فانها تموت بالتدريج . ولقد وجد العالم Vincent عام ١٩٥٤ ان بكتريا العقد في التربة قد تقاوم في البقاء على الاقل (١٠) سنوات . وليس من الغريب بعد ذلك ان نرى نقصاً كبيراً في عدد بكتريا العقد في الترب التي لم تزرع ابدأ بمحصول بقلبي ، ولكن بوجود العائل النباتي المناسب فان البكتريا تنمو وتزداد اعدادها في منطقة الجذور وتصل الى ١٠ - ٧١٠ خلية لكل غرام تربة . كذلك فان بكتريا العقد الجذرية توجد في منطقة الجذور للنباتات غير البقلية ولكن ليس باعداد كبيرة .

هناك عامل جذب متخصص من جنر العائل وجد من خلال التجارب ولكن لاتوجد مادة معروفة ترجع الى النباتات البقلية بالضبط حتى الآن . فمثلاً البايوتين Biotin (وهو فيتامين يكون في الخميرة والكبد وصفار البيض) تفرزه جذور النباتات البقلية بكميات كبيرة ولكن عملية استهلاك احياء التربة المجهرية هذا الفيتامين غير معروفة . وحالما تكون العقدة الجذرية فلا مجال لعقدة اخرى معقبة على التكوين ، ويحتمل ان يكون هذا بسبب إفراز المواد المشابهة لل gibberellin من قبل الجذر . إفرازات الجذور ربما تؤخذ بالحسبان نظراً للاختلافات بين النباتات التي يكون قسم منها عقداً جذرية بسرعة مع تلك التي تكون عقداً جذرية ببطء . ان هذه الاستجابات تم السيطرة عليها بعوامل وراثية تعمل بوساطة تأثيرها في معدل المواد المشجعة على حدوث الاصابة .


الاحياء الاخرى في التربة بإمكانها ان تؤثر في بكتريا العقد الجذرية فالعالمان Holland و Parker عام ١٩٦٦ اقترحا ان فشل حدوث العقدة في الترب الحديثة لغرب استراليا سببه وقف نشاط بكتريا *Rhizobium* بوساطة المضادات الحيوية الناتجة من الفطريات النامية على وفرة من المواد العضوية المتحللة في الترب المذكورة .

تطور العقد وتركيبها : Development & Structure of the nodules

إصابة جذور البقوليات يحدث عادة خلال الشعيرات الجذرية شكل (١٧) التي تستطيل وتخش وتصبح غير منتظمة . واستطالتها ربما تتحفز بواسطة حامض الـ Indol Acetic Acid (IAA) الذي تحلله بكتريا العقد الجذرية من الترتوفان السابق له وهو الذي تفرزه الجذور غير ان السبب في تشوه الشعيرة الجذرية غير معروف . تحدث الإصابة عادة في نقطة نمو الشعيرة وقد اقترح العالمان Dart و Mercer عام ١٩٦٤ ان البكتريا تلصق نفسها هناك بواسطة الاهذاب .


ان بناء التركيب الخلوي لبكتريا العقد ربما يكون في المادة اللزجة او في طبقات الشعيرة الجذرية المتجددة وبعد ذلك تحت بقية التغييرات . ولقد اقترح العالمان Fahraeus و Ljunggren عام ١٩٥٩ أن البكتريا والنبات معاً ينتجان انزيم الـ polygalacturonase الذي يضعف بصورة رئيسة الجدار البكتيني في منطقة النمو للشعيرة الجذرية . كما انهما اقترحا ايضاً أن تكون الانزيم يحث او يحفز من متعدد السكريات polysaccharides الذي تنتجه البكتريا ، ونظراً لاختلاف متعدد السكريات فإن الاختلافات بين بكتريا العقد الجذرية تصنف على هذا الاساس ، ومن الممكن ان يكون هذا التعليل دليلاً او قاعدة لتنوعية العلاقات المتداخلة بين البكتريا والنبات . على اية حال فالعالمان Lillich و Elkan عام ١٩٦٨ وجدوا ان معدل فعالية انزيم الـ polygalacturonase في الرواشح المستخلصة من الجذور الملقحة ببكتريا العقد الجذرية لم تكن ذات معنوية تفوق تلك الرواشح المستخلصة من جذور النباتات غير الملقحة . بعض التداخلات المقترحة بين البكتريا وجذور النبات العائل قبل الإصابة قد بينها العالم Nutman عام ١٩٦٥ كما في الشكل (١٨) .

ان ضعف جدار الخلية النباتية يؤدي الى تكوين خيط الإصابة Infection thread ولكن ميكانيكية انتاج هذا الخيط غير واضحة . العالمان Dart و Mercer عام ١٩٦٤ افترضوا ان الشبكة الليفية لجدار الشعيرة الجذرية ذات حرية او عدم ثبات كافٍ لان تسمح بمرور بكتريا العقد الجذرية وهذه الفرضية ربما تؤيد كون خيط الإصابة مصنوعاً من الشعيرة الجذرية كوسيلة دفاع ضد بكتريا العقد أكثر من كونه استمراراً طبيعياً لنمو الشعيرة الجذرية . اما العالم Nutman عام ١٩٥٦ فقد اقترح ان اتجاه نمو الشعيرة الجذرية قد يكون عكسياً بعد الإصابة مما يسبب ما يشبه الغمد



شكل (٧) : خطوات تكوين العقد الجذرية في البقوليات المعانة ببكتريا العقد الجذرية
Rhizobium.

او انبعاج الجدار . وبالتأكيد فإن خيط الإصابة يمكن ان يشاهد داخل الشعيرة
الجنزية متحداً مع الجدار الخلوي ، ويمكن أيضاً ان يشاهد بأنه مصنوع من
مكونات الجدار الخلوي للنبات .




شكل (١٨) التداخلات المحتملة بين بكتريا العقد الجذرية *Rhizobium* وبين جذور النباتات
البقولية قبل الإصابة (عن كروي ووليام ١٩٧٩) .

خيط الإصابة ينمو خلال الشعيرة الجذرية عموماً باتجاه النواة التي تظهر زيادة في فعاليتها في هذا الوقت حتى تصل الى حدود الخلية (شكل ١٩) . ومن هنا الموقع الجديد يتحفز تكوين خيط اصابة جديد يمر الى الخلية التالية وهذا الخيط يستمر حتى يصل الى لحاء الجذر . في منطقة اللحاء Cortex تكون الخلايا التي هي ضعف المحتوى الطبيعي من الكروموسومات Tetraploid (رباعية المجموعة الكروموسومية) وهي عادة ما تتحدد او تشترك مع المناطق المكونة للطبقات الخارجية للجذر هي التي تصاب بالبكتريا . بعد ذلك ينفجر خيط الإصابة وتتحلل بكتريا الرايزوبيوم الى سايتوبلازم الخلية ، وهذه الخلية والخلايا المجاورة لها تنقسم بعد ذلك باستمرار حتى تكون العقدة الناضجة . وعندما تكون الخلية الجذرية طبيعية وثنائية المجموعة الكروموسومية Diploid فإنها ستتضرر بالإصابة ثم تلاشى ولا تكون عقداً . الخلايا المصابة تكون منتفخة وتحتوي على خضاب الهيموكلوبين في حين تتفرق الخلايا غير المصابة الى المنطقة اللحاءية والانسجة المرستيمية (نسيج جنيني مؤلف من خلايا قادرة على الانقسام غير المحدود) والانسجة الوعائية . ان حوالي ٥ ٪ من اصابة البقليات بالبكتريا المتخصصة تؤدي في النهاية الى تكوين العقد .

ان بكتريا العقد بعد وصولها الى اللحاء عن طريق خيط الإصابة تتكاثر بصورة سريعة داخل خلايا اللحاء ، كما ان الخلايا النباتية المصابة يزداد حجمها بصورة غير اعتيادية وتعرف هذه الحالة بـ hypertrophy ويزداد عددها بصورة غير اعتيادية ايضاً وتعرف هذه الحالة بـ hyperplasia .

بعد ان تتحرر بكتريا العقد الجذرية من خيط الإصابة تتكاثر بسرعة وتصبح منتفخة وغير منتظمة الشكل مكونة البكتريود «Bacterioids» . والبكتريود عبارة عن خلايا غير منتظمة الشكل ، ومن المحتمل ان يكون ذلك لافتقارها على الاغلب الى مكونات الجدار الخلوي الطبيعية ومحاطة فقط بغشاء سايتوبلازمي وتكون اشكالها في الغالب متفرعة او ملتوية او نجمية الشكل . تكون البكتريود اما متراسة بشكل انفرادي او مرزومة بشكل ثنائي او رباعي داخل طبقات اغشية خلايا العائل . ان تثبيت النيتروجين يتم في هذه المرحلة في المناطق التي تكون فيها اغشية البكتريود وخلايا النبات قريبة من بعضها . البكتريود للسلاسل الفعالة التي تستطيع تثبيت النيتروجين تختلف عن تلك السلاسل غير الفعالة التي ليس لها القدرة على تثبيت النيتروجين . ففي الحالة الاولى (السلاسل الفعالة) فإن المساحة




شكل (١٩) خيط الإصابة (Infection thread) المتكون بواسطة بكتريا *Rhizobium trifolii* داخل شعيرة جذرية لنبات البرسيم الابيض .

! نوية تستطيل وتنقسم وتصبح محاطة بمنطقة نووية واضحة ، وخارج هذه المنطقة تكون منطقة الساييتوبلازم بشكل جيبي وتحتوي على جزيئات تشترك في تفاعلات الاكسدة والاختزال . اما في السلالات غير الفعالة فلا توجد منطقة نووية واضحة بل توجد تجمعات كبيرة من الكلايكوجين *Glycogen* ووجود هذه التجمعات دلالة على زيادة في كمية الكربوهيدرات ونقص في كمية النيتروجين .

ان البكتريود تموت عندما يكبر الجذر وتبقى فقط البكتريا الموجودة في خيط الإصابة حيث تقاوم وتتحضر بعد ذلك الى التربة لتعيد دورة الحياة . ان دورة حياة بكتريا العقد الجذرية تكون اغلبها في التربة فعندما تتحرر البكتريا من العقدة الى التربة يكون شكلها كروياً ثم يتحول بالتدريج الى الشكل العصوي ثم يكون لها سوط واحد طرفي وتعرف بالمحتشدات *Swarmer* ثم تحاط بعدة اسواط وتبدأ باصابة الجنور بعد ان تفقد اسواطها قبل الدخول الى الجذر .

هناك نظريات عديدة حول دور اللكتين **Lectin** في اصابة جذور البقوليات ببكتريا الرايزوبيوم إذ ان اللكتين يفرزه النبات ويدخل حالياً ضمن تصنيف النبات حيث يكون حلقة الوصل لدخول البكتريا داخل الجذر كما موضح في المخطط الآتي . -



ان بعض العلماء يمزون الحالة التخصصية لاصابة بكتريا العقد للنباتات البقلية الى دور اللكتين **Lectin** ونوع متعدد السكريات **polysaccharide** الموجود في البكتريا المتخصصة في اصابة العائل النباتي .

ان العقد الجذرية بعد تكونها اما تكون فعالة وتسمى بالعقد الصادقة او النشطة ، وعادة تكون كبيرة الحجم وذات لون وردي نتيجة احتوائها على بروتين احمر يشبه الهيموكلوبين يطلق عليه تسمية الهيموكلوبين البقلي **Leghaemoglobin** ويكون سطح العقد الفعالة خشناً . اما العقد غير الفعالة فتكون صغيرة الحجم ذات لون باهت وملساء وتسمى ايضاً بالعقد الكاذبة حيث تكون غير نشطة في عملية التثبيت لعدم احتوائها على الهيموكلوبين البقلي .

العوامل التي تؤثر في عملية تثبيت النيتروجين بصورة تكافلية :

- ١ - توفر المركبات النيتروجينية اللاعضوية (المعدنية) في التربة ، كما هي الحال في التثبيت اللاتكافلي فإن توفر كميات كبيرة من املاح الامونيوم والنترات في التربة تؤدي الى تثبيط عملية التثبيت وذلك لان كلاً من البكتريا والنبات يستخدم هذه المركبات مصدراً نيتروجينياً بدل النيتروجين الجوي .
- ٢ - نوع السلالة البكتيرية المثبتة للنيتروجين ، إذ ان نوع السلالة له اهمية اساسية في عملية التثبيت وذلك لوجود سلالات فعالة واخرى غير فعالة في مجال التثبيت وكما اوضحنا سابقاً فإن بعض السلالات اضافة الى عدم كفاءتها قد تتطفل على النبات العائل .
- ٣ - نوع النبات العائل ، ان كمية النيتروجين المثبتة تختلف حسب نوع النبات العائل فهناك مجاميع نباتية بقلية اضافة الى نباتات غير بقلية تكون عقداً جذرية وتكون مركزاً لتثبيت النيتروجين . فمثلاً نبات الجوت يثبت من (١٢٥ - ٣٣٥) كغم نيتروجين لكل هكتار سنوياً يليه بالمرتبة الثانية البرسيم ثم بقية النباتات ، إذ ان النباتات تختلف في كفاءة تثبيتها للنيتروجين .
- ٤ - العوامل التي تؤثر في العائل النباتي ، كما هو معروف فإن النبات العائل يجهز البكتريا المتخصصة في اصابته بمصادر الكربون والطاقة والمواد الضرورية الاخرى للنمو . فإذا تأثر العائل بأي عامل طارئ فذلك يرجع الى ضعف عملية التثبيت اذا كانت تلك العوامل لها مردود سلبي على نمو النبات والعكس صحيح .

وهناك عوامل اخرى مثل درجة الاس الهيدروجيني (pH) ، اذ ان عملية التثبيت بصورة تكافلية تفضل الوسط المتعادل وان انخفاض pH التربة اقل من (O) يجعل عدم تكون العقد الجذرية . وكذلك عملية تثبيت النيتروجين بصورة تكافلية تفضل درجة الحرارة المعتدلة وهي الملائمة ايضاً لتكون العقد الجذرية .

ان وجود الفاجات التي تصيب البكتريا المتخصصة في تكوين العقد على جذور البقوليات وتشل حركتها ونشاطها تؤثر بالتالي في عملية تثبيت النيتروجين وتقلل الاصابة ببكتريا العقد .

وكذلك لاستعمال مبيدات الآفات اهمية كبرى في التأثير في بكتريا العقد وخصوصاً المبيدات الفطرية التي تستعمل بتركيز عالية في الغالب حيث ان التجارب الحديثة اثبتت عدم تكون العقد الجذرية نهائياً عند معاملة الحقول

المزروعة بالبقلّيات بتلك المبيدات . وهناك عوامل عديدة أخرى خارجية تؤثر في تكون العقد الجذرية منها كيميائية ، وفيزيائية وحيوية .

الفصل الثامن

« التحولات الحيوية للفوسفور »

Microbiological Transformations of phosphorus

دورة الفوسفور :


يضاف الفوسفور الى التربة بشكل سماد كيميائي او بصورة اسمدة عضوية متكونة من بقايا النباتات او الحيوانات ويعدُّ ثاني عنصر بعد النتروجين في تغذية النبات والاحياء المجهرية . واهميته تعود الى دوره الفعال في تكوين الطاقة اللازمة خلال العمليات الحيوية للخلية .

لاحياء مجهرية التربة دور كبير في تحولات الفوسفور وهذه التحولات تشمل :

- ١ - اذابة الفوسفور اللاعضوي .
- ٢ - معدنة الفوسفور العضوي .
- ٣ - تحويل الفوسفور اللاعضوي الى كتلة بروتوبلازمية (تمثيل) .
- ٤ - تفاعلات الاكسدة والاختزال . دورة الفوسفور كاملة موضحة بالشكل (٢٠) .

الفوسفور العضوي في النبات :

إن نسبة الفوسفور العضوي في المحاصيل الزراعية تختلف من محصول الى آخر وبصورة عامة تتراوح بين ٠.٥% - ٠.٥% . وهذه الكمية تكون في اشكال عضوية مختلفة منها : الاحماض النووية ، فوسفوليبيدات ، سكريات فوسفاتية ، انزيمات مساعدة ، وخامض الفايتيك *phytic acid* (انوسيتول سداسي الفوسفات) .



شكل (٢٠) دورة الفوسفور

الفوسفور العضوي في الكائنات الدقيقة :

تحتوي الخلايا البكتيرية على نسب مختلفة من المركبات العضوية الفوسفورية ويشكل الحامض النووي (RNA) من ثلث إلى نصف الفوسفور العضوي. وحوالي ربع الفوسفور العضوي يكون على شكل أورثوفوسفات، وسكريات فوسفاتية، وأنزيمات مساعدة وتشكل الفوسفوليبيدات أقل من ١٠% والحامض النووي (DNA) من ٢-١٠%. وكذلك قد تحتوي بعض الأجناس على أنوسيتول (سداسي أو خماسي أو رباعي أو ثلاثي أو ثنائي أو أحادي الفوسفات). تحتوي بعض الفطريات على بولي فوسفات لاعضوية.

الفوسفور العضوي في دبال التربة :

حوالي ١٥ - ٨٥ % من الفوسفور الكلي في التربة يكون على شكل عضوي والنسب الباقية تكون على شكل فوسفات الكالسيوم غير الذائبة في الترب المتعادلة والقاعدية ويكون على شكل فوسفات الحديد أو الألمنيوم غير الذائب في الترب الحامضية جزءاً قليلاً جداً من الفوسفور الكلي يكون جاهزاً للنبات، إن نسبة عالية من فوسفور دبال التربة (من ١٠ - ٨٠ %) تكون بشكل فوسفات الأنوسيتول (بأشكالها الستة) . حوالي ١ - ١٠ % بشكل أحماض نووية . مع وجود كمية قليلة من الفوسفوليبيدات (٠,١ - ٥ %) التي تكون معظمها على شكل فوسفاتيديل كولين وفوسفاتيديل أيثانول أمين . وتكون جميعها مرتبطة بعضها ببعض ومع المركبات العضوية الأخرى لتكون الشكل الطبيعي لدبال التربة . أحياناً يكون هذا الارتباط وثيقاً جداً بحيث يكون من الصعب فصل الفوسفات العضوية بطرق الفصل المعروفة .

دور الأحياء المجهرية في تحولات الفوسفور

١ - اذابة الصخور والمعادن الفوسفاتية :

لقد تم تشخيص عدد كبير من أجناس بكتريا التربة وفطرياتها التي لها القابلية على اذابة الصخور الفوسفاتية غير الذائبة كالفلور أبا تايت أو الكلور أبا تايت أو الهيدروكسي أبا تايت وتركيبها الكيميائي $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2(Cl, F)_2$ وتحرير الفوسفور منها بشكل جاهز للنبات . كذلك تحول مركبات فوسفات الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الحديد أو الألمنيوم غير الذائبة الى الصورة الذائبة .

أعداد البكتريا التي تقوم بهذه العملية تختلف من تربة الى أخرى وقد تتراوح بين ١٠ - ١٠ لكل غرام تربة جافة . الأجناس البكتيرية التي تقوم بهذه العملية تتمثل في *Flavobacterium* ، *Bacillus* ، *Pseudomonas* ، *Mycobacterium* ، *Micrococcus* وأجناس أخرى .

قسم من الأجناس الفطرية يمكنها أن تقوم بهذه العملية أيضاً منها .

Sclerotium ، *Fusarium* ، *Penicillium* ، *Aspergillus*

لقد وجد أن هذه الأجناس يمكنها أن تنمو في التربة أو في وسط غذائي يحوي على أحد الصخور أو المعادن الفوسفاتية السابقة الذكر كمصدر رئيسي للفوسفات . حيث تستعمل قسماً منه لبناء خلاياها والقسم الآخر تطرحه للبيئة الغذائية أو للتربة بشكل فوسفور جاهز للنبات . من الممكن الكشف عن ذلك بتكوين مناطق رقيقة حول المستعمرات النامية في الوسط الغذائي الصلب نتيجة للآذابة .

من الممكن أن تفسر عملية أذابة الصخور والمعادن الفوسفاتية كما يأتي :

١ - تحت الظروف الهوائية تتأكسد الأمونيا أو الكبريت الى حامض النتريك أو الكبريتيك بواسطة أحياء مجهرية التربة .

الحوامض المتكونة اضافة الى حامض الكربونيك بإمكانها اذابة فوسفات الكالسيوم الثلاثية مثلاً الى ثنائية ثم الى فوسفات أحادية الكالسيوم وبالتالي تحرير الفوسفات بشكل جاهز .

٢ - تحت الظروف اللاهوائية تتكون :

أ - أحماض عضوية مثل الفورمك ، والأسيتيك ، واللاكتيك ، والبروبيونيك ، وكلايوكك ، وفيمارك ، وسكسينيك ... الخ وهذه بتورها يمكنها أن تذيب المعادن الفوسفاتية .

ب - اختزال الحديدك الموجود في تركيب فوسفات الحديدك الى حديدوز مع تحرير الفوسفات

ج - اختزال الكبريتات الى كبريتيد الهيدروجين الذي يمكنه أن يتفاعل مع فوسفات الحديدك لتكوين كبريتيد الحديدوز مع تحرير الفوسفات .

النقاط الثلاثة الأخيرة تفسر النمو الجيد لمحصول الرز في الأراضي الغدقة من دون اسمدة فوسفاتية موازنة بنموه بالطريقة الجافة .

٢ - معدنة الفوسفور العضوي :

أ - معدنة الفايتين :


تؤلف فوسفات الأنوسيتول حوالي ٥٠ ٪ من الفوسفات العضوية في التربة . وتعد فوسفات الأنوسيتول السداسية (حامض الفيتيك **phytic acid**) من المكونات المهمة في دبال التربة .

يتحلل الفاييتين (ملح الكالسيوم او المغنيسيوم لحمض الفيتيك) ببطء بواسطة احياء مجهرية التربة بالرغم من وجود اعداد كبيرة من البكتريا والفطريات التي لها القابلية على تكوين انزيم الفايترز وأفرازه وهو الذي يقوم بعملية التحلل . مقاومة الفاييتين للتحلل ربما تفسر بثلاث تفسيرات هي - ثباتية الارتباط بين الأيستر والفوسفات ٢ - قابليته على تكوين معقدات مع الحديد او الألمنيوم أو الكالسيوم أو المغنيسيوم . ٣ - ادمصاص أو أدمصاص الأنزيم الذي يحلله

على سطوح حبيبات الطين أو المادة العضوية . الاحياء المجهرية التي تقوم بتحليل الفاييتين تتمثل في الاجناس الآتية ،

Aspergillus , Penicillium , Rhizopus , Bacillus , Arthrobacter

عملية التحلل تتم على وفق المعادلة الآتية ،




إن أنزيم الفايترز يحلل حامض الفايستيك في عدة خطوات في كل منها يحرر فوسفات واحدة . قسم من الأحياء المجهرية تفرز الانزيم خارج الخلية والقسم الآخر تفرزه داخل الخلية اي بعد امتصاص المركب . قسم من الانزيمات التي تم عزلها من التربة تكون متخصصة لهذا المركب فقط وقسم غير متخصصة اذ يمكن ان تعمل على مركبات عضوية فوسفاتية اخرى .

ب - معدنة الحوامض النووية :


تتكون الوحدة المركبة للحمض النووي من قاعدة نيتروجينية (بيورين أو بيريميدين) مع سكر خماسي (يكون مختزلاً في حالة الـ DNA) مع الفوسفور . ترتبط الوحدات مع بعضها لتكون الشكل النهائي للـ RNA والـ DNA

تتحلل الاحماض النووية في التربة بواسطة الاحياء المجهرية عضوية التغذية اذ تستعمل هذه المركبات مصدراً للكربون والنيتروجين والفوسفور كما تستعمل مصدراً للطاقة . الخطوة الاولى في عملية التحلل هي تكسير الجزيئات الكبيرة الى جزيئات أصغر فأصغر ثم الى الوحدة الواحدة المكونة للحمض النووي وذلك بواسطة إفراز أنزيمات خارجية تسمى رايبونيكلييز (بالنسبة للـ RNA) وديوكسي رايبونيكلييز (بالنسبة للـ DNA) . وبعدها تؤخذ داخل الخلية لتكملة التحلل حيث يتحرر الفوسفات أولاً بشكل H_3PO_4 ثم يتحلل السكر الخماسي الى CO_2 وماء واخيراً تتحلل القواعد النيتروجينية الى يوريا . وتحلل اليوريا بواسطة أنزيم اليوريز الى NH_3 و CO_2 خطوات التحلل موضحة بالشكل الآتي : -




ح - معدنة الفوسفوليبيدات :

نسبة قليلة من الفوسفور العضوي توجد بشكل فوسفوليبيدات (فوسفاتيدات) منها ، الكليسروفوسفاتيد (فوسفاتيد كولين ، فوسفاتيد ايثانول أمين ، و ليسيتين) . الليسيتين يتكون من كليسول مرتبطة بجزيئين من حامض دهني بواسطة رابطة استرية . وحامض الفوسفوريك مرتبط مع الكولين ايضاً بنفس النوع من الرابطة كما في التركيب الآتي ، -



من الممكن ان يستعمل الليسيتين بواسطة البكتريا والفطريات مصدراً للفوسفور والنيتروجين والكاربون والطاقة . حيث تستعمل هذه الكائنات الحية جزءاً من الفوسفور في بناء بروتوبلازم الخلية والزائد يطرح للتربة ليكون جاهزاً للنبات . ومن الممكن ايضاً ان يرتبط الليسيتين ببروتين التربة ليكون معقدات البروتينات الليدية Lipoprotein المقاومة للتحلل .

عند التكلم عن تحليل المركبات الفوسفورية في التربة لابد من الاشارة الى انزيمات الفوسفاتيز التي تحرر حامض الفوسفوريك من معظم هذه المركبات بوجود الماء كما في التفاعل الآتي ، -



هناك نوعان من هذه الانزيمات منها ما يسمى بالفوسفاتيز الحامضية التي يكون عملها في الترب الحامضية فقط ومنها ما يسمى بالفوسفاتيز القاعدية التي تعمل في الترب القاعدية .

هناك علاقة موجبة عالية بين كمية الفوسفور المتعدن وكل من النيتروجين والكاربون المتعدن . وبصورة عامة كمية النيتروجين المتعدنة تكون من ٨ - ١٥ مرة بقدر كمية الفوسفور المتعدنة وكمية الكاربون المتعدنة تكون من ١٠٠ - ٣٠٠ مرة . وكمعدل فإن نسبة الكاربون الى النيتروجين الى الفوسفور المتعدنة تكون بحدود ١٠٠ : ١٠ : ١ وهي نفس النسبة تقريبا موجودة في دبال التربة .

٣ - دورة المعدنة - تمثيل .

ذكر سابقا أن الأحياء المجهرية واحتياجاتها من العناصر الغذائية هي العامل الرئيس المتحكم بدورة المعدنة - تمثيل . هناك دراسات كثيرة قد اجريت لمعرفة نسبة الكاربون الى الفوسفور في اجسام الأحياء المجهرية (C: Pratio) .

كمعدل فان هذه النسبة في مايسيليوم الفطريات تتراوح بين ٥٠ - ١٠٠ : ١ وفي اجسام الخلايا البكتيرية والأكتينومايسيتات تتراوح بين ١٥٠ - ٣٠٠ : ١ . باتباع حسابات بسيطة يمكن تحديد الحدود التقريبية لما تحتويه المخلفات العضوية من فوسفور كحد فاصل بين المعدنة - تمثيل .

مثال :

أضيف مسحوق تبين الحنطة بنسبة ١% الى دونم من التربة وترك ليتحلل في ظروف ملائمة مدة شهرين . ما هو تأثير ذلك في فوسفور التربة اذا علمت ان نسبة الكاربون في مسحوق التبين ٤٠% ونسبة الفوسفور فيه ٠.١% وان ٦٠% من مسحوق التبين قد تحلل خلال هذه المدة . أفرض ان التحلل كله بواسطة الفطريات التي تمثل ٣٥% وان نسبة الكاربون الى الفوسفور فيها ١٠٠ : ١

الحل :

$$\frac{1}{100} \times 500,000 = 5000 \text{ كغم / دونم تبن مضاف .}$$

$$\frac{40}{100} \times 5000 = 2000 \text{ كغم / دونم كاربون مضاف .}$$

$$\frac{0.1}{100} \times 5000 = 5 \text{ كغم / دونم فوسفور مضاف .}$$

$$\frac{60}{100} \times 2000 = 1200 \text{ كغم / دونم كاربون عضوي متحلل}$$

$$\frac{60}{100} \times 5 = 3 \text{ كغم / دونم فوسفور عضوي متحلل}$$

$$\frac{3.5}{100} \times 1200 = 420 \text{ كغم / دونم كاربون ممثل من الفطريات}$$

$$\frac{420}{100} = 4.2 \text{ كغم / دونم فوسفور ممثل للفطريات .}$$

الاستنتاج :

بما ان الفطريات بحاجة الى 4.2 كغم فوسفور والمأخوذ داخل اجسامها فقط 3 كغم . فالتقص 1.2 كغم فوسفور يؤخذ من الفوسفور الجاهز في التربة فالمعملية **immobilization** لفوسفور التربة في الدورة الاولى من التحلل .

في المثال السابق قد حددنا نسبة الكربون الى الفوسفور في اجسام الفطريات بـ 100 : 1 أي نسبة الفوسفور 0.5 % (على فرض انه نسبة الكربون فيها 50 %) . ولكن بالحقيقة ان نسبة الفوسفور تختلف من جنس الى آخر . فقد وجد انه في بيئة غذائية تحوي الكلوكونز كمصدر طاقة وكاربون ان الجنس *Aspergillus* يمثل بحدود 0.24 - 0.40 جزء فوسفور لكل 100 جزء كلوكونز . الجنس *Streptomyces* يمثل بحدود 0.27 - 0.63 . بالنسبة لخليط احياء مجهرية التربة (بكتريا وأكتينومياسيتات وفطريات) وجد انها تمثل 0.16 - 0.36 جزء P لكل 100 جزء كلوكونز متأكسد . اذا

م / 14 علم احياء التربة المجهرية

استعمل السيللوز بدلاً من الكلوكونز فأن خليط أحياء مجهرية التربة تمثل بحدود ٠,٣٥ - ٠,٤٥ جزء P لكل ١٠٠ جزء سيللوز. كمعدل فقد عد الرقم ٠,٣ جزء P في الظروف الهوائية (على شرط ان جميع المادة الغذائية سوف تتأكسد) وطبعاً أقل من ذلك بكثير في الظروف اللاهوائية .

بما انه ليس كل كاربون وفوسفور المخلف العضوي المضاف الى التربة هو جاهز للتحلل (نسبة منه يتحلل ونسبة منه تبقى في التربة من دون تحلل) فقد عد الرقم ٠,٢ % p حداً فاصلاً بين الـ *mineralization* والـ *immobilization* .


يعبر احياناً عن الحد الفاصل بين العمليتين بنسبة الكاربون الى الفوسفور في المخلفات العضوية المضافة وقد اقترح انه اذا كانت هذه النسبة أقل من ٢٠٠ ، فمعناها *mineralization* في المراحل الأولى من التحلل . أكثر من ٣٠٠ ، ١ معناها *immobilization* لفوسفور التربة .

للأعتبارات السابقة الذكر يمكننا القول انه اضافة اسمدة عضوية حاوية على نسبة قليلة من الفوسفور كما في حالة تبين الحنطة في المثال السابق وزراعة محصول معين مباشرة يؤدي حتماً الى ظهور اعراض نقص الفوسفور على النباتات النامية لأن الاحياء المجهرية سوف تأخذ الفوسفور من المادة العضوية وبما انه قليل فسوف تأخذ معه جزءاً من الفوسفور الجاهز في التربة .

٤ - تفاعلات الأكسدة والاختزال :


من الممكن ان يوجد الفوسفور المعدني في التربة بأشكال متكسدة تتراوح بين ٣ - كما في أيون الفوسفين *phosphine* الذي يرمز له بـ PH_3 الى O كما في أيون الأورثوفوسفيت *orthophosphate* الذي يرمز له بـ H_2PO_4

هناك دلائل قاطعة تشير الى الأكسدة الحيوية للأورثوفوسفات *orthophosphate* المضاف الى التربة الى مركب الـ أورثوفوسفيت *orthophosphate* كما في المعادلة الآتية ، -



تتم هذه العملية - بوساطة عدد من الاجناس منها ، *Pseudomonas* ولكن لا يوجد اي *Penicillium* , *Aspergillus* , *Aerobacter* , *Erwinia* دليل يشير الى أن عملية الأكسدة هذه يمكنها ان توفر طاقة لهذه الكائنات الحية .

كذلك ممكن ان يتأكسد الهايوفوسفات HPO_4^{2-} بوساطة الأحياء المجهرية العضوية التغذية الى أورثوفوسفات HPO_4^{2-} هناك ايضاً دلائل تشير الى حدوث عكس العمليات السابقة (اختزال) اذ وجد في الظروف اللاهوائية وبوجود مصدر طاقة كالمانيتول مثلاً يمكن ان يختزل المركب أورثوفوسفات الى فوسفات ثم الى هايوفوسفات كما في المعادلة الآتية ، -



لقد لوحظ ان وجود النترات او الكبريتات في محلول التربة يؤدي الى توقف اختزال الفوسفات وذلك لتفضيل البكتريا. اللاهوائية استعمال الـ NO_3^- أو الـ SO_4^{2-} كمستقبل للإلكترونات على الفوسفات .

ان عملية الاختزال السابقة قد درست بصورة واضحة باستعمال مزارع نقية من البكتريا ' *E. coli* - اللاهوائية الاختيارية واللاهوائية الإجبارية *Clostridium butyricum* ' وهي مشابهة لعملية الـ *denitrification* ومشابهة ايضاً لعملية اختزال الكبريتات الى H_2S . ولكن لاتوجد دلائل قاطعة تشير الى الاختزال الكامل للأورثوفوسفات الى فوسفين (PH_3)


الفصل التاسع

« التحولات الحيوية للمركبات الكبريتية »

Biological Transformations of sulfur compounds

Sulfur cycle : دورة الكبريت

الكبريت مثل النيتروجين والكاربون يمر خلال دورة من التحولات تحدث بوساطة الاحياء المجهرية التي من خلالها تختزل وتؤكسد فيها مختلف المركبات الكبريتية . ان الانتقال او التحول البايولوجي للكبريت يكون مشابهاً في بعض جوانبه للانتقال البايولوجي للنيتروجين . وعند القائنا نظرة على دورة الكبريت شكل (٢١) نلاحظ ذلك التشابه ومن الممكن - مثلاً - ان نلخص اوجه التشابه بما يأتي :-




شكل (٢١) دورة الكبريت


- ان مكانة H_2S تشبه مكانة NH_3 في دورة النيتروجين .
- وان اكسدة H_2S تشبه عملية النترجة في دورة النيتروجين .
- كما ان اختزال الكبريتات SO_4^{2-} يشبه اختزال النترات في دورة النيتروجين .
- واخيرا فان اكثر النباتات تمتص النيتروجين على صورة NO_3^- وكذلك اكثر النباتات تمتص الكبريت على شكل SO_4^{2-} .
- إضافة الى اوجه التشابه اعلاه فهناك بعض من اوجه الاختلاف بين دورة الكبريت ودورة النيتروجين : -

- ان عملية النترجة في دورة النيتروجين تؤدي الى تكون النترت NO_2 قبل تكون النترات ، في حين نجد في دورة الكبريت ان H_2S يتأكسد مباشرة الى الكبريت دون المرور بمركب وسطي .
- كما ان هناك اختلافاً في نوع الاحياء المجهرية التي تؤكسد كل من الامونيا والكبريتيد H_2S . اذ ان الاحياء المجهرية التي تقوم بأكسدة الامونيوم هي من نوع الاحياء ذاتية التغذية ، اما الاحياء التي تقوم بأكسدة الكبريت اللاعضوي فقد تكون ذاتية التغذية او غير ذاتية التغذية .
- هناك بعض التغيرات الكيميائية الحيوية التي يحتمل ان تحصل للمركبات الكبريتية بوساطة الكائنات الدقيقة وتكون كالآتي : -


- أ - ان الكبريت بشكله العنصري (S) لا يمكن ان تمثله النباتات او الحيوانات ، فهناك بكتريا خاصة لها القدرة على اكسدة الكبريت الى السلفات او الكبريتات (SO_4^{2-}) فالنوع البكتيري الخاص بهذا التفاعل هو :
Thiobacillus thiooxidans والتفاعل الذي تحدثه هو كالآتي : -




- ب - ان الكبريتات (SO_4^{2-}) تمثل من النباتات وتدخل في تركيب البروتينات . كما ان تحلل البروتينات (proteolysis) يحرر الاحماض الامينية بوساطة النشاط الانزيمي للعديد من البكتريا غير ذاتية التغذية Heterotrophic bacteria وتحلل بعض الاحماض الامينية السلفاتية كالسستين Cysteine ينتج عنه تكون كبريتيد الهيدروجين وكما يأتي : -



جـ - أما الكبريتات فربما تختزل ثانية الى كبريتيد الهيدروجين H_2S بواسطة الكائنات الحية كما في التفاعل الآتي الذي يحدث بفعل الجنس البكتيري ،
Desulfovibrio



د - كما ان كبريتيد الهيدروجين الناتج من اختزال الكبريتات وتحلل الاحماض الامينية يتأكسد الى الكبريت العنصري (S) اذ يوصف هذا التفاعل بأنه تمثيل ضوئي لبكتريا الكبريت كما موضح في المعادلة الآتية ، -



وكما هو معروف فان الكبريت يعد عنصراً أساسياً ومهماً في عملية نمو النبات ، إذ ان النباتات تحتاج الى عنصر الكبريت لتركيب بعض الحوامض الامينية وبعض الفيتامينات والانزيمات المرافقة Coenzymes وغيرها من المكونات . ويشترك الكبريت والنيتروجين في تركيب البروتينات ، ويوجد الكبريت في التربة بالحالة العضوية واللاعضوية (المعدنية) وفي حالات تأكسدية واختزالية وفي اشكال صلبة وسائلة وغازية ، كما ان وجود الكبريت في التربة من ناحية الكمية يعتمد على عدة عوامل منها المناخ ونوع التربة وعمقها وغيرها .

إن اهم مصادر الكبريت في التربة يرجع الى بقايا النباتات والحيوانات ، والاسمدة الكيماوية ، والامطار وبعض المواد الاصلية Parent material مثل

كبريتات الكالسيوم $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (Gypsum) والبيراييت FeS_2 (Pyrite) . بالنسبة للأمطار كمصدر من مصادر الكبريت ففي بعض المدن الكبيرة مثل طوكيو ولندن فان مقدار الكبريت الراجع للتربة بواسطة الأمطار يكون حوالي (١٠٠) پاون لكل ايكرا .

- وبصورة عامة هناك اربع عمليات مميزة لتحويلات الكبريت وهي :
 - ١ - تحليل المركبات العضوية المحتوية على الكبريت (معدنة الكبريت) .
 - ٢ - التمثيل المايكروبي لمركبات الكبريت .
 - ٣ - اكسدة الايونات اللاعضوية مثل الكبريتيدات والثايوكبريتات والثايونات والكبريت المعدني .
 - ٤ - اختزال الكبريتات والانيونات الاخرى الى كبريتيد .

١) معدنة الكبريت : -

على الرغم من ان النباتات تتمكن من تمثيل العديد من الاحماض الامينية قبل تحليلها ، يمكنها أن تأخذ ثاني اوكسيد الكبريت SO_2 الموجود في الهواء الجوي أيضاً عن طريق الاوراق الا ان الجزء الاساسي بالنسبة لتغذية النباتات يكون في صورة ايونات الكبريتات $\text{SO}_4^{=}$ الذي يمتص عن طريق الجذور . ان ايونات الكبريتات تختزل داخل انسجة النبات الى مجموعة السلفاهيدريل $[-\text{SH}]$. ونظراً لاهمية وجود هذا العنصر بالصورة اللاعضوية (المعدنية) في التربة لغرض تغذية النباتات وامداده بهذا العنصر فان معدنة الكبريت العضوي تعد من التحويلات الميكروبية المهمة في التربة .

هناك العديد من المركبات العضوية التي تحتوي على الكبريت تتحول الى الصور اللاعضوية بفعل احياء التربة المجهرية . حيث يوجد عنصر الكبريت في بروتينات النبات والحيوان والميكروبات على صورة احماض امينية ، كما يوجد في انسجة الحيوان وافرازاته ايضاً على هيئة كبريت حر وتيورين Taurine وصور اخرى .

بعد تحول الكبريت العضوي الموجود في بقايا النباتات والحيوانات بعد اضافتها الى التربة الى الحالة اللاعضوية فان جزءاً من الكبريت المعدني تستخدمه

الميكروبات لغرض التخليق الحيوي والجزء الآخر ينطلق الى التربة . ان الكبريتات تكون الناتج النهائي وفي الظروف الهوائية ، اما في الظروف اللاهوائية فاحتمال تراكم كبريتيد الهيدروجين (H₂S) ومركبات الحديد حيث ان لها رائحة مميزة .

هناك عوامل عديدة تؤثر في معدنة الكبريت اذ تكون المعدنة سريعة عند وجود الاوكسجين وتنخفض في حالة غيابه . كما ان ارتفاع درجات الحرارة الى حد المدى الحراري المتوسط يشجع المعدنة وكذلك اضافة كاربونات الكالسيوم (CaCO₃) (Lime) الى الترب الحامضية يسرع ايضاً من عملية معدنة الكبريت . ان للرطوبة ايضاً تأثيراً في سرعة عملية المعدنة وان أنسب مستوى للرطوبة يكون بين ٢٠ - ٤٥ % .

إن معدل تكون الكبريت اللاعضوي يتأثر بمحتوى المادة المضافة الى التربة من الكبريت وبنسبة الكاربون الى الكبريت C / S ratio كما هي الحال في تحول النيتروجين العضوي . كما ان الكبريتات تتراكم فقط في التربة في حالة وجود الكبريت في المادة العضوية بكميات تفوق حاجة الميكروبات لهذا العنصر ، كما ان معدلات معدنة الكبريت تتأثر بنفس العوامل البيئية التي تؤثر في نمو الميكروبات بصورة عامة .

٢) التمثيل المايكروبي للكبريت : -

هناك العديد من المواد اللاعضوية التي تكون مصدراً من مصادر الكبريت اللازمة لنمو الميكروبات ومن الامثلة على تلك المواد ، الكبريتات (SO₄)⁼ ، والثايوكبريتات (SSO₃)⁼ ، والكبريتيد والكبريت المعدني ، والكبريتيت (SO₃)⁼ والثايونات الرباعية (SSSSO₃)⁼ وغيرها . أما المركبات العضوية فتشمل الـ ، Cystine ، Cysteine ، Methionine والتورين Taurine والبروتينات غير المتحللة .

إن الكبريتات تستخدم باضافتها الى المنابت الغذائية وكما بينا سابقاً أن الكبريتات لا تتكون في الظروف اللاهوائية ، لذا قد تقوم الكائنات اللاهوائية في التربة بتمثيل المركبات المختزلة من الكبريت . إن الكثير من الاحياء غير ذاتية التغذية قد لا تكون لها القدرة على استخدام الكبريتات وحياناً لا تقوم باستخدام صور الكبريت اللاعضوية لهذا السبب يتم تنميتها في منابت غذائية مضافاً اليها احماساً أمينية محتوية على الكبريت مثل السستين Cystine والميثيونين Methionine . وكما هو معروف فان معظم الكائنات الدقيقة تحتوي على نسبة

(٠.١ - ١٪) من الكبريت بالنسبة الى وزنها الجاف وان معظم هذا الكبريت يكون ضمن مكونات الحوامض الامينية المذكورة اعلاه .

إن عملية تمثيل الكبريت من أحياء التربة المجهرية لا تعد من العمليات الشائعة الا في حالة نقص عنصر الكبريت . وعلى سبيل المثال فان اضافة الكاربوهيدرات كالسيلوز الى التربة يحتمل ان يؤدي الى نقص بمستوى الكبريتات نتيجة تمثيل احياء التربة للكبريت اللاعضوي (المعدني) خلال نموها على حساب الكاربوهيدرات ، لذا ستعاني النباتات النامية في الترب المعاملة من نقص الكبريت نتيجة لعملية التمثيل . ان حل هذه المشكلة يكون باضافة الكبريتات الى التربة .


اشرنا فيما سبق الى انه اذا كانت كمية الكبريت في المادة المضافة اقل من احتياجات: النمو للاحياء فان عملية التمثيل تتغلب على عملية المعدنة ، اما اذا زاد محتوى المادة المضافة من هذا العنصر فسوف يؤدي الى سيادة عملية المعدنة على عملية التمثيل . اذا تتراوح النسبة الحرجة من C/S في المركبات العضوية التي تؤدي زيادتها الى سيادة عملية التمثيل على المعدنة بين $1/200$ إلى $1/400$ وهذا يعني ان المركبات المضافة تحتوي على نسبة قليلة من الكبريت وهذه النسبة تكون مشابهة لنسبة الكاربون الى النيتروجين .

٢) اكسدة مركبات الكبريت ١ -


ان الكبريتات والكبريت المعدني والثايوكبريتات يمكن ان تتأكسد في التربة بالوسائل الكيميائية ببطء ولكن عند توفر الظروف الملائمة فانها تتأكسد بواسطة الكائنات الدقيقة بسرعة كبيرة . فعندما تصبح الظروف في التربة مقاومة للظروف المثلى من حيث الرطوبة والحرارة فان التغيرات بفعل العوامل الكيميائية تكون ضئيلة جداً اذا ما قورنت بالمعدلات العالية للتحويلات الميكروبية .

إن ميكروبات التربة التي لها القدرة على اكسدة الكبريت غير العضوي قد تكون ذاتية او غير ذاتية التغذية . فالبكتريا التي تستخدم مثل هذه الجزيئات في انتاج الطاقة معظمها يتبع الجنس ، *Thiobacillus* ، اذ يتضمن هذا الجنس ثمانية انواع الا ان اغلب الدراسات تركزت على خمسة انواع منها وهي كالاتي ١ -


١ - *T. thiooxidans* ، وهو ميكروب ذاتي التغذية يقوم باكسدة الكبريت: المعدني ويكون نموه المفضل في درجة حموضة (٣) أو اقل . والتحول التي تقوم به هذه البكتيريا موضح كما في المعادلة الآتية ،




٢ - *T. thioparus* ، وهو مايكروب ذاتي التغذية ايضاً لكنه حساس لدرجة الحموضة . التحول الذي يقوم به هذا النوع موضح في المعادلات الآتية ، -



٣ - *T. novellus* ، يكون هذا النوع قادراً على استخدام الكبريت العنصري لكنه يقوم ايضاً باكسدة المركبات العضوية اضافة الى املاح الكبريت: اللاعضوي . والتحول الذي يقوم به هذا النوع يمثل بالمعادلة الآتية




٤ - *T. denitrificans* ، وهو النوع الذي له القدرة على النمو بدون الاوكسجين ، اذ يقوم باستخدام النترات كمستقبل للالكترونات في الظروف اللاهوائية . والمعادلة الآتية توضح التحول التي تقوم به هذه البكتيريا ، -



٥ - *T. ferrooxidans* ، يتميز هذا النوع بقدرته على استخدام املاح الحديدوز: او املاح الكبريت مصدراً للطاقة .

ان الحصول على الطاقة بالنسبة لهذا النوع تتم عن طريق عمليات هوائية يتأكسد: فيها الحديدوز (Fe^{++}) الى حديدك (Fe^{+++}) مثال تحول كبريتات الحديدوز الى الحديدك الذي يتحول ايضاً الى هيدروكسيد الحديدك الذي يغلف خلايا هذا الميكروب كما موضح في المعادلات الآتية ، -



كما ان اكسدة البيريت (FeS₂) Pyrite يحتمل ان يتم بطريقة كيميائية او بواسطة بكتيريا T. ferrooxidans .



للتفرقة بين الانواع الخمسة التابعة لجنس Thiobacillus يمكن استخدام رقم الـ pH الامثل للنمو في هذا الغرض . فدرجة الحموضة المثلى لكل من النوع الاول والخامس عادة ما تكون حوالي (٢ - ٣,٥) في حين تفضل الانواع الثلاثة الاخرى الوسط القريب من التعادل أو حتى الوسط المائل قليلاً الى القلوية . وكذلك فان جميع الانواع السابقة هي هوائية ما عدا النوع T. denitrificans الذي يستطيع استخدام النتراة كمستقبل نهائي للالكترونات وعند نمو هذا الميكروب في الظروف اللاهوائية يقوم بتحويل النتراة الى مركبات نيتروجينية غازية ويؤكسد في الوقت نفسه الثايوكبريتات او بعض المركبات الكبريتية الاخرى .

اضافة الى الانوع السابقة فانه يمكن ايضاً عزل سلالات تفضل الحرارة العالية او التراكيز العالية من الاملاح ، كما ان النوع T.perometabolis وهو غير ذاتي التغذية يزداد نموه عندما يقوم باكسدة الثايوكبريتات الى كبريتات .


إن التعرف على وفرة وجود البكتريا الذاتية التغذية الكيميائية المؤكسدة للكبريت يتم عن طريق تلقيح تخفيفات التربة في منابت غذائية معدنية تحتوي على مركبات الكبريت غير العضوية ثم تتبع التغير في درجة الحموضة . وقد أمكن التوصل باستخدام مثل هذه الطريقة الى أن الاراضي المعدنية تحتوي على اعداد من هذه البكتريا اقل من (١٠٠) أو (٢٠٠) خلية في الغرام الواحد . ولكن في بعض الاحيان قد تحتوي التربة على اعداد اكثر من ذلك بكثير وقد تصل الى (١٠,٠٠٠) خلية في الغرام الواحد . أما في الاراضي العضوية ذات الاصل النباتي فان اعدادها عادة تقل عن (٥٠٠) خلية في الغرام الواحد وغالباً لا تتجاوز (٥٠) خلية في الغرام الواحد . لذلك تكون كثافة اعداد هذه الميكروبات قليلة الا اذا اضيفت مركبات الكبريت الى التربة .

هناك ايضا بعض الانواع البكتيرية غير ذاتية التغذية والاكتينومايسيتات والفطريات تقوم باكسدة مركبات الكبريت اللاعضوية وإن هذه الميكروبات لا تحصل على الطاقة من هذه الاكسدة لان هذه التحولات تحدث بصفة عرضية في

المسارات الرئيسية لعمليات التمثيل الغذائي . فتقوم مثلا بعض الانواع التابعة للاجناس *Bacillus* , *Flavobacterium* , *Pseudomonas* , *Arthrobacter* بتحويل الكبريت المعدني او الثايوكبريتات الى كبريتات . في حين تقوم انواع من جنس *Streptomyces* بانتاج الثايوكبريتات من الكبريت المعدني , كما تقوم الفطريات الخيطية والخمائر باكسدة حبيبات الكبريت الناعمة . كذلك تقوم العديد من البكتريا من التي تغذيها غير ذاتية بوجود العناصر الغذائية العضوية بتحويل الثايوكبريتات الى ثايونات رباعية . وكقاعدة عامة فان مثل هذه التفاعلات تكون بطيئة عن مثيلاتها التي تقوم بها بكتريا الكبريت العسوية . وتقوم الفطريات الخيطية بانتاج الكبريتات من بعض المركبات العضوية مثل , السيستين *Cystine* والثايويوريا *thiourea* والميثيونين *methionine* والتبورين *taurine* والانواع النشطة في هذا المجال هي التابعة الى الاجناس *Penicillium* , *Aspergillus* , *Microsporum*

ينتج عن اكسدة حبيبات الكبريت الناعمة تكوين كميات كبيرة من حامض الكبريتيك وبذلك تعد اضافة الكبريت المعدني مكافئة تماماً لاضافة حامض الكبريتيك وذلك بفعل نشاط بكتريا الكبريت العضوية وكما موضح في الشكل (٢٢) . إذ تؤدي اضافة الكميات الكبيرة من الكبريت المعدني الى خفض pH التربة المتعادلة بدرجة كبيرة حيث قد يصل رقم pH التربة الى (٣) او (٢) بعد عدة شهور من الاضافة ويعد ميكروب *T. thiooxidans* هو المسبب الرئيس لذلك , اضافة الى ان بعض الانواع الاخرى تقوم ايضا باكسدة الكبريت الحر مثال : *T. thioparus* و *T. denitrificans* . كما تزيد معدلات التحول عند تقليل حجم حبيبات الكبريت وعند زيادة درجة الحرارة داخل المدى الحراري المتوسط و pH التربة وبعض العوامل الاخرى .

لقد بذل العلماء المختصون جهوداً كبيرة للتوصل الى معرفة كيفية قيام بكتريا الكبريت العضوية بتكوين الكبريتات , الا ان مسارات الاكسدة ما زالت موضع جدل كبير , فمن الممكن ان يكون للميكروبات المختلفة عدة مسارات متباينة تعمل في هذا المجال , كما ان النواتج تتوقف على ظروف التحضين , وان بعض النواتج الوسيطة قد لا تتكون بصورة مباشرة خلال عملية الاكسدة اي يحتمل ان تتفاعل خارج الخلية مع نواتج وسيطة اخرى . وقد يكون لبكتريا الكبريت أهمية كبيرة من الناحية الزراعية من عدة نواح خلافاً لدورها المحتمل في تكوين الكبريتات اللازمة لتغذية النبات .



شكل (٢٢) التغيرات في مستوى الكبريتات ودرجة حموضة التربة المعاملة بمستويين مختلفين من الكبريت العنصري (٠,٢٥ %) و (١ %) . عن الكسندر ١٩٧٧.

فنشاط هذه الميكروبات يعمل على تغيير حموضة التربة مما يؤدي الى تقليل حدة الاصابة بمرض جرب البطاطا أو مرض تعفن البطاطا التي تسببها اكتينومايسيتات حساسة للحموضة وهي : *Streptomyces scabies* المسببة للمرض الاول و *Streptomyces ipomoeae* المسببة للمرض الثاني . إذ ان حدة هذه الامراض تقل عند pH اقل من (٥) تقريباً لذا يمكن التحكم بهذه الامراض وذلك باضافة الكبريت بكميات كافية لغرض احداث التفاعل الى الدرجة اللازمة للوصول الى مستوى الحموضة المحدد لانتشار المرض .


كذلك يستخدم الكبريت في اصلاح الاراضي القلوية بطريقة مشابهة . فعند اضافة الكبريت الحر الى هذه الاراضي ووجود بكتريا الكبريت العضوية فيها فان حامض الكبريتيك المتكون سوف يعمل على معادلة القلوية في التربة ويحولها الى ارض منتجة . كما يمكن ان يكون تآكل المباني الخرسانية ناشئاً عن نشاط بكتريا

الـ *Thiobacillus* فغاز H_2S في الهواء الجوي دائماً ما يكون مصدر الكبريت لهذه الميكروبات التي تعمل على إتلاف الخرسانة .


وهناك بعض التفاعلات المقترحة التي تتكون عن طريقها الكبريتات ، حيث تتضمن هذه التفاعلات ، -

- ١ - تحويل الكبريت المعدني الى كبريتيت يتأكسد بدوره الى كبريتات .
- ٢ - ان بعض الكبريتيت المتكون يتفاعل مع الكبريت المعدني المتبقي ليكون الثايوكبريتات .

٣ - كما ان الثايوكبريتات اما ان تتكسر الى كبريتيت SO_3^- وكبريت او تتحول الى الثايونات الرباعية وهذه يمكن تحويلها حيويًا الى كبريت او كبريتيت إذ يتأكسد كل منها الى كبريتات . وتلك المسارات المقترحة موضحة كالآتي ، -



وخلال عمليات الأكسدة فان الطاقة المتحررة تكون كالآتي ، -



إن أكسدة الكبريت تسبب في اذابة معادن التربة ، فيتفاعل حامض الكبريتيك المتكون مع هذه المعادن والمواد الأخرى غير النائية مما يعمل على توفير العناصر

الغذائية . وبذلك تزيد الاكسدة من كميات الصور الذائبة من الفوسفات والبوتاسيوم والمنغنيز والالمنيوم والمغنيسيوم . وعندما يراد معالجة نقص المنغنيز مثلاً تعامل التربة بالكبريت او الثايوكبريتات التي تؤدي الى زيادة تركيز ايونات المنغنيز ثنائية التكافؤ . كما بإمكان بعض الانواع البكتيرية التابعة للجنس ، *Thiobacillus* (خصوصاً *T. thiooxidans* أو *T. ferrooxidans* أن تشارك في اكسدة كبريتيدات النحاس والزنك والرصاص والانتيمون والنيكل والكوبلت والكاميوم . كذلك تتعرض الاراضي المجاورة لمناجم الكبريت للتلوث من وقت لآخر بالمواد الغام التي تنقل من هذه المناجم ، وقد ينخفض pH هذه التربة الى (٤) أو أقل من (٢) وتصبح المناطق خالية من النباتات الراقية وتقل اعداد البكتريا والاكثينومايسيتات ، أما الفطريات فقد تزداد اعدادها .

٤ اختزال مركبات الكبريت اللاعضوية :-


في الظروف اللاهوائية نتيجة الغمر بالماء مثلاً فان مستوى الكبريتيد ، يرتفع وفي الوقت نفسه يقابله نقص في تركيز الكبريتات ، ونتيجة لهذه العمليات فان اعداد البكتريا المختزلة للكبريتات تزداد وقد تتجاوز عدة ملايين في الغرام الواحد من التربة في حين تكون اعدادها تحت الظروف الطبيعية لا تتجاوز (١٠) في الغرام الواحد من التربة .

أن معظم الكبريتيد المتراكم في التربة يكون سببه اختزال الكبريتات ويزداد تراكمه أيضاً ، بزيادة المستوى الرطوبي للتربة وازدحام المواد العضوية وارتفاع درجة الحرارة مع توفر جهد اكسدة واختزال واطيء وهذا ما يحدث في الظروف اللاهوائية .

إن انواع الكائنات المجهرية التي تقوم بعملية اختزال الكبريتات هي التابعة للجنس ، *Desulfovibrio* وهي مايكروبات غير متجربة ولاهوائية اجبارية . ان النوع البكتيري ، *D. desulfuricans* هو الاكثر انتشاراً في التربة ، وينمو هذا النوع في درجات حموضة محدودة إذ لا يمكنه النمو في المنايت الغذائية التي تزيد درجة حموضتها على (٥,٥) .

لهذا السبب فان الكبريتيد لا يتكون بكميات كبيرة في الاراضي الحامضية . هناك جنس آخر له القابلية على اختزال الكبريتات وهو ، *Desulfotomaculum*

الا انه اقل انتشاراً في التربة. بإمكان الجنسین اعلاه استخدام الكبريتات والمركبات الاخرى من الكبريت اللاعضوي مستقبلات للالكترونات لكنها لا تتمكن من استخدام الاوكسجين الجوي أو مركبات الكبريت العضوية لهذا الغرض. تتضمن مصادر الطاقة اللازمة للاختزال (مانح الالكترونات) عدداً من المواد الكربوهيدراتية والاحماض الضوية والكحولات. كما يمكن لبعض العزلات الخاصة بميكروب *D. desulfuricans* استخدام الهيدروجين الجزيئي لاختزال الكبريتات $SO_4^{=}$ والكبريتيت $SO_3^{=}$ والثايوكبريتات $S_2O_3^{=}$ وكما موضح في المعادلات الآتية -



$\text{S}^{=}$ مع اعادة تكوين بعض الكبريتيت SO_3 .
 (ج) انتاج الثايونات الثلاثية O_3SSO^- أولاً ثم تتحول بعد ذلك الى خليط من
 الثايوكبريتات SSO_3^- والكبريتيت $\text{SO}_3^{=}$.
 ويمكننا تلخيص تأثيرات عملية اختزال الكبريتات $\text{SO}_4^{=}$ الى كبريتيد H_2S
 بالنقاط الآتية : -

- ١ - ان التمثيل الغذائي للميكروبات التي تقوم بعملية الاختزال له تأثير سام في
 المحاصيل والاشجار .
- ٢ - ان انتاج H_2S الحر يسبب اضراراً لجذور النباتات وان وجود ايونات الحديدوز
 Fe^{++} تعمل على ترسيب الكبريتيد على هيئة FeS اذ تقلل من تأثيره السام .
- ٢ - باستطاعة الـ H_2S الناتج قتل الديدان الخيطية والفطريات التي تعيش في
 الاراضي المغمورة بالماء .
- ٤ - لعملية اختزال الكبريتات دور بارز في الاراضي الملحية فعند اختزال البكتريا
 للكبريتات ينتج عنه كميات من الكاربونات وهذه بدورها تعمل على ترسيب
 الكالسيوم على صورة CaCO_3 وبذلك تقلل من ملوحة التربة .
- ٥ - يمكن ان تساعد الكبريتيدات على تآكل الخرسانة الكونكريتية او الحجرية
 خصوصاً في الاحواض اللاهوائية المستخدمة في معالجة مياه المجاري .

الفصل العاشر

التحولات الحيوية للحديد

Microbiological Transformations of Iron

للاحياء المجهرية الموجودة في التربة دور مهم في تحولات الحديد وفي معظم الأحيان تعد العامل المحدد لتجهيز هذا العنصر أو عدم تجهيزه للنبات . تشكل هذه التحولات :

- ١- أكسدة الحديدوز الى حديدك .
 - ٢- اختزال الحديدك الى حديدوز .
 - ٣- كثير من الأحياء المجهرية تنتج حوامض معدنية وعضوية مختلفة في التربة وهذه بدورها تعمل على إذابة الحديد المترسب .
 - ٤- وفي الظروف اللاهوائية يحتمل ان تختزل الكبريتات الى H_2S الذي يتحد بالحديد ليكون FeS
 - ٥- الكثير من الأحياء المجهرية تهاجم املاح الحديد العضوية الذائبة فتعمل على ترسيب الحديد من محلول التربة .
 - ٦- تكون الأحماض العضوية في التربة يؤدي الى تكوين معقدات من مركبات الحديد العضوية .
- وفيما يأتي شرح مفصل لبعض هذه التحولات .


١ - أكسدة الحديد Iron oxidation

يتأكسد الحديدوز Fe^{++} الى حديدك Fe^{+++} بوساطة البكتريا *Ferrobacillus ferrooxidans* , *Thiobacillus ferrooxidans* .
تم عملية التأكسد هذه في مدى من الـ pH يتراوح بين ٢ - ٤,٥ .


تحصل البكتريا على الطاقة الناتجة من عملية الأكسدة لتنفيذ منها في تحويل ثاني أكسيد الكربون الى كاربوهيدرات (ذاتية التغذية الكيميائية *chemoautotrophs*) .
ناتج الأكسدة هو ترسيب الحديد بشكل هيدروكسيد الحديدك .

وكما قلنا فان هذه البكتريا تعمل في الظروف الحامضية فقط . أما تفسير وجود ترسبات من هيدروكسيد الحديدك على خلايا بعض الكائنات الحية الموجودة في الترب المتعادلة أو القاعدية فيعتقد أنه ناتج من الأكسدة غير الحيوية للحديد ثم ترسيبه على هذه الخلايا .


ان أكسدة الحديدوز الى حديدك تعني تحويله من الصورة الذائبة الجاهزة للنبات الى الصورة غير الذائبة وغير الجاهزة للنبات فعند اضافة ملح كبريتات الحديدوز الى وسط غذائي معقم ثم تلقيحه بكمية قليلة من التربة وتحضينه تحت ظروف هوائية لفترة من الزمن سوف نلاحظ أن كمية كبيرة من الحديدوز قد تأكسد مقارنة بالكمية القليلة التي ممكن أن تتأكسد كيميائياً في معاملة المقارنة التي تحوي على وسط غذائي مع تربة معقمة . معادلة التأكسد تكون بالصورة الآتية ،



تكون الخلايا البكتيرية كما ذكرنا آنفاً مغلفة بهيدروكسيد الحديدك الذي قد يتكون بعملية حيوية أو كيميائية من كبريتات الحديدك المتكونة في التفاعل السابق . كما هو موضح في المعادلة الآتية ،



وجد أن البايرايت FeS_2 يتأكسد ببطء بعملية كيميائية ولكنه يتأكسد بسرعة بوجود البكتريا *T. ferrooxidans* . تكون عملية التأكسد بطيئة عند التعقيم أو في درجة الصفر مما يؤكد أن العملية أو إحدى خطواتها تتم بواسطة البكتريا وفي معظم الأحيان تكون الخطوة الأولى والثالثة كيميائية أما الخطوة الثانية فهي أنزيمية (حيوية) . المعادلات الآتية توضح ذلك .



بعدها يتحول FeSO_4 الى $\text{Fe}(\text{OH})_3$ على وفق المعادلات السابقة .

٢ - اختزال الحديد Iron reduction

في الظروف الهوائية يكون معظم حديد التربة في أعلى حالة من التأكسد (Fe^{+++}) وقليل جداً في حالة Fe^{++} وعلى العكس من ذلك يحدث عندما تكون التربة غدقة (ظروف لا هوائية) .

العملية حيوية بدرجة كبيرة لأنه قد وجد أنها تتم بصورة بطيئة جداً في التربة الغدقة المعقمة أو في التربة المضاف إليها مواد سامة قاتلة للحياء المجهريّة . وفي هذه العملية تستعمل البكتيريا الحديدية كمستقبل للألكترونات بدلاً من الأوكسجين .

كمية الحديدوز المتكونة تتناسب طردياً مع كمية المادة العضوية المتخمرة . وذلك لأنه جميع البكتيريا التي تقوم بعملية الأختزال هي من نوع heterotrophs . وأعدادها في التربة قد تتراوح بين ١٠ - ١٠ لكل غرام تربة . من ضمنها الاجناس . *Bacillus klebsiella* , *Serratia* , *Pseudomonas* , *Clostridium*


معظم الاجناس التي تعمل على أختزال الحديدية هي نفسها تعمل على أختزال النترات . ويعتقد أن كلا العمليتين تتم بواسطة نفس الأنزيم 'reductase' . وقد ظهر أن وجود النترات والحديد في بئة معينة ملقحة بالبكتيريا يؤدي الى تفضيل البكتيريا النترات على الحديدية لدرجة توقف أختزال الثاني الى حين نفاذ الأول .

ظاهرة التبقع gleying يعتقد أن ظاهرة التبقع لها علاقة بتحولات الحديد في التربة . إذ تظهر مناطق في قطاع التربة ذات لون رمادي أو أزرق مخضر . وتكثر هذه الظاهرة في المناطق الغدقة من التربة أو التي يكون مستوى الماء الأرضي فيها عالياً نوعاً ما .

وهذا اللون يعود الى ترسبات من كبريتيد الحديدوز FeS الناتجة من تفاعل الحديدوز مع كبريتيد الهيدروجين المتكونين من اختزال كل من الحديدية والكبريتات في الظروف اللاهوائية . في احدى التجارب التي صممت لدراسة هذه الظاهرة ثم تحضين تربة طينية مع محلول سكري في الظروف اللاهوائية . كنتيجة لفعل البكتيريا فقد لوحظ أن لون الطين قد تغير من الأحمر الى الرمادي أو الأبيض . كذلك وجد أن هذا الطين يحوي أعداداً كبيرة من البكتيريا المختزلة للحديد قد تصل الى ١٠ لكل غرام تربة وكانت معظمها تابعة للأجناس *Bacillus* و *Pseudomonas*

من الممكن دراسة الترسبات من FeS المتكونة من اتحاد H_2S مع Fe^{++} في المختبر بتلقيح طبق بتري يحوي وسطاً غذائياً يتكون من $Iron\ lactate$ و $SO_4(NH_4)_2$ بكمية قليلة من التربة . بعد التحضين يلاحظ تكون مستعمرات بكتيرية محاطة بحلقة سوداء من FeS .

ان تكون الـ FeS في التربة يعرض الأنايب الحديدية المدفونة الى التآكل مما تسبب خسارة كبيرة تقدر بمئات الملايين سنوياً. الظروف الملائمة لتآكل الأنايب الحديدية هي : حرارة مناسبة ، pH اكثر من 0,0 ، ظروف لاهوائية ، وجود الكبريتات الى جانب الحديد. ويكون التفاعل كما يأتي ،



أختزال الحديد (والمغنيز Mn^{++} -) لا الكبريتات يؤدي الى غسلهما (أي الحديد والمغنيز) الى الأسفل داخل التربة . يسبب ذلك مشكلة كبيرة في الأراضي الملحية المستصلحة حديثاً إذ ان وصول هذين العنصرين الى الأنايب الفخارية المستعملة في البزل التي تتميز بتوفر الظروف الهوائية يؤدي الى تأكسدهما لتكوين ترسبات من الـ Fe_2O_3 الحمراء والـ MnO_2 السوداء . تتم عملية التأكسد بواسطة البكتريا عضوية التغذية وتؤدي الى سد مسامات البزل ان هذه البكتريا معروفة في ترسيب الحديد اما على شكل غلاف يحيط بالخلية أو كابسول أو تراكيب شبيهه بالسيفان . منها الاجناس *Gallionella* (البكتريا التي ترسب الحديد على شكل تراكيب شبيهة بالسيفان) والجنس *Leptothrix* (البكتريا المحاطة بغلاف من هيدروكسيد الحديدك) . قد تصنف هذه الاجناس أحياناً بالنسبة لمصدر الكربون والطاقة ضمن الذاتية الاختيارية .

٣- تحليل مركبات الحديد العضوية :

يكون الحديد مع المركبات العضوية مركبات بسيطة أو معقدة أو مخيلية احياناً . ان هذه المعقدات تكون عرضة للتحلل من احياء التربة المجهرية وبالنسبة ترسب الحديد الداخل في تركيبها على شكل أملاح الحديدك غير الذائبة . اذ وجد عند تلقيح وسط غذائي يحوي على *ferric ammonium citrate* بكمية من التربة ثم ان البكتريا تستعمل السترات مصدراً للكربون والطاقة تاركة الحديد على شكل ترسبات من هيدروكسيد الحديدك .

وبالطريقة نفسها يترسب الحديد الداخل في أملاح مع كل من الـ *oxalate* ، *lactate* ، *acetate* ، والـ *malate* . البكتريا التي تقوم بعملية التحلل تضم الاجناس ، *Bacillus* ، *Pseudomonas* ، *Serratia* ، *Acinetobacter* ، *Corynebacterium* ، *Mycobacterium* ، *Klebsiella* . كذلك تتمكن بعض

الاجناس الفطرية وبعض الأكتينومايستيات متمثلة بالجنس *Nocardia* و *Streptomyces* أن تقوم بهذه العملية .

كذلك قد وجد أن النباتات النامية في محلول معقم يحوي المركبات المخيلية الحاوية في تركيبها على الحديد يكون نموها بطيئاً بسبب بطء جاهزية الحديد اضافة كمية من التربة كلقاح يؤدي الى النمو الجيد . مما يؤكد دور الأحياء المجهرية الموجودة في التربة في تحليل المركبات المخيلية وتحرير الحديد بصورة جاهزة للنبات .

معتقدات الحديد مع المركبات العضوية الداخلة في تركيب دبال التربة هي ايضاً تكون عرضة للتحلل من بعض الاجناس البكتيرية مثل ، *Pedomicrobium* ، *Seliberia* ، *Metallogenium* اضافة الى الاجناس المذكورة انفاً ودليل ذلك هو ترسبات من هيدروكسيد الحديدك التي تغلف خلايا هذه الاجناس الثلاثة .

الفصل الحادي عشر

انحلال المبيدات وتحولاتها

Décomposition and Transformations of Pesticides

المبيدات Pesticides

المبيدات مواد كيميائية قد تكون عضوية او لاعضوية صممت للقضاء على الاحياء التي تهدد الانسان والحيوان والنبات . تشمل ، مبيدات الحشرات insecticides ، ومبيدات الفطريات fungicides ، ومبيدات الادغال herbicides ، ومبيدات للبكتيريا bactericides ، ومبيدات الديدان nematocides .

قسم من المبيدات تضاف مباشرة على سطح التربة ، وقسم منها تحقن تحت السطح وقسم ثالث ترش على سطوح الاوراق لنباتات الادغال وهذه ايضا ببلورها سوف تصل الى التربة بطريقة او باخرى .

ان اهتمام علماء احياء مجهرية التربة راجع الى ان هذه المبيدات قد صممت للقضاء على نوع معين من الكائنات الحية ولكن يحتمل ان تؤثر في الاحياء الاخرى خصوصاً الاحياء الدقيقة الموجودة في التربة التي لها اهمية اقتصادية كبيرة كما لاحظنا سابقاً . اصف الى ذلك ان اغلب المبيدات هي مركبات عضوية يحتمل ان تستعمل مصدراً للكربون والطاقة ثم تحللها بعد ذلك من احياء مجهرية التربة المتخصصة .

انواع المبيدات :

هناك مئات الانواع من المبيدات العضوية واللاعضوية التي تستعمل في الوقت الحاضر معظمها لها تسميات تجارية مختلفة ومن الصعب جداً دراسة جميعها لذلك سنركز على انواع محددة منها

- ١ - مبيدات الفطريات مثل :
 Captan, Metham
 Pentachlorophenol (PCP), Trichlorophenol (TCP), Quinones (Chloranil),
 Pentachloronitrobenzene (PCNB) Tetrachloronitrobenzene (TCNB)
- ٢ - مبيدات الادغال مثل :
 Dalapon, Trichloroacetic acid (TCA)
 2,4,5- Trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5- T) 2,4- dichlorophenoxyacetic
 acid (2,4-D) dicamb, Propanil, 2- methyl 4- Chlorophenoxyacetic.
 acid (MCPA), diuron, Monuron, 2,4- dichlorophenoxybutyric
 acid (2,4- DB) Prophan, 3- chloramben, Simazine, atrazine chloroprophan
- ٣ - مبيدات الحشرات مثل :
 malathion, Parathion, DDT
 Aldrin, chlorthion, dicaphthorn, methylparathion Heptachlor,
 Dinitrophenol

العلاقة بين احياء مجهرية التربة والمبيدات :

١ - التأثيرات السلبية ، هناك ثلاثة عوامل تتحكم بمدى التأثيرات السلبية لاي مبيد هي ، نوعه ، والتركيز المستعمل ومدة بقاء المبيد بحالته السمية Persistance . قسم من المبيدات تؤثر في الاحياء المجهرية الحساسة حتى في حالة استعمالها بتركيز واطئة . من اكثر انواع بكتريا التربة تأثراً هي بكتريا التآزت (Nitrosomonas) التي تؤكد الامونيوم الى نترت و Nitrobacter التي تؤكد النترت الى نترات) . عدم تأكيد الامونيوم بواسطة هذه الاجناس البكتيرية معناه تجمعها بتركيز عالية قد تؤثر في جنود بعض النباتات الحساسة للامونيا كغاز . اضع الى ذلك ان قسماً من النباتات تفضل امتصاص النترات على الامونيوم وقسماً منها لا تمتص الا النترات احياناً .

ومبيدات الادغال والحشرات - بصورة عامة - يكون لها تأثيرات قليلة في احياء مجهرية التربة (عدا الطحالب) موازنة بمبيدات الفطريات والمبخرات التي يكون لها تأثيرات سلبية كبيرة . ويرجع سبب ذلك الى ان الاولى تستعمل بتركيز واطئة اما الثانية فتستعمل بتركيز عالية كذلك اثبت الكثير من التجارب ان المبيدات التي تستعمل بتركيز واطئة لا تؤثر - بصورة عامة - على عملية معدنة النيتروجين العضوي ولا على عملية اختزال النترات الى غاز النيتروجين لكنها قد تؤثر على

البكتريا التي تثبت النيتروجين خصوصاً تلك التي تضاف الى البذور مباشرة . وفي انوقت الحاضر يشتغل الباحثون على ايجاد طفرات وراثية من هذه البكتريا تقاوم تراكيز معينة من المبيدات . اصف الى ذلك انه قد يكون في بعض الاحيان للتراكيز الواطئة تأثير محفز لمسبب المرض لانها قد تقضي على المكافحة الحيوية الطبيعية .

من الممكن دراسة التأثير السمي لاي مبيد في بعض الاجناس البكتيرية الموجودة في التربة باضافة تراكيز مختلفة منه الى بيئة غذائية ملقحة بالبكتريا المراد دراستها ثم تحديد التركيز القاتل . دراسات من هذا النوع تكون مفيدة الى حد ما ولكنها استبعدت جانباً مهماً وهو التربة التي تحوي اجزاءاً معدنية وتراكيب اخرى يمكنها ان تتفاعل مع المبيد وتجعله ضعيفاً او غير سام . كذلك تحوي التربة احياءاً اخرى لالتأثر بالمبيد بل تحوله الى تراكيب اقل سمية (وحياناً اكثر سمية) . لهذه الاسباب اتجه الباحثون الى التربة مباشرة لتقويم التأثيرات السلبية لاي مبيد . اذ تضاف تراكيز مختلفة من المبيد الى عينات من التربة ويدرس مدى تأثير كل تركيز في العمليات الحيوية داخل التربة مثل معدنة الكاربون العضوي ، ومعدنة النيتروجين العضوي ، ونشاط الانزيمات ، واستهلاك الاحياء الدقيقة للوكسجين الخ .

ماذا يحدث للمبيد الذي يصل التربة ؟


ان اي مبيد يضاف الى التربة مباشرة او يصل اليها بعد رشه على سطوح النباتات يتعرض الى عمليات فيزيائية وكيميائية وحيوية . من الناحية الفيزيائية يمكن للمبيد ان يتحرك على سطح التربة بوساطة الرياح او الماء . كذلك ممكن ان يغسل الى اعماق التربة ويصل الى الماء الارضي وبالتالي تتلوث مياه الشرب .

ومن الممكن ان يتطاير المبيد من سطح التربة فيصل الى طبقة الاوزون ويؤدي ذلك الى تأثيرات خطيرة وهي تدمير طبقة الاوزون واحتمالية وصول الاشعة فوق البنفسجية الى اجسامنا . من الناحية الكيميائية ممكن ان يتحلل المبيد كيميائياً بوساطة ضوء الشمس **photochemical decomposition** خصوصاً ذلك القريب من سطح التربة كتحلل الـ 2,4-D والـ atrazine وغيرها . كذلك بإمكان المبيد ان يدمص على سطوح الطين او المادة العضوية (**adsorption**) عن طريق الشحنات الموجبة او السالبة الموجودة في تركيب المبيد مع الشحنات السالبة الموجودة على مواد التربة العضوية او اللاعضوية وبالتالي يصبح المبيد اقل سمية . كذلك يصبح غير جاهز


للتحلل الحيوي مدة معينة من الزمن اذ بعملية التبادل الايوني يمكن ان يتحرر المبيد الى محلول التربة ثانية . الجزء الذي يهنا بصفتنا متخصصون في موضوع احياء مجهرية التربة هو ما يتعرض له المبيد من الناحية الحيوية اي تحلله .

التحلل الحيوي للمبيدات :

من الممكن تقسيم الاحياء المجهرية التي تحلل المبيدات على مجموعتين ، الاولى منها تحلل المبيد من دون استعماله مصدراً للكربون والطاقة الايض المرافق Cometabolism او الاكسدة المرافقة Cooxidation . فمثلاً هناك بكتريا تابعة للجنس *Hydrogenomonas* والـ *Aerobacter* وبالاخص *A. aerogenes* بإمكانها تحليل مبيد الحشرات المقاوم للتحلل (DDT) الى P- chlorophenylacetic acid من دون الافادة منه كمصدر غذائي كما في التحول الآتي ، -




كذلك وجد ان مبيدات الادغال مثل D - 2,4 ، TBA - 2,3,6 ، او T - 2,4,5 يمكن ان تتحول الى dichlorocatechol - 3,5 من دون استعمالها كمصدر للكربون والطاقة كما يأتي :-



وكذلك البكتريا التي تستعمل الفينول او حامض البنزويك مصدراً للكربون والطاقة بإمكانها ان تنمو في وسط غذائي لا يحوي على هذه المواد وإنما يحوي مواد عضوية اخرى مثل المبيدات Chlorophenol او الـ 3-chlorobenzoic acid فتحولها بعملية الـ cometabolism الى مواد غذائية مقاربة لاحتياجاتها ومتطلباتها الغذائية .

المجموعة الثانية من الاحياء المجهرية بإمكانها ان تستعمل المبيدات مصدراً للكربون والطاقة والنيتروجين وأحياناً الكبريت لتحللها بطرق مختلفة منها ،


١ - عملية تحويل المبيد من الحالة السامة الى حالة غير سامة اي ما يسمى بإزالة السمية detoxication كتحول الـ 2,4 - D بوساطة الجنس *Arthrobacter* الى 2,4-dichlorophenol وكما يأتي ،




2,4-D

2,4-dichlorophenol

٢ - التنشيط activation ، يمكن لقسم من الاحياء المجهرية ان تحول مواد معينة غير سامة او قليلة السمية الى مبيد حقيقي سام كتحول مبيد ادغال قليل السمية (2,4-DB) الى 4 الى مبيد ادغال آخر اكثر سمية (2,4 - D) كما يأتي ،




٣ - تحويل مجال السمية ، تقوم بعض الكائنات الدقيقة بتحويل مبيد معين يستعمل ضد نوع معين من الاحياء الى نوع آخر يقتل انواع اخرى تختلف عنها مثل تحويل المبيد الفطري **Pentachlorobenzyl alcohol** الى مبيد ال **Pentachlorobenzoic acid** الذي يقتل النباتات كما يأتي ،




pentachlorobenzyl alcohol pentachlorobenzoic acid

٤ - تعقيد المبيد **Conjugation** ، اي تضاف الى حلقة البنزين الداخلة في تركيب الكثير من المبيدات مجموعة ميثيل او حامض اميني او حامض عضوي او ربطه مع مركبات اخرى لجعله اكثر تعقيداً . في معظم هذه الحالات سوف يتحول المبيد من الحالة السامة الى غير السامة كتحويل مبيد ال **Propanil** في التربة بالطريقة الآتية ،



3,4-dichloroaniline

condensation




٥ - التحلل الحيوي **Biodegradation** : تقوم الاحياء المجهرية من اجناس معينة من البكتريا والفطريات بتحليل المبيدات الى غاز ثاني اوكسيد الكربون والعناصر المعدنية الاصلية المكونة له . وقسم من الكربون المكون للمبيد سوف يستعمل في بناء خلايا جديدة . خطوات التحلل تختلف من مبيد الى آخر . وفيما يأتي امثلة على تحليل بعض المبيدات في التربة :


أ - تحليل مبيدات الأدغال المشتقة من الـ **Phenoxyacetic acid**

قسم من هذه المبيدات تتحلل بسرعة في التربة وقسم منها تبقى مدة طويلة تقاوم التحلل . هناك حوالي ١٦ نوعا من البكتريا المشخصة في قابليتها على تحليل المبيدات المشتقة من الـ **Phenoxyacetic acid** بصورة كاملة . الفطريات المحللة لهذه المركبات قليلة جداً وقد وجد ان الفطر *Aspergillus niger* له القابلية على اضافة مجموعة هيدروكسيل الى الحلقة العطرية فقط . وبصورة عامة قابلية هذه المبيدات على التحلل بوساطة احياء مجهرية التربة تعتمد بدرجة كبيرة على تركيب المبيد نفسه (اضافة الى العوامل المذكورة سابقاً التي تؤثر في الاحياء المجهرية المحللة) . فمثلاً موقع ذرة الكلور على حلقة البنزين في تركيب المبيد له تأثير في مدى مقاومته للتحلل فإذا كانت في وضع **Para** بالنسبة للسلسلة المستقيمة المتصلة بحلقة البنزين تحلل المبيد اسهل مما اذا كانت في وضع **meta** . اصعب هذه المبيدات تحللاً هي التي يكون فيها وضع ذرة الكلور **ortho** بالنسبة للسلسلة المستقيمة . وجود مجموعة ميثيل متصلة بحلقة البنزين تزيد من مقاومة المبيد للتحلل . وفيما يأتي بعض الأمثلة على كيفية تحليل هذه المبيدات في التربة .

١ - تحليل الـ **2,4-D** بواسطة *Achromobacter Sp.*




٢ -- تحليل الـ 2,4 - DB بواسطة *Flavobacterium sp.*




ب - تحليل مبيدات الأدهال المشتقة من اليوريا .

من المعروف انه هناك أجناساً كثيرة من البكتريا والفطريات المتخصصة في تحليل المبيد المشتق من اليوريا (*monuron* و *diuron*) مثل *Bacillus* ، *Penicillium* ، *Xanthomonas* ، *Sarcina* ، *Pseudomonas* ، *Aspergillus*

وأجناساً أخرى . تفصيلات كاملة لعملية التحلل غير معروفة حتى الآن ولكن الخطوة الأولى في التحلل هي إزالة مجاميع الميثيل المتصلة بالنيتروجين كما يأتي :



جـ - تحلل مبيدات الأدغال المشتقة من الـ carbamate : المبيد Propanil يمكن ان يتحلل بسرعة بواسطة أجناس من البكتريات مثل *Achromobacter* و *Arthrobacter* . وفيما يأتي جزء من تحلل هذا المبيد بواسطة احياء مجهرية التربة .




د - تحليل مبيد الفطريات P- nitrobenzolic acid

يتحلل هذا المبيد بواسطة الجنس *Nocardia* على وفق الخطوات الآتية ،


- ١ - إزالة مجموعة الـ NO_2 من حلقة البنزين بشكل امونيا .
- ٢ - اضافة مجاميع هيدروكسيل الى حلقة البنزين بواسطة أنزيم متخصص يسمى *mono-oxygenase* لتكوين مشتقات من مركب الـ *catechol* .

- ٣ - أنشقاق الحلقة بواسطة أنزيمات متخصصة أيضاً تسمى *di-oxygenase* لتكوين مركبات بسيطة تدخل مباشرة في دورة الـ T.C.A.



هـ - تحليل مبيد الحشرات DDT في التربة .


يتمتع بأن الخطوات الأولى في تحليل الـ DDT هي عمليات أختزال تتم تحت الظروف اللاهوائية وحوالي ٧٠ ٪ منه يمكن أن يختزل إلى DDD خلال مدة ٤٨ ساعة بواسطة الأنزيم DDT - reductodehalogenase الذي يمكن أن تفرزه البكتريا *Aerobacter aerogenes* . كذلك يمكن للأجناس *Hydrogenomonas* , *Arthrobacter* أن تحلل المبيد تحت الظروف الهوائية واللاهوائية . فيما يأتي بعض خطوات التحلل :-




يعد ال-DDT من أصعب المبيدات تحللاً في التربة ويمكنه ان يبقى مدة طويلة من دون تحلل . وهذا هو السبب الرئيس الذي أدى بالناس الى التوقف عن استعماله لأنه قد سبب مشاكل كثيرة بسبب مقاومته للتحلل خصوصاً للطيور الداجنة التي تعمل على تجميع المبيد في اجسامها مما يؤدي الى هلاك الكثير منها .

بالنظر لصعوبة تكملة دراسة تحلل جميع الأنواع المختلفة من المبيدات بالتفصيل في كتاب منهجي من هذا النوع سوف نستعرض فيما يأتي التفاعل أو الخطوة الاولى في تحلل أي مبيد من هذه المبيدات وبصورة عامة :


١ - اضافة مجموعة هيدروكسيل (OH) كما لاحظنا سابقاً




٢ - أكسدة مجموعة الأمين الموجودة في تركيب بعض المبيدات .




٣ - أكسدة الكبريت الموجود في تركيب بعض المبيدات




٤ - اضافة ذرة اوكسجين لرابطة مزدوجة . ينتج عن ذلك مركباً يسمى ايبوكسايد المقاوم لفعل الاحياء مدة طويلة






٥ - اضافة مجموعة ميثيل ،




٦ - إزالة مجموعة ميثيل ،




٧ - إزالة ذرة كلو او غيرها من الهالوجينات التي توجد في العديد من المبيدات ،




٨ - إختزال مجموعة النترت ،




٩ - استبدال ذرة الكبريت بالاكسجين ،





١٠ - تحرك الكلور من موقع اتصالها في ذرة الكربون الى اخرى في التركيب الحلقى لبعض المبيدات وعند اضافة مجموعة هيدروكسيل ،



١٢ - تحلل بعض السلاسل الجانبية .



١٣ - التحلل المائي وتكسير الجزيء عند اضافة الماء اذ تتعرض بعض المبيدات لأنواع مختلفة من تفاعلات التحلل المائي .



١٤ - كسر الحلقة اذ ان هذه الحالة ضرورية في الانحلال الحيوي الكامل لمبيدات الحشائش والحشرات اذ تنتج بعد ذلك بعض المركبات التي تستخدم مصدراً للكربون والطاقة في عمليات التخليق الحيوي . وهذه الحالة كما لاحظنا سابقاً - خاصة بالمركبات العطرية *Aromatic compounds* .

بعض الأجناس البكتيرية والفطرية مع المبيدات التي تحللها :

- ١ - *Pseudomonas* ، يمكن ان تحلل كل من ، *Dalapon* , *TCA* ، *diquat* , *Paraquat* , *PCP* , *monuron* , *2, 4-D* ,
- ٢ - *Arthrobacter* ، يمكن أن تحلل كل من ، *2,4- D* , *Dalapon* ، *Propanil* , *2,4,5-T* , *DNOC* , *TCA* ،
- ٣ - *Flavobacterium* ، يمكن ان تحلل ، *Dalapon* , *2,4,5-T* , *2,4-D* ،
- ٤ - *Achromobacter* ، تحلل الـ ، *MCPA* , *2,4,5-T* , *2,4-D* ،
- ٥ - *Nocardia* : *Propanil* , *2,4- D* , *Dalapon* ،
- ٦ - *Bacillus* ، *Dalapon* والـ *monuron* .
- ٧ - *Trichoderma* ، *TCA* والـ *Picloram* .
- ٨ - *Aspergillus* ، *Monuron* ، *2,4-D* , *Dalapon* ،

إعتبارات أخرى في تحلل المبيدات :

١ - ان اضافة مبيد من ممتزجين الى التربة ببعضهما يحتمل أن يؤدي الى قتل بعض النباتات الاقتصادية بدلاً من حمايتها . فقد وجد أن اضافة المبيد *cygon* ضد حشرة المن بعد تبخير التربة بالمبيد بروميد الميثيل *methyl bromide* يكون له تأثير سلبي وذلك لأن بروميد الميثيل يمكن أن يقضي على الكائنات الحية الموجودة في التربة التي تحلل مبيد المن الذي يدخل التربة وبقاء الثاني في التربة يعني امتصاص النباتات المزروعة له وبالتالي يؤدي الى قلة الحاصل .

٢ - معظم المبيدات المستعملة تحوي ذرة أو ذرات من الكلور أو البروم أو أي عنصر آخر في تركيبها . ونتيجة التحلل تتحرر هذه العناصر التي قد يكون قسم منها ساماً للنباتات الحساسة مثل الحمضيات وبعض المحاصيل الخضرية . وفي بعض

الأحيان يتكون غاز الأمونيا الذي من المفروض أن يتأكسد الى نترات ولكن بسبب قتل المبيد لمعظم بكتريا النتريجة يتجمع غاز الأمونيا الذي يكون ساماً لبعض النباتات الحساسة .

٣- يمكن لقسم من المبيدات أن تقضي على فطريات المايكورايزا وبالتالي تقلل من جاهزية الفوسفور والزنك والنحاس التي تأتي عن طريق الفطر الذي يمتد الى أعماق التربة .

وبسبب هذه الاعتبارات أو التأثيرات السلبية للمبيدات ينصح صانعو هذه المواد بعدم زراعة النباتات الاقتصادية (باستثناء حالة مبيدات الرش المباشر على النباتات الخضراء) بعد استعمال المبيد مباشرة وذلك للتخلص من سميته عن طريق التحلل الحيوي أو عن طريق التبخر أو الغسل أو التثبيت من حبيبات التربة العضوية والطين .

الفصل الثاني عشر

« العلاقات المتبادلة بين انواع الكائنات المجهرية في التربة »

ان العلاقات المتبادلة بين مجموعات الكائنات تجعلها في تغير مستمر ويبقى هذا التغير عند مستوى مميز للكائنات الحية الموجودة ويتحكم التوازن الحيوي الناتج عن هذه العلاقات في تكوين ميكروبات هذا الوسط. ان التغير في الظروف البيئية المحيطة تحدث تغييراً مؤقتاً في التوازن الحيوي ولكنه يعود الى حالته الاصلية مع احتمال حدوث تحويل في المجتمع المايكروبي Microbial community حتى يتأقلم مع الظروف الجديدة . ويحدث هذا التبادل لان أغلبية احياء التربة تعيش متقاربة بعضها مع البعض الآخر وخصوصاً في مناطق التربة القريبة من جذور النباتات ، ومن المحصلة الكلية للعلاقات ينشأ ما يعرف بمجتمع النروة ، Climax Community.

المنطقة المحيطة بالجذور والعلاقة بين الكائنات الدقيقة فيها :

ان المنطقة المحيطة بجذور النباتات التي تعرف بالرايزوسفير Rhizosphere هي منطقة التربة التي تحيط بجذور النباتات حيث تتكون الكلمة من مقطعين Rhizo والمقصود بها الجذر و Sphere المقصود به المنطقة المحيطة به او الجسم الكروي . وهناك تعاريف عديدة لهذه المنطقة كلها بمعنى واحد حيث تعرف بانها الوسط البيئي الذي يقع تحت تأثير جذور النباتات وتعرف ايضاً بانها منطقة التربة التي تتغير فيها اعداد الميكروبات كماً ونوعاً بوجود جذور النباتات كذلك يمكن تعريفها بالمنطقة الممتدة للمليمترات القليلة من سطح الجذر التي تتأثر بها اعداد الاحياء المجهرية في التربة بالفعاليات الكيميائية للنبات وهناك تغيير كمي ونوعي بالنسبة للاحياء القريبة من الجذر (R) عن المنطقة البعيدة عنه (S) .

لمعرفة مدى تأثير الجنور في نمو المايكروبات ونشاطها التي تعيش حولها تستعمل نسبة R/S ratio حيث ،
 R = عدد المايكروبات النامية في المنطقة المحيطة بالجنور .
 S = عدد المايكروبات النامية في التربة البعيدة عن الجنور أو ما تعرف بتربة المقارنة Control وكلها تحسب على اساس الوزن الجاف .

إن أول من اقترح اسم هذه المنطقة هو العالم هلتر Hiltner عام ١٩٠٤ وكان يقصد بها التربة القريبة من جذور البقوليات حيث يتحضر فيها نمو البكتريا غير ذاتية التغذية بتأثير المواد النيتروجينية المتحررة من العقد الجذرية nodules ثم شمل المعنى بعد الدراسات المستفيضة جميع جنور النباتات . وقد قسم العالم الكسندر ١٩٧٧ منطقة الرايزوسفير على قسمين : -

- ١ - الرايزوسفير الداخلية Inner Rhizosphere وهي سطوح الجنور .
- ٢ - الرايزوسفير الخارجية Outer Rhizosphere وهي المنطقة المتاخمة لجنور النباتات .

كما عرف ايضا تلك المنطقتين ، سطوح الجنور الخارجية والتربة الملاصقة لها واطلق عليها اسم الرايزوبلين ، Rhizoplane .

إن الزيادة الكبيرة في اعداد الاحياء في منطقة الرايزوسفير يرجع الى افرازات الجنور من السكريات والاحماض الامينية والاملاح المعدنية ومن الخلايا والانسجة الميتة المنسلخة عن الجنور التي تعد مصدراً كبيراً للمادة العضوية التي تتغذى عليها الاحياء الدقيقة المتباعدة التغذية (الاحياء غير الذاتية التغذية) .

- لقد لاحظ الكثير من العلماء زيادة في عمليات التنفس ، والنترجة ، واختزال النترات وتثبيت النيتروجين في منطقة الرايزوسفير عما هو عليه في المناطق الاخرى ، ويعود هذا النشاط لجميع الكائنات الحية في هذه المنطقة التي توفر الغذاء بكميات كبيرة ومصدر الطاقة ، حيث ان توفر عنصر الكربون العضوي يرجع الى توفر المصدر الرئيس له من خلال افرازات الجنور وانسلاخ خلاياها الناتجة عن تغلل الجنور داخل التربة والاغلفة المحيطة بها من الخارج وهي عبارة عن مواد جلاتينية شفافه . وقد بين العالم Rovira ١٩٦٥ بعض مكونات تلك الافرازات الناتجة من الجنور ، جدول (١٤) .

جدول (١٤) بعض مكونات افرازات الجذور كمصدر للكربون العضوي للكائنات الحية الدقيقة (عن روفيرا ١٩٦٥) .

مكوناتها	افرازات الجذور
Glucose , Fructose , Sucrose , Xylose , Maltose , Rhamnose , Arabinose , Raffinose.	الكاربوهيدرات Carbohydrates
Lentic , Isoleucin , Valine , Amino butyric acid , Glutamine, Glutamic acid , Cystine , Cysteine , Glycine , Lysine.	احماض امينية Amino Acids
Oxalic , Citric , Malic , Acetic , Propionic , Butyric , Valeric , Suc sinic , Fumaric.	احماض عضوية Organic Acids
Phosphatase , Invertase, Amylase , Protease.	انزيمات Ehzymes
Biotin , Thlamin , Cholin, Inositol , Auxine , P- amino- benzoic acid.	مركبات اخرى Other Compounds

الكائنات المجهرية بمنطقة الجذر :

كما قلنا سابقاً بان المجموع الجذري يرتبط بالوسط الحيوي اضافة الى المواد العضوية والمعدنية ومنطقة الرايزوسفير هي الوسط البيئي الذي يقع تحت تأثير جذور النباتات ، حيث ان النبات يهيئ وسطاً فريداً من نوعه للكائنات المجهرية والنبات بدوره يتأثر بدرجة واضحة بوساطة مجموعة من الميكروبات .

وتتميز هذه الكائنات الدقيقة بالاختلاف في خواصها عن غيرها من كائنات التربة .

لقد اظهرت الدراسات الميكروسكوبية وجود مجتمع كثيف من الميكروبات يحيط بالجنور وعلى اسطح انسجتها الخارجية وشعيراتها الجذرية . وتنتشر الخلايا البكتيرية على وجه الخصوص على صورة سلاسل او تجمعات في حين توجد الفطريات والاكثينومايسيتات بدرجة اقل . وتوجد الابدائيات (البروتوزوا) خاصة السوطيات والهدديات الكبيرة الحجم منها بدرجة ملحوظة في الاغشية المائية الموجودة على سطح الجنور وعلى انسجة البشرة .

إن اكثر الانواع البكتيرية استجابة الى تأثير الجنور هي العصويات القصيرة السالبة لصبغة جرام في حين تقل اعداد كل من العصويات القصيرة الموجبة لصبغة جرام والكروية والمتجرمة مثال الجنس : *Bacillus* . اما الاجناس الشائعة في منطقة الرايزوسفير فهي : *Alcaligenes* و *Flavobacterium* و *Agrobacterium* و احيانا الاجناس :

Pseudomonas , *Corynebacterium*, *Arthrobacter*, *Micrococcus*,
Mycobacterium, *Rhizobium*, *Serratia*, *Xanthomonas*.

وهناك تنافس شديد بين الميكروبات في منطقة الرايزوسفير وذلك للكثافة العددية الموجودة فيها . وتعتمد بكتريا النشرة من اهم مجاميع البكتريا الفسيولوجية التي تستجيب بدرجة واضحة لوجود جنور النباتات الحية وقد لوحظ ارتفاع شديد في نسبة R/S الخاصة بهذه الميكروبات التي تصل الى العديد من المئات في بعض الاحيان وسوف توضح هذه العلاقة لاحقا . كذلك تشجع افرازات الجنور بدرجة واضحة انبات الاطوار الساكنة للعديد من الفطريات مثل : *Fusarium* و *Sclerotium* حيث تبقى الاطوار مثلاً في بعض الانواع التابعة للجنس الاخير ساكنة عدة سنين وخصوصاً الاجسام الحجرية للفطر : *Sclerotium cepivorum*

هناك علاقات مهمة بين الكائنات الحية في هذه المنطقة من جهة وبين الكائنات الحية وجنور النباتات من جهة اخرى اذ يمكن ان يحدث الاتي في المنطقة القريبة من جنور النباتات ، -

١ - يحدث تعايش الفطريات مع جذور بعض النباتات وخاصة اشجار الغابات ، اذ يوجد أكثر من (٧٠) نوعاً من الفطريات تكون المايكورايزا *my corrhizas*. ان بعض العلماء لا يعد فطريات المايكورايزا من فطريات التربة لأنها لا تنمو بصورة صحيحة في المناابت الصناعية على عكس نموها بصورة تعايشية مع الجذر .

٢ - يحدث ايضاً في المنطقة المحيطة بالجذور (الرايزوسفير) تعايش بكتريا العقد الجذرية *Rhizobium* وجذور النباتات البقلية ، إذ يستفيد كل منهما من الآخر فالبكتريا تجهز النباتات بالنيتروجين بعد تثبيته حيويّاً والنباتات تجهز البكتريا بالكاربوهيدرات لبناء خلاياها .

٣ - يحدث ايضاً تعايش بعض انواع الطحالب مع الفطريات بما يدعى بالاشنات حيث ان هناك ايضاً علاقة تكافلية ذات منفعة متبادلة للكائنين .

٤ - كما قد يحدث ان بعض انواع الفطريات تسبب تعفن الجذور ، فالنمو الهائل للبكتريا يستعمر الاجناس الفطرية المسببة للأمراض ويقلل من الاصابة وهذا يدخل ضمن المقاومة الحيوية التي قد تحدث في منطقة الرايزوسفير .

هناك عوامل تؤثر في طبيعة منطقة الرايزوسفير والاحياء الموجودة على سطوح الجذور منها ، نوع النبات والجذر وعمر النبات ونوع التربة والوسط والتدخلات المحتملة بين تلك العوامل .

إن مساهمة النبات في هذه المنطقة تتلخص بالامداد بالغذاء والانسجة المتحللة كمصادر للطاقة والكاربون والنيتروجين ، واستهلاك المواد المعدنية من قبل النبات يخفف تركيزها على الاحياء الموجودة في منطقة الرايزوسفير ، كما أن CO_2 الناتج من تنفس الجذور وتكوين حامض الكاربونيك H_2CO_3 في التربة يسهل اذابة المواد المعدنية ، وأخيراً فإن النباتات تساهم في تحسين تركيب التربة *structure* Soil التي تشجع عملية الأكسدة الحيوية .

ان طرق تقدير تأثير منطقة الرايزوسفير في الاحياء المجهرية للتربة يمكن ان تتم باحدى الطرق الآتية -

١ - طريقة العد بالاطباق Plate Count

٢ - طريقة العد المباشر بوساطة الميكروسكوب

direct count - microscope-

٣ - قياس الفعالية التنفسية (تقدير تحرر CO_2)

Respiratory measurements (CO_2 - Production)

وكما بينا سابقا فان هناك تنافساً شديداً بين ميكروبات منطقة الرايزوسفير

وذلك لكثافة عددها ، إذ تعد بكتريا النشدة *Ammonifier bacteria* من اهم مجاميع البكتريا الفسيولوجية التي تستجيب بدرجة واضحة لوجود جذور النباتات الحية وكما يلاحظ من الجدول (١٥) ، كذلك تشجع افرازات الجذور بدرجة واضحة انبات الاطوار الساكنة للعديد من الفطريات مثل الفطر ، *Fusarium*

جدول (١٥) يبين عدد الاحياء المجهرية في منطقة الرايزوسفير لتربة مزروعة واخرى غير مزروعة (عن كري ووليام ١٩٧٩) .

نوع الاحياء المجهرية	تربة الرايزوسفير (R)	تربة المقارنة (S)	النسبة التقريبية الى R / S	نوع العلاقة
البكتريا	10×1200	10×35	٢٣ ، ١	معنوية على ١ %
الاكتينومايسيتات	10×46	10×7	٧ ، ١	معنوية على ١ %
الفطريات	10×12	10×1	١٢ : ١	معنوية على ١ %
البروتوزوا	10×21	10×10	٢ ، ١	معنوية على ١ %
الطحالب	10×5	10×27	٠,٢ ، ١	معنوية على ٥ %
بكتريا النشدة	10×500	10×4	١٢٥ ، ١	معنوية على ١ %
البكتريا المكونة للسبورات	10×930	10×575	١ ، ١	غير معنوية

العلاقات بين الكائنات الحية بصورة عامة :

إن العلاقات المتبادلة بين الأنواع بصورة عامة تكون ضمن الاشكال الآتية :-

- ١ - الحياد ، **Neutralism** - حيث يسلك كل نوع مسلكاً مستقلاً عن النوع الآخر مختلفاً عنه تماماً وبدون أي تأثير .
- ٢ - التكافل ، **Symbiosis** - حيث يعتمد كلا النوعين المتكافلين على الآخر وكلاهما يفيد من هذه العلاقة .
- ٣ - التعاون الأولي ، **proto cooperation** - وهو عبارة عن علاقة تبادل منفعة بين نوعين من الكائنات الدقيقة وأن هذا التعاون لا يعد ضرورياً لبقائهما أو لحدائهما بعض التفاعلات .
- ٤ - المنفعة من جهة واحدة ، **Commensalism** - تكون الافادة هنا من جهة واحدة حيث يفيد أحد النوعين من الآخر في حين لا يتأثر النوع الآخر .
- ٥ - التنافس ، **Competition** - وهي الحالة التي ينشأ عنها وقف لنمو أحد النوعين اذ يكافحان في الحصول على احتياجاتهما من المواد الغذائية المحدودة كالأكسجين أو غيره من الاحتياجات الأخرى .
- ٦ - التضاد ، **(Amensalism) Antagonism** - في هذه الحالة يوقف أحد نوعي الميكروبات نمو النوع الثاني نتيجة لانتاج التوكسينات أو أية مادة أخرى ممانعة للنمو .
- ٧ - التطفل والافتراس ، **Parasitism & Preation** - كلا الحالتين عبارة عن مهاجمة أحد الأنواع النوع الآخر بصورة مباشرة .

مما تقدم يمكن ملاحظة النقاط الثلاث الآتية في هذا المجال :-
أ - في العلاقات القريبة للأنواع فإنه لا يمكن عدم تأثير العائل وباختصار فإن تمييز المنفعة من جهة واحدة **Commensalism** ذا معنى محدود اذا ما قرن بمعناه في الحالة النسبية .

ب - ان الحد الفاصل بين التعايش والتطفل قد لا يكون واضحاً دائماً فالبايولوجيون يستعملون تعبير التعايش **Symbiosis** بمعناه الاصلي (العيش معاً) ، **Living together** وبعد ذلك تتوالى التقسيمات . حيث يمكن تقسيم علاقات التعايش الى التعايش المتبادل **Immortalis symbiosis** ومعناه التعايش بصفة مطلقة ، وهناك التعايش المتطفل ، **Parasitic symbiosis**

ومعناه التطفل بصورة مطلقة ايضاً . كذلك يمكن تقسيم التعايش الى التعايش الداخلي *Endo symbiosis* الذي يعيش فيه الكائن الحي الدقيق مع خلايا وأنسجة العائل وهناك التعايش الخارجي ، *Ectosymbiosis* الذي تعيش فيه الافراد المتعايشة بصورة منفصلة عن بعضها .

ان هذا التقسيم الجائر وهذه الميول المختلفة في التقسيم قد تعطي فكرة خاطئة عن العلاقات البيئية في الطبيعة نتيجة لتشعب التقسيمات وتعددتها عن تلك العلاقات .

ج - في حالة العلاقات بين الانواع يجب التأكيد على ان الفوائد التي يحصل عليها الكائن الحي نتيجة علاقته مع العائل معبرة للحالة الجماعية وليست الحالة الفردية التي لا تمثل حالة العلاقة بشكلها العام .

تعد التربة مزرعة متجانسة لمجموعات وانواع مختلفة من الميكروبات تنمو وتتكاثر في نفس البيئة مختلطة ببعضها لئلا تتأثر فعاليات هذه الاحياء بعضها ببعض وكل نوع او مجموعة معينة من هذه الاحياء لا تكون اعدادها ثابتة دائماً بل تكون معرضة للتغيير المستمر حسب تأثر كل نوع بظروف البيئة التي ذكرت سابقاً من جهة وبنوعية العلاقات الموجودة بين انواع احياء التربة من جهة اخرى .

ان علاقات التضاد والتعاون بصورة خاصة تسيطران الى حد بعيد على التوازن البايولوجي في التربة ، كما يمكن تصنيف العلاقات بين الانواع المختلفة في التربة حسب ذلك الى :-

١ - علاقات المشاركة المفيدة :-

توجد في التربة ثلاثة انواع من العلاقات وهي التكافل والتعاون الاولي والمنفعة من جهة واحدة ، ان وجود الميكروبات في حيز محدود وبكثافة عديدة كبيرة يدفع تلك الميكروبات للقيام بايجاد علاقات يكون بعضها مفيداً وبعضها ضاراً . ان اغلب العلاقات وجوداً في التربة هي المنفعة من جهة واحدة ، اما العلاقات المفيدة المتبادلة فتوجد بصورة قليلة نسبياً .

أ - علاقات المنفعة من جهة واحدة .

من اهم انواع العلاقات المفيدة هي استخدام بعض انواع الكائنات الحية لنواتج تحلل المواد الغذائية المستخدمة من انواع اخرى تستطيع استخدام تلك المواد مباشرة .

ينتشر مثل هذا النوع من العلاقات غالباً في الطبيعة ويعتبر الطريق الاساسي الذي تتحول به بعض السكريات المعقدة الى مواد غذائية تستفيد منها الكائنات الحية الدقيقة الاخرى غير المتخصصة في مهاجمة مثل هذه المواد الكربوهيدراتية المعقدة .

مثال ذلك انتاج الفطر المحلل للسليولوز لبعض الاحماض العضوية التي تستخدم مصادر كاربون رئيسة لنمو البكتريا والفطريات غير المحللة للسليولوز . كما تظهر المنفعة من جهة واحدة بوضوح في الاراضي الحامضية حيث تعيش الكائنات الحساسة للحموضة في المناطق الملاصقة تماماً للكائنات الاخرى التي تعمل على تقليل الحموضة ، كما ان هناك العديد من الامثلة لهذا النوع من العلاقات .

ب - علاقات التعاون الاولى .

ان صور علاقات التعاون الاولى تلاحظ دائماً في المزارع الميكروبية . بين حين وآخر نجد ان بعض المواد الطبيعية والمبيدات الحشرية Insecticides تتحلل بطريقة اسرع في وجود المزارع المختلطة منها في حالة المزارع النقية ومع ان السبب الحقيقي لهذه الظاهرة غير معروف تماماً الا انه غالباً ماتعزى هذه الظاهرة الى التخلص من بعض النواتج المثبطة لنشاط الميكروبات الاساسية التي تحلل هذه المواد او قد تعزى الى انتاج الميكروبات الاخرى المشاركة لبعض المواد المشجعة لنمو الميكروبات الاساسية . قد يطلق على هذا النوع من العلاقة بالمنفعة من جهة واحدة اذا ما افاد احد النوعين دون الاخر ومن ناحية اخرى تعد هذه العلاقة من علاقات التعاون الاولى اذا ما قامت الكائنات المشاركة بتشجيع نمو الكائنات المسؤولة عن التحلل وذلك بالتخلص من المواد السامة ولكنها في الوقت نفسه تحصل على الكربون اللازم لها على هيئة نواتج وافرازات التحلل الذي تقوم به الكائنات الاساسية .

هناك مثال آخر لصور التعاون الاولى وهي العلاقة بين بكتريا *Proteus vulgaris* وبين البكتريا *Bacillus polymyxa* اذ لا يستطيع كلا الكائنين من النمو في منابت تفتقر لحمض النيكوتينيك nicotinic acid وفيتامين

البايوتين Blotin اذ يحتاج الاول الى حامض النيكوتينك ويحتاج الثاني الى البايوتين ، ولكن نجد ان كلا الميكروبين ينموان عند وجودهما معاً في نفس النباتات الفقيرة لمثل هذه المواد ، حيث يستطيع كل منهما ايجاد ما يحتاجه الآخر ، فالاول يكون فيتامين البايوتين الضروري لنمو النوع الثاني ، والثاني يكون حامض النيكوتينك الضروري لنمو النوع الاول .

ان العديد من ميكروبات التربة تحتاج في نموها الى واحد او اكثر من الفيتامينات ، في حين يقوم العديد من الميكروبات الاخرى بافراز مثل هذه المواد ، ويعد الثيامين Thiamine من اكثر الفيتامينات المطلوبة اضافة الى البايوتين blotin وفيتامين B₁₂ التي تعد ايضا مواد اساسية لنمو عدد كبير من البكتريا . كذلك نجد ان العديد من السلالات البكتيرية لاتستطيع النمو في غياب الأحماض الامينية . في حين تستطيع الكثير من الانواع الاخرى افراز نفس هذه المواد المشجعة للنمو .




إن من الصعوبة بمكان تفسير وجود الميكروبات المتخصصة في احتياجاتها الغذائية من التربة . وغالباً ما تنتج هذه المواد بوساطة الميكروبات اذ ان ما تحتويه المخلفات النباتية من هذه المواد لا يستفاد منها نتيجة عمليات تحليلها في التربة . ونظراً لاهمية هذه المواد لنمو الميكروبات فان العلاقات التي تنشأ نتيجة لافرازات هذه المواد المشجعة على النمو واستهلاكها تعد من اهم العوامل الحيوية المحددة لتكوين مجتمع الميكروبات في التربة .

جـ - العلاقات التكافلية :

تعتمد بعض الاحياء على العلاقات التكافلية اعتماداً كلياً أو جزئياً لكي تقوم بفعاليات معينة وفيما يأتي اهم انواع هذه العلاقة بصورة موجزة :-

١ - العلاقة بين الفطريات وجذور بعض النباتات الراقية :

إذ تتعايش الفطريات بطريقة فريدة مع بعض النباتات الراقية وتكون التركيب المسمى بالمايكورايزا Mycorrhiza أو الفطر الجذري والذي ينشأ من العلاقة بين كل من أنسجة الجذور والفطر كما موضح في الشكل (٢٣) ويندر وجود هذه الانواع



- شكل (٢٢) انواع الجذور الفطرية (المايكورايزا) حيث :
- (أ) يمثل الجذور الفطرية الخارجية على اشجار الغابات .
 - (ب) يمثل الجذور الفطرية الداخلية في النباتات السعلبية .
 - (جـ) يمثل الجذور الفطرية الداخلية والمتفرعة مع ظهور الاجسام الثمرية في النباتات العشبية . (عن هارلي ١٩٦٥) .

من الفطريات في الوسط المحيط بالجذور الا على مقربة من الجذور . وقد يعزى ارتباط الفطريات بانسجة الجذور والتعايش معها الى احتياجاتها الغذائية والمعقدة ، اذ تتمكن من الحصول على الفيتامينات والاحماض الامينية وبصورة رئيسة مواد الطاقة والكاربون التي يصنعها النبات في عملية التركيب الضوئي وفي الوقت نفسه تتعمق هايفات الفطريات الى اعماق التربة لتزود النبات بالعناصر الغذائية وبالأخص الفوسفور والنيتروجين والزنك . لم يتمكن اي من الباحثين حتى الآن من

تنميتها على المنابت الصناعية .
تقسم المايكورايزا حسب نوع التغذية على نوعين ،

أ - النوع الخارجي التغذية : Ectotrophs

تكون هيفات الفطر سميكة الغطاء وتحيط بطبقة الجذر الخارجية وتتغلغل هيفات الفطر الى المسافات البينية للخلايا ويوجد مثل هذا النوع من العلاقة على جنور العديد من الاشجار الاقتصادية المهمة . ويشمل هذا النوع الفطريات التابعة للجناس الآتي : -

Amanita , Lactarius , Boletus , Elaphomyces.

ب - النوع الداخلي التغذية : Endotrophs وتسمى أيضاً

Vascular - arbuscular mycorrhizae

في هذا النوع من المايكورايزا تتغلغل هيفات الفطر الى خلايا المائل اذ تكون تراكيب تسمى : *haustoria* داخل خلايا النبات فيصل الفوسفور أو العناصر الغذائية الى هذه التراكيب ويقوم النبات بدوره في افراز انزيمات تحلل هذه التراكيب ليتحرر الفوسفور بشكل جاهز للنبات ، وتنتشر مثل هذه التراكيب في نباتات عائلتي *Ericaceae* و *Orchidaceae* وكذلك اشجار الفواكه والموالح والبن والعديد من النباتات البقلية . ويشمل هذا النوع الفطريات التابعة للجناس الآتي ،

Armillaria , Rhizoctonia , Phoma

وهناك جنس مهم تابع الى نفس النوع هو ، *Glomus* الذي كان يسمى سابقاً *Endogone* .

٢ - العلاقة التكافلية بين الطحالب والفطريات في الاشنيات :

تمد هذه العلاقة من الامثلة المعروفة والشائعة عن التعايش بين الكائنات الدقيقة تلك هي الاشنيات *Lichens* التي تعيش فيها الفطريات مرتبطة بالطحالب . غالباً ما نشاهد الاشنيات على اسطح الصخور وسيقان الاشجار المكشوفة . في مثل هذه العلاقة يحصل تحور لكلا الشريكين لاعطاء تراكيب معقدة

وغالبية الجسم فيها يتكون من البايفات الفطرية التي تحيط وتخترق طبقة من الطحالب . كما يستطيع كل من المتعايشين ان ينمو بصورة مستقلة ثم يلتقي كليهما لتكوين الاشن اذا كانت الظروف الملائمة غير ملائمة لنموها المستقل .

لأقامة مثل هذه العلاقة مختبرياً يجب ايجاد ظروف غير ملائمة كالتي تتوفر في المواقع البيئية غير الملائمة التي توجد فيها الاشنات كأن تكون هناك قلة في المواد الغذائية وشدة الرطوبة أو الجفاف بصورة خاصة . إن العلاقة التعايشية في الاشنات هي طريقة واحدة تجهز فيها الطحالب الفطريات بالمغذيات المتوفرة

والمحدودة ، وهذه القابلية تجعلها مؤشرات حساسة لتلوث الهواء لان معظم الانواع تقتل بسرعة عند ارتفاع تركيز الملوثات السامة ولهذا السبب لا يمكن ان تنمو في المناطق الصناعية .

٣ - العلاقة التكافلية بين بكتريا الرايزوبيوم *Rhizobium* والنباتات البقلية Legumes :

تعد هذه العلاقة من اهم علاقات المنفعة المتبادلة إذ تستفيد النباتات البقلية من النيتروجين الجوي N_2 الممثل بوساطة بكتريا العقد الجذرية *Rhizobium* في حين ينتقل الكربون العضوي الذي يكونه العائل النباتي من غاز ثاني اوكسيد الكربون الى البكتريا . وهناك تناخلات عديدة تحدث بين البكتريا والنبات في مثل هذه العلاقة التكافلية من حيث المركبات التي تنتقل بين النبات والبكتريا والاسس التي تتحكم في تخصص الاصابة ، والطرق التي يتم بوساطتها تكون العقد البكتيرية على جذور النباتات وقد ذكرت جميعها في موضوع تثبيت النيتروجين بصورة تكافلية .

٤ - هناك نماذج من العلاقات التكافلية الاخرى اضافة الى ما ذكر سابقاً ،

حيث تدخل الابدائيات protozoa مع النمل الابيض في معيشة تكافلية فتقوم الابدائيات بتحليل السليلوز المستهلك بوساطة النمل الى صور يمكن الافادة منها ، حيث ان الابدائيات تفيد كثيراً من هذه العلاقة ولا تكاد تكون موجودة تقريباً في اراضي خالية من النمل الابيض .

وهناك علاقة فريدة أخرى تنشأ بين احد فصائل النمل القارض وبعض انواع الفطريات حيث لم يثر على اي من الكائنين في الطبيعة في غياب الاخر . فيقوم النمل بتحليل انسجة اوراق النباتات وازهارها ومخلفاتها ثم يعمل على نقل الفطريات الى داخل الانسجة المتحللة حيث تتكاثر هناك وتكون مصدراً غذائياً لمعظم الحشرات في التربة .

٢ - العلاقات الضارة :

إن العلاقات الضارة التي تنشأ بين ميكروبات التربة تتلخص بالاتي :-

- أ - التنافس الميكروبي Competition
- ب - التضاد Antagonism
- ج - التطفل والافتراس Parasitism & preation

بالنظر لتعدد مجاميع ميكروبات التربة وتنوع العلاقات البسيطة التي تعتمد على وجود نوعين من الكائنات الحية الدقيقة فإن العلاقات الضارة التي تنشأ تتنوع تنوعاً مختلفاً ، وبناء على ذلك فهناك صراع مستمر بين الكائنات حيث تستطيع الانواع الملائمة للوسط البيئي فقط على المقاومة والبقاء .

لقد وجد أن الميكروبات التي تلحق بها التربة تتكاثر بسرعة في حالة التربة المعقمة في حين نجد ان إعادة التلقيح نفسه بدون تعقيم التربة فان نمو الانواع الملقحة يكون ضعيفاً حيث تختفي الانواع التي ادخلت الى التربة في ايام او اسابيع قليلة . ان هذه الظاهرة تعزى الى الاختلاف في الملوك بين التربة المعقمة وغير المعقمة الى العلاقات المتبادلة ذات الطبيعة الضارة بين الميكروبات التي ذكرت آنفاً .

أ - التنافس المايكروبي Microbial competition

ان التنافس المايكروبي يكون بالاساس في الحصول على المواد الغذائية خصوصاً عندما تكون بكميات محدودة ، او يمكن ان يكون التنافس على بعض الاحتياجات النوعية الاخرى . وبما ان مصادر الغناء دائماً تكون غير كافية في التربة فان التنافس على الكاربون والمواد المعدنية والاكسجين ينتشر بصورة واضحة . ان


بعض الميكروبات تقوم باحداث ظروف ضارة لبعض انواع الميكروبات الاخرى كتغيير الوسط المحيط نتيجة تكون بعض نواتج التمثيل الغذائي التي تثبط او تقتل الميكروبات أو نتيجة لاستهلاك جميع الاوكسجين الموجود في الوسط مما يؤدي الى تثبيط نمو الكائنات الهوائية أو نتيجة لتكون حامض النتريك و HNO_3 أو حامض الكبريتيك H_2SO_4 نتيجة للتغذية الذاتية لبعض الميكروبات مثل بعض الانواع التابعة لجنس *Thiobacillus* مما يؤثر على نشاط بعض الميكروبات الحساسة للمحموضة .

يمكن توضيح العلاقة التنافسية بين نوعين من الميكروبات مختبرياً في المزارع السائلة ، حيث تحسب اعداد الميكروبيين عند نمو كل منهما بصورة منفصلة ثم حساب اعدادها عند نموها معاً في مزرعة مختلطة واحدة . فنجد ان النوع الاكثر

كفاءة هو الذي يتميز بقصر زمن الجيل *Generation Time* في ظروف التجربة الذي يتكاثر بمعدل واحد في المزارع النقية والمختلطة . على العكس من ذلك فان النوع الاقل كفاءة في التنافس ينمو في البداية في المزرعة المختلطة بدرجة مماثلة لما يحدث في المزرعة النقية ولكن سرعان ما يهبط معدل نموه بدرجة واضحة عند استهلاك النوع الاول لكل المواد الغذائية المحددة للنمو ، مما يترتب عليه انخفاض الاعداد النهائية لهذا النوع من الميكروبات في المزرعة المختلطة عنه في المزرعة النقية كما موضح في الشكل (٢٤) .

وعند التحكم في نوعية العنصر الغذائي المحدد يمكن ملاحظة التنافس المايكروبي بصورة واضحة من أجل الحصول على مصادر الطاقة والكاربون والمواد المعدنية والمواد الاخرى المشجعة للنمو . وبدرجة مماثلة لما يحدث في المزارع السائلة يمكننا التحكم في نوع العلاقات التنافسية الناشئة في التربة المعقمة والملقحة بنوعين مختلفين من الميكروبات عن طريق التغيير في درجات الحرارة او المستوى الرطوبي .

ان التنافس المايكروبي قد يظهر على مصادر النيتروجين عند وجود المواد العضوية السهلة التحلل بوفرة مثل الكاربوهيدرات او المخلفات النباتية الفقيرة في نسبة النيتروجين . ويظهر مثل هذا التنافس على الانواع بطيئة النمو عند اضافة المركبات الكاربوهيدراتية الى التربة ، في حين ينعكس التأثير عند اضافة المركبات النيتروجينية . ويفسر هذا النوع من العلاقات الدافع من وراء تقليل محتوى التربة



شكل (٢٤) التنافس المثالي بين نوعين من البكتريا في الاوساط الغذائية السائلة . (عُ عن الكسندر - ١٩٧٧)

من مركبات النيتروجين الجاهزة وذلك عن طريق تنشيط عمليات تمثيل هذه المركبات النيتروجينية . ان قدرة الميكروبات على التنافس يتحكم فيها كفاءة تلك الميكروبات في استخدام المواد الكربوهيدراتية في التربة ومعدل نموها وحسب نوعية الحاجة للغذاء .

كذلك يعد التنافس بين سلالات بكتريا العقد الجذرية *Rhizobium* الموجودة أصلاً في التربة والسلالات التي تضاف الى التربة عن طريق تلقح البذور ذا أهمية تطبيقية واسعة ، حيث يقوم أكثرها قدرة على التنافس باصابة الشعيرات الجذرية

واختراقها وتكوين النسبة الكثيرة جداً العقد العقد الجذرية ، حيث تنعكس قدرة العقد الجذرية وكفاءتها المتكونة في تثبيت النيتروجين الجوي على مدى استفادة النبات البقلي من المعيشة التكافلية مع هذه الميكروبات .

ب - التضاد المايكروبي : **Microbial Antagonism**

ان التضاد المايكروبي بمعناه الشامل يعني ان ميكروباً ما يستطيع ان يقتل او يضر او يوقف نشاط ميكروب اخر ونموه بصورة مباشرة او غير مباشرة . وهذه الظاهرة موجودة بصورة واضحة بين ميكروبات التربة ولها اهميتها الاقتصادية في الزراعة . هناك امثلة عديدة لعمليات التضاد كالتطفل المباشر لبعض الميكروبات على ميكروبات اخرى كتطفل الفطر على البكتريا وتطفل الفطر على الديدان الخيطية وتطفل الفيروسات على البكتريا . ومن الامثلة الاخرى على عملية التضاد هو ان بعض الاحياء تتغذى على احياء اخرى فالابتدائيات تأكل البكتريا والحشرات تتغذى على الفطريات . ومن اهم انواع التضاد هو التضاد الناتج عن افراز الميكروبات لمواد خاصة تعرف بالمضادات الحيوية **Antibiotics** ، حيث يلاحظ عند تلقيح الوسط الغذائي الصلب بمعلق مخفف من التربة في اطباق بتري بان بعض المجاميع الميكروبية تحاط بمنطقة رائقة او هالة خالية من النمو الميكروبية وهذا ما يؤكد على انتاج بعض انواع الميكروبات التي تنمو بصورة متجاورة مع بعضها لمواد مثبطة للمجاميع الاخرى .

ان العديد من ميكروبات التربة تنتج مواد مثبطة للنمو في المزارع السائلة ، وليس من الصعوبة بمكان عزل سلالات ميكروبية لها القدرة على تثبيط نمو الكثير من الكائنات الحية الدقيقة مما يدل على سعة انتشار هذا النوع من الكائنات في التربة .

حيث تعد الاكتينومايسيتات من اهم ميكروبات التربة التي تنتج المضادات الحيوية المختلفة ، ومنها على سبيل المثال ، الستربتومايسين **Streptomycin** والكلوروتتراسايكلين **Chlorotetra cycline** وسايكلوهكسيميد **Cycloheximide** وغيرها . من اجناس

الاكتنومايسيتات الفعالة في هذا المجال هي : **Micromonospora** و **Streptomyces** و **Nocardia** وان اهم انواع الاكتنومايسيتات المستخدمة على نطاق واسع في الصناعة وفي انتاج المضادات الحيوية عزلت اصلا من التربة .

ومن اهم انواع البكتريا المنتجة للمضادات الحيوية هي التابعة للجناس *Bacillus* و *Pseudomonas* التي لها القدرة على انتاج البيوسيانين pyocyanin ومشتقاته. كما ان هناك انواعاً من الفطريات تابعة للجناس *Aspergillus* و *Fusarium* و *Penicillium* و *Trichoderma* وغيرها لها القابلية على انتاج المضادات الحيوية .

بالرغم من انتاج جزء كبير من ميكروبات التربة للمضادات الحيوية في المزارع المختبرية فإن دور هذه الكائنات في موطنها الطبيعي بالتربة واهميته في تحديد تركيب مجتمع الميكروبات غير معروف . وعلى الرغم من ان معظم المضادات الحيوية المستخدمة في العلاج الطبي تنتج اصلاً بواسطة كائنات التربة الا ان اهمية هذه المواد المنتجة من بعض الانواع النشطة في الاوساط والبيئات الطبيعية يبقى موضع جدل بين العلماء .

توجد في التربة ايضاً بعض المواد السامة التي لا توضع ضمن المضادات الحيوية ، ولقد وجد ان مثل هذه المواد تنتشر في مجموعة كبيرة من الاراضي احياناً ما تكون تلك المواد معدنية ويظهر تأثيرها المثبط فقط عند وجودها باعداد عالية نسبياً ، وان ظاهرة الركود الفطري في التربة بالنسبة لبعض الانواع يرجع بسبب تلك المواد .

لقد امكن التعرف ايضاً على بعض المواد التي تنتجها الميكروبات في التربة والتي ثبت تأثيرها الضار على نشاط الميكروبات التي تعيش في نفس الوسط .

من نواتج التمثيل الغذائي لبعض الميكروبات والتي لها اهمية في التضاد الميكروبي وحظيت باهتمام خاص هي : CO_2 ، NH_3 ، NO_2^- والاثلين C_2H_4 ومركبات الكبريت . فلقد وجد أن نسبة CO_2 الضرورية لتثبيط انبات الكونيديا وفو هيفات الفطريات وتجربتها غالباً ما تكون أقل من ٢٪ وعادة أقل من ١٪ وتعد الامونيا المنتجة في اثناء تحلل المخلفات النباتية ذات المحتوى النيتروجيني العالي من احدى المواد المثبطة للميكروبات المؤكسدة للنترت NO_2 وهو الجنس *Nitrobacter* وبعض انواع الفطريات . وتعد الامونيا ايضاً احدى المواد الطيارة المثبطة لنشاط الفطريات في الاراضي القلوية غالباً . كما وجد ان الاثلين C_2H_4 المتكون في التربة كاحد نواتج التمثيل الغذائي لمجموعة الميكروبات غير ذاتية التغذية *Heterotrophs* يؤثر تأثيراً ضاراً في بعض الفطريات . كذلك يؤثر

كبريتيد الهيدروجين H_2S وغيره من المواد الكبريتية الطيارة في نمو بعض الميكروبات ونشاطها في التربة .

ج - الافتراس والتطفل *Predation & Parasitism*


يعد الافتراس من اهم العلاقات بين الميكروبات في الطبيعة ، كما تعد البكتريا بصورة خاصة من اهم الكائنات في التربة تعرضاً لفعل المفترسات . كما ان الابدائيات تعد اهم الامثلة اذ تتغذى على الملايين من البكتريا وتكون عاملاً محدداً بالنسبة لاعدادها وانتشارها .

حيث وجد من خلال التجارب ان زيادة اعداد البروتوزوا في موقع معين من التربة يكون له تأثير في اعداد البكتريا إذ ان اعدادها تقل بسبب إستهلاك الابدائيات لها . وبصورة عامة فان العلاقة التي تنشأ بين كل من المفترس والفريسة تقع ضمن العوامل التي تتحكم في التوازن الحيوي وان أي تغيير سواء من

ناحية الكمية أو النوع لكل من المفترس والفريسة يتبعه تغير مماثل للآخر . وقد وجد أن وجود البكتريا بكثافة عديدة كبيرة يعد ضرورياً لنمو الابدائيات في التربة وان اعداداً كبيرة من البكتريا تلزم لاتمام انقسام كل خلية من خلايا الابدائيات .

ان الشكل (٢٥) يوضح الانخفاض الكثير في اعداد البكتريا يقابله ارتفاع في اعداد الابدائيات ، في حين يصبح الانخفاض في اعداد البكتريا معتدلاً في حالة تثبيط ابدائيات التربة . ان الحيوانات وحيدة الخلية ومنها الابدائيات قد تعد أحد العوامل الرئيسة التي تحول دون وجود البكتريا وانتشارها ولا سيما الانواع المضافة الى التربة ذات الاهمية الاقتصادية كالرايزوبيوم *Rhizobium* والازوتوباكتر *Azotobacter* وقد تكون الحيوانات وحيدة الخلية ايضاً كأحد المستهلكين الرئيسين للكتلة الحية من خلايا الميكروبات الصالحة للغذاء والمتأصلة في التربة .


كما ان بعض البكتريا المخاطية *Myxobacteria* والفطريات الهلامية *Slime molds* تقوم بالتغذية المباشرة على انواع البكتريا المختلفة ، اذ تقوم البكتريا الهلامية بانتاج بعض الانزيمات الخارجية قبل هضم خلايا البكتريا الاخرى فتقوم هذه الانزيمات بتدمير خلايا البكتريا ، في حين نلاحظ ان الفطريات الهلامية قد تقوم



شكل (٢٥) التغير في اعداد *Xanthomonas campestris* بعد اضافتها لتربة غرينية مزيجية قبل اضافة احد المركبات المطيئة لنمو الابتدائيات (البروتوزوا) وبمده (عن الكسندر ١٩٧٧) .

باستهلاك خلايا الفريسة بكاملها . ونظراً لسعة انتشار البكتريا الهلامية في مختلف الاراضي فانها تعد من اكثر المفترسات الصغيرة أهمية في الطبيعة . كما ان البكتريا الهلامية تستطيع مهاجمة الطحالب والفطريات والخمائر اضافة الى بعض الاجناس البكتيرية .

كذلك تتعرض المجاميع الرئيسة في التربة للاصابة ببعض الطفيليات . التي تعيش خارج خلاياها كالبكتريوفاج *Bacteriophages* اذ تصيب هذه اجناساً مختلفة من البكتريا وتشل حركتها وفعاليتها . وهناك البكتريا الضمية *Bdellovibrio* التي تنتشر في معظم الاراضي ايضاً وتقوم خلاياها بمهاجمة بعض الاجناس البكتيرية كما موضح في الشكل (٢٦) . ان



شكل (٢٦) مهاجمة ثلاث خلايا بكتيرية ضمية *Bdellovibrio* وتطفلها على خلية بكتيرية من نوع *Escherichia coli* مع ظهور رابطة ضمية بصورة حرة . (عن كروي وويليام ١٩٧٩) .

البكتيريا الضمية لا تؤدي دوراً كبيراً بتأثيرها في تركيب المجتمع المايكروبي في التربة لأنها سرعان ما تفقد حيويتها عند عدم وجود العائل ولا تحتاجها إلى كثافة عددية هائلة من الخلايا الحساسة لانقسام خلاياها وتكاثرها .

إن مجاميع كبيرة من الفطريات تتعرض أيضاً لتطفل بعض الفطريات الأخرى إذ تهاجم الهايفات والكونيديات والجراثيم المختلفة والأجسام الحجرية وغيرها وتؤدي بالتالي إلى تحللها . من أهم الفطريات المتطفلة هي التابعة للجنس التالية ،

Rhizoctonia و *penicillium* و *Trichoderma* و *Gliocladium* . وتعد هيفات الفطريات النامية في التربة أقل عرضة لفعل الطفيليات وذلك لسرعة نموها التي تفوق معدل تحللها .

تتعرض الابتدائيات كذلك لمهاجمة الكائنات الأخرى ، إذ تستطيع أنواع عديدة من البكتيريا وبعض الفطريات من التغلغل داخل خلايا الابتدائيات النشطة فتتكاثر البكتيريا داخل خلايا المائل وتؤدي إلى موتها وتحللها في التربة . وهناك أنواع خاصة من الفطريات قد تدخل خلايا الابتدائيات ولا سيما الأميبا منها فتؤدي إلى موت خلاياها ثم تستفيد من مكونات السايوبلازم .

إن ظاهرة التحلل في التربة تعد من الظواهر المهمة والشائعة في الطبيعة ، ويكون تحليل الخلايا في التربة نتيجة لما يأتي ١ -

- ١ - قد يكون التحلل نتيجة هضم جدران خلايا الأنواع الحساسة وهيفاتها بواسطة انزيمات خارجية تفرزها بعض الكائنات التي تقوم بالتحلل وتعرف هذه الظاهرة بالتحلل غير الذاتي **Heterolysis** وأن الميكروب المتحلل لا يستطيع المحافظة على تركيبه وحيوته .
- ٢ - قد يكون التحلل نتيجة التحطيم الذاتي بواسطة الانزيمات التي تنتجها الخلايا والهيفات المتحللة وتعرف هذه الظاهرة بالتحلل الذاتي **Autolysis** . وقد تعد المضادات الحيوية وغيرها من المواد المشبطة التي تفرزها بعض الأنواع هي السبب في التحلل الذاتي لخلايا أفراد أخرى .

هناك فطريات مختلفة تتعرض للتحلل غير الذاتي الذي ينشأ من فعل الانزيمات التي تفرزها الميكروبات الأخرى كالبكتيريا والاكتنومايسيتات وتشمل الأجناس الآتية أكثر الأنواع نشاطاً في تحليل الفطريات ،

Pseudomonas ، *Bacillus* ، *Nocardia* ، *Streptomyces* ، كما تتعرض بعض أنواع الطحالب للتحلل غير الذاتي ولا سيما الطحالب الخضراء المزرقة *blue green algae* والطحالب الخضراء *green algae* بفعل الانزيمات التي تفرزها سلالات من البكتيريا الهلامية *Myxobacteria* وغيرها من البكتيريا . إن دراسة تحليل الفطريات حظيت باهتمام كبير موازنة بالبكتيريا التي لم تدرس بعناية وذلك بسبب صغر حجم البكتيريا ، وعلى الرغم من ذلك فإن الدراسات التي أجريت على المزارع المختبرية أظهرت أن *polysaccharum* و *Myxococcus* وغيرها تفرز بعض الانزيمات الخارجية التي تهضم أنواعاً مختلفة من البكتيريا .

كما لوحظ أيضاً تحليل البكتريا مختبرياً بواسطة سلالات من الاجناس الاتية
Mycromonospora, Bacillus, Streptomyces, Flavobacterium,
Pseudomonas.

ومن المعلوم ان التحلل غير الذاتي ينشأ نتيجة لنشاط كائنات غير ذاتية التغذية
وافرازها بعض الانزيمات التي تعمل على تفكك مكونات جدران الخلايا
الحساسة التي تعد ضرورية للمحافظة على نشاط الخلايا وحيويتها .

GLOSSARY

المصطلحات العلمية

Acetylene Reduction Test	A	اختبار اختزال الاسيتيلين
Acid- Fast bacteria		بكتريا مقاومة للاحماض
Adsorption		ادمصاص (امتزاز)
Actinophages		عائيات (فاجات) البكتريا الخيطية
Activation		تنشيط
Algae		طحالب
Allochthonous		الاحياء الدخيلة
Amino Sugars		السكريات الامينية
Ammonification		نشرة
Amphitrichous		خلايا سوطية الطرفين
Antagonism		تضاد
Antibiotics		مضادات حيوية
Aromatic Compounds		مركبات عطرية
Arthropoda		المفصليات
Ascomycetes		الفطريات الكيسية
Ascospores		سبورات كيسية
Assimilatory nitrate reduction		اختزال النترات التمثيلي
Autochthonous		الاحياء المستوطنة (المقيمة)
Autolysis		تحلل ذاتي
Autotrophs		احياء ذاتية التغذية

B

Bacillariphyta	الطحالب البنية الذهبية
Bactericides	مبيدات البكتريا
Bacteriodes	بكتريا العقد الجذرية (الرايزوبيوم) داخل العقد

Bacteriophages	عائيات (فاجات) البكتريا
Basidiomycetes	الفطريات البازيدية
Basidiospores	جراثيم بازيدية
Biodegradation	تحلل حيوي
Biomass	الكتلة الحيوية
Blue green algae	الطحالب الخضراء المزرقة
Budding	تبرعم

C

Capsule	حافضة
Carbon Cycle	مادة الكربون
Carboxylation	اضافة ثاني اوكسيد الكربون
Carcinogenic	مسرطنة
Cation exchange capacity (CEC)	السعة التبادلية الكاتيونية
Cellulases	انزيمات تحلل السليلوز
Chemoautotrophs	ذاتية التغذية الكيميائية
Chemoheterotrophs	متباينة (متغايرة) التغذية الكيميائية
Chemotrophs	احياء كيميائية التغذية
Chitinase	انزيم تحلل الكايتين
Chlamydo spores	جراثيم كلاميدية
Chlorophyta	الطحالب الخضراء
Cilia	اهداب
Ciliates	هديات
Climax community	مجتمع الذروة
Colloidal complexes	المعقدات الغروية
Combined nitrogen	نتروجين متحد
Cometabolism	التمثيل الغذائي المشترك
Commensalism	منفعة من جهة واحدة
Competition	تنافس

Composts	مخلفات عضوية
Condensation	تكثيف
Conidiophore	حامل الكونيديات
Conjugation	تعقيد
Constitutive enzymes	انزيمات داخل الخلية بصورة طبيعية
Cooxidation	الاكسدة المرافقة
Critical nitrogen level	المستوى الحرج للنيتروجين
Cyanophages	عائيات (فاجات) الطحالب الخضراء المزرققة
Cyanophyta	الطحالب الخضراء المزرققة
Cyst	حوصلة

D

Deamination	ازالة (نزع) الامونيا
Decarboxylation	ازالة مجموعة الكربوكسيل
Decomposition	انحلال
Degradation	تحلل (تجزئة)
Denitrification	انطلاق النيتروجين
Detoxication	ازالة السمية
Deuteromycetes	الفطريات الناقصة
Dioxygenase	انزيم يعمل بوجود الاوكسجين
Diploid	خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية
Direct Count	طريقة العد المباشر

E

Ecosystem	نظام بيئي
Ectosymbiosis	التعايش الخارجي
Ectotrophic Mycorrhiza	جنور فطرية خارجية التغذية

Electron acceptor	مستقبل الالكترون
Electron carrier	ناقل الالكترون
Electron donor	مانح الالكترون
Endoenzymes	انزيمات تفرز داخل الخلية
Endopeptidases	انزيمات تكسر البروتين من وسط الجزيئة
Endosymbiosis	التعايش الداخلي
Endotrophic mycorrhiza	جنور فطرية داخلية التغذية
Euscomycetes	الفطريات الكيسية الحقيقية
Eukaryotic organisms	كائنات حقيقية النواة
Eumycotina	الفطريات الحقيقية
Eutrophication	الاثراء الغذائي (ظاهرة غزارة النباتات في المياه)
Exchangeable ammonium	الامونيوم القابلة للتبادل
Exoenzymes	انزيمات تفرز خارج الخلية
Exopeptidases	انزيمات تكسر البروتين من اطراف الخلية
F	
Facultative anaerobes	ميكروبات لاهوائية اختيارية
Facultative photoautotrophs	ميكروبات ذاتية التغذية الضوئية اختياراً
Fermentation	تخمير
Ferrodoxins	ناقلات الالكترونات
Fertilizers	اسمدة (مخصبات)
Filamentous	بكتريا خيطية الشكل
Flagella	اسواط
Flagellates	سوطيات
Flavodoxins	ناقلات الالكترونات
Free energy efficiency	كفاءة الطاقة الحرة
Free radicals	جنور حرة
Fungi	الفطريات
Fungicides	مبيدات الفطريات

G

Generation time	زمن الجيل (الاخلاف)
Gibberellins	هورمونات نباتية
Gleying	ظاهرة التبقع
Glucosidic bond	أصرة كلوكوزية
Gypsum	كبريتات الكالسيوم

H

Haemocytometer	شريحة عد خلايا الدم
Hepatitis	التهاب الكبد الفيروسي
Herbicides	مبيدات الحشائش
Heterocysts	الاكياس المتغايرة
Heteroglycans	الكلايكان المختلف
Heterolysis	التحلل غير الذاتي
Heterotrophic organisms	احياء متغايرة (متباينة) التغذية
Homoglycans	الكلايكان المتشابه
Horizon	افق (قطاع)
Humic matter	مادة الدبال
Humification	عملية تكوين الدبال
Humin	الدبال الذي لا ينوب في القاعدة
Humus	الدبال
Hyperplasia	ظاهرة الزيادة غير الاعتيادية في عدد الخلايا
Hypertrophy	ظاهرة الزيادة غير الاعتيادية في حجم الخلايا

I

Immobilization	تمثيل
Immortalist is symbiosis	التعايش المتبادل
Indigenous organisms	كائنات متأصلة (مقيمة)
Inducible enzymes	انزيمات مستحثة (تحفز وتفرز خارج الخلية)
Infection thread	خيوط الاصابة
Insecticides	مبيدات الحشرات

L

Leaching	غسل
Leghaemoglobin	الهيموكلوبين البقلي
Legumes	البقوليات
Lichens	الاشنات
Lignases	انزيمات متخصصة في تحليل اللكتين
Lime	كاربونات الكالسيوم
Lipids	دهون
Lipoproteins	البروتينات اللبيدية
Lithotrophic organisms	احياء ذاتية التغذية
Lophotrichous	خلايا سوطية الطرف
Lysis	تحلل الخلايا

M

Manometric method	طريقة لقياس درجة تحلل المادة العضوية
Mesophilic organisms	الاحياء التي تفضل الحرارة المعتدلة
Methemoglobinemia	مرض ازرقاق العيون
Microbial community	المجتمع المايكروبي
Mineralization	معدنة
Molds	الاعفان
Mononucleotides	النيوكليتيديات الاحادية
Monosaccharides	السكريات الاحادية
Monotrichous	خلايا وحيدة السوط
Most probable number (MPN)	طريقة العد الاكثر احتمالاً
Mycorrhiza	الجنور الفطرية
Myxobacteria	البكتريا الهلامية
Myxomycotina	الفطريات اللزجة

N

Nematocides	مبيدات الديدان الخيطية (النيماتودا)
Nematodes	الديدان الخيطية
Neutralism	علاقة الحياد

Nitrification	عملية النترجة (التآزت)
Nitrifying bacteria	بكتريا النترجة
Nitrogenase	الانزيم المسؤول في عملية تثبيت النيتروجين
Nitrogen cycle	دورة النيتروجين
Nitrogen Fixation	تثبيت النيتروجين
Nitrosification	تحول الامونيوم الى اوكسيد النتروز تحت الظروف اللاهوائية (الخطوة الاولى في عملية النترجة)
Nodulation	عملية تكوين العقد الجذرية .
Nodules	العقد الجذرية
Non – Symbiotic nitrogen fixation	التثبيت اللاكتافلي للنيتروجين
Nucleic Acids	الاحماض النووية

O

Oomycetes	الفطريات البيضية
Oospores	الجراثيم (السورات) البيضية
Optimum temperature	درجة الحرارة المثلى
Organic acids	احماض عضوية
Organic matter	المادة العضوية
Oxidative deamination	نزع الامونيا بالاكسدة

P

Parasitic symbiosis	التعايش المتطفل
Parasitism	تطفل
Parent material	المادة الاصلية
Pathogenic	ممرض
Pectinesterase	انزيم يحلل المواد البكتينية
Peptidase	انزيم يحلل الببتيدات
Peritrichous	خلايا محيطية الاسواط
Pesticides	مبيدات الآفات
Phagotrophes	بلمعية التغذية
Photoautotrophs	أحياء ذاتية التغذية الضوئية

Photoheterotrophs	أحياء متغايرة (متباينة) التغذية الضوئية
Plaques	المناطق الرائقة الخالية من النمو نتيجة تحلل بعض الخلايا بفعل العاثيات (الفاجات)
Plate Count	عدد الخلايا الحية بالاطباق
Pleomorphic bacteria	بكتريا متعددة الاشكال
Polygalacturonase	انزيم يحلل المواد البكتينية
Polysaccharides	سكريات متعددة
Pretation	افتراس
Prokaryotic organisms	كائنات بدائية النواة
Proteases	الانزيمات التي تكسر الجزيئة الكبيرة من البروتين
proteolytic enzymes	الانزيمات المحللة للبروتين
Protista	التصنيف الثالث للكائنات ويشمل جميع البكتريا والطحالب والفطريات والابتدائيات وصنف من قبل العالم هيتكل Haeckel سنة ١٨٦٦ وهو احد تلاميذ دارون .
Proto – cooperation	علاقة التعاون الاولى
Protonation	اضافة بروتون
Protopectin	بكتين اولي
Protopectinase	انزيم يحلل البكتين الاولي
Prototzoa	الابتدائيات
Pseudopodia	اقدام كاذبة
Psychrophilic organisms	الاحياء التي تفضل درجة الحرارة المنخفضة
Purine	قواعد نيتروجينية في الاحماض النووية
Pyrimidines	
R	
Reductive deamination	نزع الامونيا بالاختزال
Rhizoplane	التي تغطي سطح الجذور
Rhizopods	الابتدائيات كاذبة الاقدام
Rhizosphere	التربة المحيطة بالجذور

S

Saprophytic organisms	أحياء رمية التغذية
Slime molds	الاعفان اللزجة
Soil Aggregates	تجمعات التربة
Soil structure	تركيب التربة
Soil Texture	نسجة التربة
Sporangiospores	حافظة السبورات
Strict aerobes	ميكروبات هوائية اجبارية
Strict anaerobes	ميكروبات لاهوائية اجبارية
Sulfur coated Urea	اليوريا المغلفة بالكبريت
Swarm cells	الخلايا المحتشدة
Symbiosis	تكافل (تعايش)
Symbiotic nitrogen fixation	(التثبيت التكافلي للنيتروجين)

T

Tetraploid	خلايا رباعية المجموعة الكروموسومية
Thermophilic organisms	الاحياء التي تفضل الحرارة العالية
Transamination	عملية نقل مجموعة الامين
Transduction	التأثير (الانتقال)

U

Urea	اليوريا
Urease	انزيم يحلل اليوريا

V

Vibrio	بكتريا ضمية
Viruses	فيروسات
Volatilization	تطاير

W

Water holding capacity	السعة التشبعية للتربة
Wet Sieving	الغربلة الرطبة

X

Xanthophyta	الطحالب الخضراء المصفرة
Xylans	اشباه سليولوز تتكون من سكر الزايلوز

	Y	الخمائر
Yeasts		
	Z	جراثيم (سبورات) هدية
Zoospores		الفطريات الطحلبية .
Zygomycetes		

REFERENCES

- Alexander, M. 1972. Microbial Ecology, John Wiley and Sons. Inc. New York pp. 1- 511.
- Alexander, M. 1977. Introduction to Soil Microbiology. John Wiley and Sons, Inc. New York pp. 1- 467.
- Allison, L.E. 1965. Organic Carbon. In C.A. Black (ed). Methods of soil analysis part II. Agronomy J. 1372- 1376.
- Amberger, A. 1986. Potentials of nitrification inhibitors in modern N-fertilizer management. Z. pflanzenernachr. Bodenk. 149:469-484.
- Anderson, J.H. 1964. The metabolism of hydroxylamine to nitrite by *Nitrosomonas*. Biochem. J. 91. 8.
- Anderson, J.B. 1981. Methods to evaluate pesticides damage to the biomass of the soil microflora. Soil Biol. Biochem. 13: 149 - 153.
- Anderson, J.P and Domsch, K.H. 1980. Quantities of plant nutrients in the microbial biomass of selected soils. Soil Sci. 130: (4): 211.
- Anderson, W.P. 1983. Weed Science : principles, 2nd. ed. west publishing com. St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco. pp. 1- 655.
- Blackmer, A.M. and Bremner, J.M. 1978. Inhibition effect of nitrate on reduction of N_2O to N_2 by soil micro- organisms. Soil Biol. Biochem. 10: 187- 191.
- Bissett, J. and Parkinson, 1979. The distribution of fungi in some alpine Soil. Can. J. Bot. 57 (15): 1606.
- Bremner, J.M. and Keeney, D.R. 1964. Steam distillation methods for determination of ammonium, nitrate, and nitrite. Agronomy Dept., Iowa State University, Ames, IOWA, U.S.A.
- Bremner, J.M., and Mulvaney, R.L. 1978. Urease activity in Soils. P. 149- 169. In R.G., Burns (ed.). Soil enzymes. Academic press, New York.
- Buchanan, R.E. and Gibbons, N.E. (Eds.). 1974. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Williams and Wilkins Company. Baltimore.

- Burns, R.G. 1979. Interaction of microorganisms, their substrates and their products with soil surfaces in adhesion of micro- organisms to surfaces (ed : Ellwood, D.C. and Melling, J.). Academic press INC. pp. 109.
- Burris, R.H. 1979. Overview of nitrogen fixation In Genetic Engineering for nitrogen fixation. Plenum press, New York.
- Cassman, K.G. and Munns, D.N. 1980. Nitrogen mineralization as affected by soil moisture, temperature and depth. Soil Sci. Soc. Am. J. 44 (6) : 1233.
- Charles, W., Finkl, J.R. and Roy, W.S. 1979. Phosphorus cycle. In the Encyclopedia of Soil Science part I.
- Dart, P.J. and Mercer, F.V. 1964. The Legume rhizosphere. Arch. Mikrobiol. 47 : 344 – 378.
- Dash, M.C., Mishra, P.C., Mohanty, R.K. and Bhatt, N. 1981. Effects of specific conductance and temperature on urease activity in some indian soils. Soil Biol. Biochem. 13: 73 – 74.
- Denarie, J., Truchet, G. and Bergeron, B. 1976. Symbiotic nitrogen fixation in plants. Cambridge University Press. England.
- Dobereiner, J. and Day, J.M. 1976. Proceeding Int. Symp. on nitrogen fixation. Washington State Univ. Press.
- Fahraeus, G. and Ljunggren, H. 1959. The possible Significance of pectic enzymes in root hair infection by nodule bacteria. Physiol. plant. 12 : 145–154.
- Fenchel, T. and Blackburn, T.H. 1979. Bacteria and mineral cycling. Ac press, New York.
- Focht, D.D. and Verstraete, W. 1977. Biochemical ecology of nitrification and denitrification. Adv. Microbial Ecol. 1 : 135– 214.
- Foster R.C. and Rovira, A.D. 1978. The ultra- structure of the rhizosphere of *Trifolium subteraneum*, L. In microbial Ecology (ed. Loutit, M.W. and Miles, J.R.) . Springer – Verlag. Berlin Heidelberg pp. 279.
- Frankenberger, W.T. and Dick, W.A. 1983. Relationships between enzyme activities and microbial growth and activity indices in soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 47 : 945– 951.
- Ghiorse, W.C. and Alexander, M. 1978. Nitrifying populations and the destruction of nitrogen dioxide in Soil. Microbial Ecology. 4: 233–240.

- Gray, T.R.G. and Williams, S.T. 1979. Soil micro-organisms, Lecturers in Botany, The University of Liverpool, London, England.
- Habte, M. and Alexander, M. 1980. Nitrogen fixation by photosynthetic bacteria in Lowland Vice culture. *Appl. Environ. Microbiol.* 39 (2) : 342.
- Hardy, R.F. 1977. A treatise on nitrogen fixation Sec. III Biology. John Wiley and Sons. New York.
- Hattori, T. 1973. Microbial Life in the Soil. Marcel Dekker, New York.
- Hawker, L.E. and Linton, A.H. 1971. Micro-organisms : Function, form and environment. William Clowes and Sons, Ltd., London.
- Hendrickson, L.L., Keeney, D.R., Walsch, L.M. and Liegel, E.A. 1978 a. Evaluation of Nitrpyrin as a means of improving nitrogen efficiency in irrigated sands. *Agron. J.* 70: 699- 704.
- Hendrickson, L.L., Walsch, L.M. and Keeney, D.R. 1978 b. Effectiveness of Nitrpyrin in Controlling nitrification of fall and spring - applied anhydrous ammonia. *Agron. J.* 70 : 704 - 708.
- Henry, R.M. and Eugene, H.C. 1971. Biological Chemistry, Dept. of chemistry, Indiana Univ. U.S.A.
- Herling, M. 1979. Rhizosphere. In the Encyclopedia of soil Science part I (ed. Rhodes, W.F. and Chavels, W.F.) Dowder Hutchinson and Ross Inc. U.S.A. pp. 425.
- Higgins, I.J. and Burns, R.G. 1975. The Chemistry and Microbiology of pollution. Academic Press. London. pp. 1- 248.
- Hollaender, A. 1979. Genetic engineering for nitrogen fixation. Plenum press New York.
- Holland, A.A. and Parker, C.A. 1966. Studies on microbial antagonism in the establishment of clover pasture. II. The effect of Saprophytic soil fungi upon trifolium Rhizobium and the growth of subterranean clover. *pl. soil* 25: 329- 340.
- Huber, D.M., Warren, H.M., Nelson, D.W., Tsai, C.Y., Ross, M.A. and Mengel, D. 1982. Evaluation of nitrification inhibitors for no- till corn. *Soil Sci.* 134: 388 - 394.
- Jenkinson, D.S. and Powelson, D.S. 1976. The effect of biocidal treatments on metabolism in soil. V.A. method for measuring soil biomass. *Soil Biol. and Biochem.* 8 : 209 - 213.
- Jensen, H.L. 1958. The classification of the rhizobia. In : Nutrition of the Legumes. Ed. by Hallsworth, E.G. 75- 86. Butterworth, London.
- Johnen, B.G. and Drew, E.A. 1977. Biological effects of pesticides on soil

- micro-organisms. Soil Sci. 123 (5). 319- 324.
- Kowalenko, C.G. 1978. Organic nitrogen, Phosphorous and sulphur in soils. IN Soil organic matter (ed. Schnitzer M. and Khan, S.U.) Elsevier Scientific publishing Company, Amesterdam pp. 95.
- Kowalenko, C.G, Ivarson, K.C. and Cameron, D.R. 1978. Effect of moisture content, temperature and nitrogen fertilization on carbon dioxide evolution from field soils. Soil Biol. Biochem. 10 : 417- 423.
- Lillich, T. and Elkan, G.H. 1968. Role of polygalacturonase in invasion of root hairs of Leguminous plants by : *Rhizobium* sp. Bact. Proc., 3.
- Lynch, J.M. and Poole, M.J. 1979. Microbial ecology : A conceptual approach. Blackwell Sci. Publ., London.
- Mainwright, M. 1978. A review of the effects of pesticides on microbial activity in soils. J. Soil Sci. 29 : 287 - 298.
- Malhi, S.S. and Nyborg, M. 1974. Rate of hydrolysis of urea as influenced by thiourea and pellet size - plant and Soil, 51 : 177- 186.
- Mallik, M.B. and Tesfal, K. 1983. Compatability of *Rhizobium japonicum* with commercial fungicides in vitro Bull. Environmental contamination Toxicology' 31 : 432 - 437.
- Martin, J.P. and Focht, D.D. 1977. Biological Properties of soils. pp. 115- 169. In : Soils for management of Organic wastes and waste water, ASA publish. Madison, Wisconsin. USA.
- Nutman, P.S. 1956. The influence of the Legume in root nodule symbiosis. A Comparative study of host determinants and functions. Biol. Rev. 31, 109- 151.
- Nutman, P.S. 1965. The relation between nodule bacteria and the legume host in the rhizosphere and in the process of infection. In : Ecology of soil - borne plant pathogens. Ed. by Baker, K. F and Synder, W.C. 231 - 247. univ. of California press, Berkeley.
- Olsen, R.K. and Reiners, W.A. 1983. The nitrification in subalpine balsam fir soils test for inhibitory factors. Soil Biol. Biochem. 15 : 413 - 418.
- Orme - Johnson, W.H. 1979. Biochemistry of nitrogenase. In Genetic engineering for nitrogen fixation (ed. Hollaender, A.) Plenum press. New York.
- Pelczar, M.J. and Reid, R.D. 1972. Microbiology. Mc Graw - Hill, Inc. New York, St. Louis, San Francisco. pp. 3- 948.

- Postgate, J.R. 1974. New advances and future potential in biological nitrogen fixation. *J. Appl. Bact.* 37: 185.
- Richards, B.N. 1974. Introduction to the Soil ecosystem. Longman, Harlow, Essex.
- Rodgers, G.A. 1987. Biological nitrogen transformations in soil after repeated application of nitrification inhibitors. *Zentralbl. Mikrobiol.* 142: 343- 348.
- Roger, Y.S., Edward, A.A. and John, L.I. 1980. General Microbiology. The Macmillan Press. LTD.
- Rovira, A.D. 1965. Plant root exudates and their influence upon Soil microorganisms. Ecology of Soil - Borne plant pathogens. eds. Baker, K.F. and Synder, W.C.
- Sorensen, J. 1978. Capacity for denitrification and reduction of nitrate to ammonia in a coastal marine sediment. *Appl. Environ. Microbiol.* 35 (2): 301 - 305.
- Stanford, F. and Smith, S.J. 1972. Nitrogen mineralization potential of soils. *Soil Sci. Soc. Am. proc.* 36 : 465 - 472.
- Stanford, F., Carter, J.M. and Smith, S.J. 1974. Estimates of potentially mineralisable soil nitrogen based on short - term incubations. *Soil Sci. Soc. Am. proc.* 38: 99- 102.
- Stewart, W.P. 1975. Nitrogen fixation by free living micro - organisms. Cambridge Univ. Press. Cambridge.
- Tabatabai, M.A. and Al- Khafaji, A.A. 1980. Comparison of nitrogen and sulfur mineralization in soil. *Soil Sci. Am. J.* 44 (5): 100.
- Tisdale, S.L. and Nelson, W.L. 1975. Fertility and fertilizers. Macmillan publishing Co., Inc. New York.
- Vela, G.R. 1974. Survival of *Azotobacter* in dry Soil. *Appl. Microbiol.* 28 : 77.
- Vincent, J.M. 1954. The root - nodule bacteria of pasture Legumes. *proc. Linn. Soc. N.S.W.* 79, iv - xxxii.
- Waksman, S.A. 1952. Soil Microbiology. John Wiley and Sons, Inc. New York, London pp. 1- 356.

- Walker, M.** 1975. Soil microbiology. A critical review. Butterwords and Co., London.
- Wittwer, S.H.** 1979. Agricultural productivity and biological nitrogen fixation. In Genetic engineering for nitrogen fixation (ed. Hollaender, A.) plenum press, New York.
- Zantua, M.I., Dumenil, L.C. and Bremner, J.M.** 1977. Relation ships between soil urease activity and other Soil. properties. Soil Sci. Soc. Am. J. 41: 350 ~ 352.

المراجع العربية

المصلح ، رشيد محبوب ونظام كاظم عبدالامير الحيدري (١٩٨٤) - علم احياء التربة
المجهرية - جامعة بغداد / كلية العلوم .

ولكنسون ، ج ، ف (١٩٨٤) - مدخل الى علم الاحياء الدقيقة . ترجمة د . خضر
داؤد سليمان والسيد مزاحم قاسم الملاح والسيد وائل ياسين الدباغ - جامعة
الموصل / كلية التربية .

خلف ، صبحي حسين (١٩٨٧) - علم الاحياء المجهرية المائي . جامعة الموصل /
كلية العلوم .

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ٦٧٧ لسنة ١٩٨٩



Soil Microbiology

By

Dr. Ghiath m.Kassim

Dr.Mudhar A.ALi

1989



مكتبة السلام العامة في العراق